

## تدوین و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

دکتر علی زاده‌محمدی<sup>1</sup>، زهره احمدآبادی<sup>2</sup>، دکتر محمود حیدری<sup>3</sup>

### Construction and Assessment of Psychometric Features of Iranian Adolescents Risk-Taking Scale

Ali Zadeh Mohammadi\*, Zohreh Ahmadabadi<sup>a</sup>, Mahmoud Heidari<sup>b</sup>

#### Abstract

**Objectives:** To develop and evaluate the validity and reliability coefficients of Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS) and its subscales was the aim of the current study. **Method:** After reviewing the proposed instruments in this field, and with considering the cultural features and circumstances of the Iranian society, the Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS) was developed in 38 items. 1204 students were selected from Tehran high schools using multistage sampling, and all subjects completed IARS. Data were analyzed using exploratory factor analysis and goodness of fit index. **Results:** Exploratory factor analysis indicated that IARS is a 7 dimensional scale, which explains 64.84% of the overall risk variance. The Cronbach's alpha for the total scale and subscales were 0.94 and 0.74-0.93 respectively. **Conclusion:** The psychometric properties of IARS are consistent with the cultural indices of Iranian society.

**Key words:** risk-taking; adolescent; validity; reliability; factor analysis

[Received: 19 June 2010; Accepted: 20 September 2010]

#### چکیده

**هدف:** تدوین مقیاسی برای سنجش خطرپذیری نوجوانان و تعیین اعتبار و ساختار عاملی آن هدف پژوهش حاضر بود. **روش:** پس از بررسی ابزارهای این حوزه و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و ویژگی‌های اجتماعی جامعه ایران، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)، در 38 گویه تنظیم شد. 1204 دانش‌آموز مقطع دبیرستان به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به IARS پاسخ دادند. داده‌ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شدند. **یافته‌ها:** تحلیل عاملی اکتشافی با مؤلفه‌های اصلی نشان داد که IARS مقیاسی هفت‌بعدی است، که 64/84 درصد واریانس خطرپذیری را تبیین می‌کند. میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده‌مقیاس‌ها به ترتیب 0/94 و 0/74-0/93 بود. **نتیجه‌گیری:** ویژگی‌های روان‌سنجی IARS مناسب و هماهنگ با شاخص‌های فرهنگی جامعه ایران است.

**کلیدواژه:** خطرپذیری؛ نوجوانان؛ اعتبار؛ پایایی؛ تحلیل عاملی

[دریافت مقاله: 1389/3/29؛ پذیرش مقاله: 1389/6/29]

<sup>1</sup> دکترای روانشناسی بالینی، دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی. تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده خانواده. دورنگار: 021-29902368 (نویسنده مسئول) [E-mail:dr.zadeh@gmail.com](mailto:E-mail:dr.zadeh@gmail.com)؛ <sup>2</sup> کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی؛ <sup>3</sup> دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

\* Corresponding author: PhD. in Clinical Psychology, Associate Prof. of Shahid Beheshti University. Family Research Centre, Shahid Beheshti University, Daneshju Blvd., Evin, Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-29902368, E-mail:dr.zadeh@gmail.com; <sup>a</sup> MA. in Social Research, Shahid Beheshti University; <sup>b</sup> PhD. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Shahid Beheshti University.

## مقدمه

بر پایه تعریف سازمان جهانی بهداشت<sup>1</sup> (WHO)، دوره نوجوانی از 10 سالگی - که متوسط سن بلوغ جسمی و جنسی دختران و پسران است - تا 20 سالگی - که سن متوسط دستیابی به استقلال، خودکفایی و شکل گیری هویت فرد است - در نظر گرفته می شود. از آنجا که برای نوجوان، یک الگوی دقیق، روشن و همه جانبه برای رفتار مناسب تعریف نشده است، او به سبک سنگین کردن رفتارها، آزمایش نقش ها، ابراز تمایز از بزرگسالان و در برخی موارد نادیده گرفتن قواعد دست می زند (شفرز<sup>2</sup>، 2004). این امور معمولاً با رفتارهای پرخطر همراه است، بنابراین دوره نوجوانی در بیشتر موارد با خطرپذیری هم معنی گرفته می شود. بررسی رفتارهای پرخطر از نظر پیامدهایی که برای زندگی، سلامتی و رشد روانی و اجتماعی نوجوان به همراه می آورد، دارای اهمیت است. برخی از این پیامدها عبارت است از: بیماری های روانی مانند افسردگی<sup>3</sup> (گلدستین<sup>4</sup>، والتون<sup>5</sup>، کانینگهام<sup>6</sup>، تروبریج<sup>7</sup> و مایو<sup>8</sup>، 2007)، مرگ زودرس (کورنلیوس<sup>9</sup> و همکاران، 2008)، ایدز<sup>10</sup> و بیماری های جنسی (مارکوئیز<sup>11</sup> و گالبن<sup>12</sup>، 2004)، انگیزه پایین تحصیلی و شکست تحصیلی (جینس<sup>13</sup>، 2002) و درگیری در جرایم گوناگون. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است (لیندبرگ<sup>14</sup>، بوگس<sup>15</sup> و ویلیامز<sup>16</sup>، 2000). بسیاری از رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن، پیش از سن 18 سالگی اتفاق می افتند (برگمن<sup>17</sup> و اسکات<sup>18</sup>، 2001). پژوهش ها نشان داده اند مصرف زود هنگام سیگار، احتمال مصرف الکل و مواد مخدر، مشکلات تحصیلی، تجربه زود هنگام رابطه جنسی و خطر بارداری را در نوجوانان افزایش می دهد (هانا<sup>19</sup>، یی<sup>20</sup>، دوفورا<sup>21</sup> و ویتامور<sup>22</sup>، 2001). پژوهش های انجام شده در ایران نشان گر آن است که در سال های اخیر رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان شیوع یافته است (آیت اللهی، محمدپور و رجایی فرد، 2005؛ کلیشادی، اردلان، غیرتمند، دلاوری و حشمت، 2006؛ محمدی و همکاران، 2006؛ پوراصل، وحیدی، فخاری، رستمی و دستگیری، 2007).

بررسی خطرپذیری نوجوانان، نیازمند ابزارهای کارآمد است. ناسازگاری ابزارهای موجود با شاخص های فرهنگی جامعه ایرانی، دربرداشتن هر دو نوع خطرپذیری مثبت و

منفی، اعتبار<sup>23</sup> پایین، توجه صرف به انجام رفتارهای پرخطر و بیان کردن موضوع کج روی و جرم به عنوان خطرپذیری، از محدودیت های ابزارهای موجود است. بنابراین با توجه به نبود ابزار کارآمد برای سنجش رفتارهای پرخطر در ایران، ساخت، اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی پرسش نامه ای برای سنجش خطرپذیری نوجوانان، هدف پژوهش حاضر بود.

## روش

ساخت ابزاری برای سنجش رفتار پرخطر در نوجوانان ایرانی، بخشی از یک بررسی مقطعی بزرگ تر بود، که در آن، رابطه مدرسه، خانواده و خطرپذیری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران تشکیل می دادند، که بر پایه آمار موجود در سایت آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 85-1384، 193903 نفر بودند. با جایگزینی این مقدار در فرمول کوکران<sup>24</sup> و با در نظر گرفتن سطح معناداری 0/95، کران خطای سه درصد و میزان p و q برابر 0/5، حجم نمونه 1105 نفر به دست آمد، که با در نظر گرفتن 10 درصد، در نهایت شمار 1204 دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند. برای نمونه گیری، ابتدا تهران به چهار منطقه جغرافیایی شمال، شرق، غرب و جنوب تقسیم و 1204 آزمودنی، متناسب با شمار دانش آموزان هر منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. با دریافت مجوز از آموزش و پرورش، به صورت تصادفی به مدارس هر منطقه مراجعه و پرسش نامه ها اجرا شد. پیش از تکمیل پرسش نامه ها، اهداف و ضوابط تکمیل پرسش نامه برای آزمودنی ها توضیح داده و بر بی نام بودن پرسش نامه ها تأکید شد. آزمودنی ها رضایت خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کردند.

برای تدوین مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی<sup>25</sup> (IARS) از دو پرسش نامه خطرپذیری نوجوانان<sup>26</sup> (ARQ)

- |   |               |
|---|---------------|
| 1- World Health Organization              | 2- Schafers   |
| 3- depression                             | 4- Goldstein  |
| 5- Walton                                 | 6- Cunningham |
| 7- Trowbridge                             | 8- Maio       |
| 9- Cornelius                              | 10- AIDS      |
| 11- Marquez                               | 12- Galban    |
| 13- Jeynes                                | 14- Lindberg  |
| 15- Boggess                               | 16- Williams  |
| 17- Bergman                               | 18- Scott     |
| 19- Hanna                                 | 20- Yi        |
| 21- Dufoura                               | 22- Whitmore  |
| 23- validity                              | 24- Cochran   |
| 25- Iranian Adolescents Risk-taking Scale |               |
| 26- Adolescents Risk-taking Questionnaire |               |

آسیب‌شناختی<sup>21</sup> و بدون نفع ثانویه<sup>22</sup> بودند (بامریند<sup>23</sup>، 1987)، به‌عنوان رفتار پرخطر در نظر گرفته شده، خطرپذیری ورزشی و اکتشافی<sup>24</sup> (گالونه و همکاران، 2000) که از رفتارهای پرخطر مثبت و سازنده<sup>25</sup> هستند، از دامنه خطرپذیری کنار گذاشته شد. هم‌چنین خطرپذیری از جرم و بزهکاری<sup>26</sup> متمایز شد؛ جرم مفهومی حقوقی است که به زیرپا گذاشتن آگاهانه قوانین اجتماعی گفته می‌شود و با مجازات و دخالت نیروهای رسمی همراه است (مارشال<sup>27</sup>، 1998). بزهکاری رفتاری ضداجتماعی است، ولی به‌طور دقیق بر پایه قانون تعریف نمی‌شود (همان‌جا). در کل هسته مرکزی این دو مفهوم، شکستن قوانین و زیرپا گذاشتن ارزش‌های اجتماعی است، در حالی که در خطرپذیری، آسیب‌ها و تهدیدهای روانی و جسمی ناشی از رفتار پرخطر، بر خود فرد متمرکز است و کمتر پیامدهای اجتماعی این نوع رفتارها مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ARQ و YRBS نمونه‌هایی از رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه مانند دزدی و تقلب گنجانده شده است. نکته دیگر این که به باور نویسندگان، خطرپذیری و انجام رفتار پرخطر دقیقاً با یکدیگر برابر نیستند. خطرپذیری افزون بر این که انجام رفتارهای پرخطر را در برمی‌گیرد، به آسیب‌پذیری فرد از سوی محیط و نزدیکان، نیز تمایلات و باورهای نادرست و تهدیدکننده فرد درباره رفتارهای پرخطر اشاره دارد. در YRBS تمرکز اصلی بر انجام رفتار پرخطر است و آسیب‌پذیری از سوی محیط و باورها، تمایلات و قضاوت‌های خطرناک نادیده گرفته شده است. هم‌چنین در YRBS، پاسخ‌ها به‌صورت بلی/خیر ثبت می‌شود، که در این حالت، پاسخ مثبت از یک تا چندین بار ارتکاب رفتاری خاص را در برمی‌گیرد و بنابراین تفاوت افراد در میزان انجام هر رفتار مشخص نمی‌شود.

(گالونه<sup>1</sup>، مور<sup>2</sup>، موس<sup>3</sup> و بوید<sup>4</sup>، 2000) و پیمایش رفتار پرخطر جوانان<sup>5</sup> (YRBS) (مراکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌ها<sup>6</sup>، 2003) به عنوان منبع بهره گرفته شد. ARQ برای پاسخ‌گویان 17-12 ساله تنظیم و از دو قسمت تشکیل شده است که هم قضاوت<sup>7</sup> درباره خطرناک بودن یا نبودن و هم ارتکاب عملی رفتار پرخطر را می‌سنجد، بدین صورت که هر یک از 73 گویه این پرسش‌نامه دو بار مورد ارزیابی پاسخ‌گویان قرار می‌گیرد. چهار خرده‌مقیاس ARQ عبارت است از: 1- هیجان‌جویی<sup>8</sup> (اسکیت، چتربازی و اسکی)، 2- سرکشی<sup>9</sup> (سیگار، الکل و تا دیروقت بیرون از خانه ماندن)، 3- بی‌پروایی<sup>10</sup> (رانندگی در حال مستی، رابطه جنسی ناامن و با سرعت راندن) و 4- خطرهای ضداجتماعی<sup>11</sup> (تقلب، پرخوری و آزار دیگران). آلفای کرونباخ<sup>12</sup> دو قسمت قضاوت و رفتار پرخطر به ترتیب 0/86-0/96 و 0/78-0/96 و اعتبار بازآزمایی<sup>13</sup> یک‌هفته‌ای نیز برای دو قسمت به ترتیب 0/79 و 0/87 گزارش شده است (گالونه و مور، 2000). YRBS انجام دادن یا ندادن فهرستی از رفتارهای پرخطر مانند دعوا، قمار، رانندگی بدون کلاه یا کمربند ایمنی، دزدی از مغازه، رابطه جنسی ناامن (بدون کاندوم)، حمل اسلحه خارج از خانه و مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر را به‌صورت بلی/خیر، در پاسخ‌گویان پایه‌های تحصیلی 9 تا 12 ارزیابی می‌کند. حاصل جمع پاسخ‌های مثبت نشان‌گر میزان خطرپذیری پاسخ‌گو است. در پیمایش انجام شده در سه سطح ملی، ایالتی و محلی در آمریکا در دو دوره زمانی 1991 و 1999، به ترتیب سه چهارم گویه‌ها و 14 درصد گویه‌ها از اعتبار بالا و مناسب (ضریب کاپای بالاتر از 61 درصد) برخوردار بودند (برنر<sup>14</sup> و همکاران، 2004).

در مورد حوزه مفهومی خطرپذیری، بیث-ماروم<sup>15</sup> و فیشهوف<sup>16</sup> (1997)، خطر را به معنی «احتمال زوال»<sup>17</sup> در نظر گرفته‌اند و رفتار پرخطر را با عنوان «خطرپذیری» به صورت رفتارهایی که احتمال پیامدهای منفی، ناخوشایند و مخرب جسمی، روان‌شناختی و اجتماعی را افزایش می‌دهد، تعریف کرده‌اند (کارگر<sup>18</sup> و گراور<sup>19</sup>، 2003؛ بیث-ماروم و فیشهوف، 1997). به باور بویر<sup>20</sup> (2006) مهم‌ترین رفتارهای پرخطر از نظر فراوانی، نمونه‌واری و ناخوشایندی عبارتند از: مصرف الکل و تنباکو، رابطه جنسی ناایمن، رانندگی خطرناک و خشونت میان‌فردی. در پژوهش حاضر تنها رفتارهایی که پیامد منفی و زیان‌بار برای سلامتی فرد داشتند و

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1- Gullone                                    | 2- Moore              |
| 3- Moss                                       | 4- Boyd               |
| 5- Youth Risk Behavior Survey                 |                       |
| 6- Centers for Disease Control and Prevention |                       |
| 7- judgment                                   | 8- thrill-seeking     |
| 9- rebellious                                 | 10- reckless          |
| 11- antisocial risks                          | 12- Cronbach $\alpha$ |
| 13- test-retest                               | 14- Brenner           |
| 15- Beyth-Marom                               | 16- Fischhoff         |
| 17- chance of loss                            | 18- Carr Gregg        |
| 19- Grover                                    | 20- Boyer             |
| 21- pathogenic                                | 22- secondary gain    |
| 23- Baumrind                                  | 24- exploratory       |
| 25- constructive                              | 26- delinquency       |
| 27- Marshall                                  |                       |

تناسب با شرایط فرهنگی ایران در متن مقیاس اعمال شد. روایی سازه<sup>6</sup> به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. از آزمون کفایت نمونه‌گیری کایزر- مایر- اولکین<sup>7</sup> (KMO) و آزمون کرویت بارتلت<sup>8</sup> برای بررسی کفایت اندازه نمونه بهره گرفته شد؛ ضریب KMO برابر با 0/952 نشان‌گر مناسب بودن همبستگی موجود میان گویه‌ها بود. آزمون کرویت بارتلت نیز از نظر آماری معنادار بود ( $p=0/001$ ,  $df=703$ ). برای تحلیل عاملی مقیاس، روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی<sup>9</sup> و چرخش پروماکس<sup>10</sup> به کار رفت؛ نمودار اسکری<sup>11</sup> نشان داد هفت عامل اصلی، مقادیر ویژه بیش از یک داشتند (شکل 1). در یافته‌های به دست آمده از چرخش پروماکس (جدول 1)، پس از حذف گویه‌های دارای بار عاملی پایین‌تر از 0/5، هفت عامل به دست آمد، که به جز مؤلفه خطرپذیری جنسی، با الگوی مفروض نخستین هماهنگ بود. در مورد خطرپذیری جنسی، گویه‌های مربوط به گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رفتار جنسی، دو عامل جداگانه را تشکیل دادند. هم‌چنین عامل گرایش به رانندگی خطرناک در طرح نخستین، در این ماتریس بار عاملی قابل‌قبولی به دست نیاورد. با توجه به این یافته‌ها، عامل‌های نخست تا هفتم را می‌توان به این صورت نام‌گذاری کرد


در تدوین IARS برای سنجش آسیب‌پذیری نوجوانان ایرانی نسبت به شش گروه رفتار پرخطر (رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و خطرپذیری جنسی) 50 گویه تنظیم و مورد ارزیابی متخصصان قرار گرفت. پاسخ‌گویی روی مقیاس پنج‌درجه‌ای یک (کاملاً مخالف) تا پنج (کاملاً موافق) انجام شد. تمامی گویه‌ها هم‌جهت بوده، نیازی به نمره‌گذاری وارون وجود نداشت و بنابراین نمره بالاتر، نشان‌گر میزان خطرپذیری بیشتر بود.

داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS-14<sup>1</sup> و LISREL-8.5<sup>2</sup> و به روش تحلیل عاملی اکتشافی<sup>3</sup> و تأییدی<sup>4</sup> تحلیل شدند.

### یافته‌ها

شمار آزمودنی‌های دختر (و پسر) در مقاطع تحصیلی دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی به ترتیب در رشته ریاضی 46 (133)، 135 (117) و 32 (92) نفر، در رشته تجربی 59 (24)، 26 (13) و 31 (48) نفر و در رشته انسانی 65 (93)، 117 (92) و 54 (27) نفر بود.

برای روایی صوری<sup>5</sup> IARS، شش روان‌شناس و متخصص مسایل جوانان، مقیاس را بررسی کردند؛ اصلاح‌های پیشنهادی آنها در مورد ابهام، مرتبط‌بودن با موضوع، جامع و مانع بودن و



تعداد عامل‌ها

شکل 1- آزمون اسکری عامل‌های مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

- 1- Statistical Package for the Social Science-version 14
- 2- Linear Structural Relationships-version 8.5
- 3- exploratory factor analysis 4- confirmatory factor analysis
- 5- face validity 6- construct validity
- 7- Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy
- 8- Bartlett test of sphericity 9- principle component analysis
- 10- promax 11- Scree plot

جدول 1- ماتریس عاملی چرخش یافته پروماکس مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

گویه‌ها	عامل‌ها							
	1	2	3	4	5	6	7	
0/786								اگر به من موادی مثل گراس، تریاک یا اکس تعارف کنند، رد نمی‌کنم
0/762								اگر توی پارتی‌های دوستانه قرص اکس به من تعارف کنند، رد نمی‌کنم
0/702								موادمخدر اگر تفریحی مصرف شود اعتیادآور نیست
0/694								این روزها تریاک یا حشیش دیگر عیب نیست
0/693								آن‌قدرها هم که می‌گویند، قرص اکس مضر نیست
0/661								من به پارتی‌ها یا مهمانی‌هایی که در آنها مواد مصرف می‌شود، می‌روم
0/556								قرص‌های اکس به آدم شادی و هیجان می‌دهد
0/501								در بین دوستان نزدیک من کسانی هستند که موادمخدر مصرف کنند
0/723								الکل باعث می‌شود حس بهتری داشته باشم
0/695								بیشتر دوستان من الکل مصرف می‌کنند
0/687								من انواع مارک‌های الکل را می‌شناسم
0/684								اگر توی یک مهمانی به من الکل تعارف شود، بدم نمی‌آید که امتحان کنم
0/653								الکل اعتیادآور نیست
0/628								الکل باعث می‌شود آدم سختی‌های زندگی را فراموش کند
0/801.								من سیگار کشیدن را دوست دارم
0/772								اگر به من سیگار تعارف شود، حتماً قبول می‌کنم
0/765								سیگار کشیدن به آدم آرامش می‌دهد
0/705								سیگار باعث می‌شود حس بهتری داشته باشم
0/699								از نظر من سیگار کشیدن عیب نیست
0/728								چندین بار با هم‌سن‌وسال‌هایم درگیر شده‌ام و کار به فحش، تهدید و زدو خورد کشیده شده است
0/709								معمولاً زود از کوره درمی‌روم و دعوا راه می‌اندازم
0/658								گاهی دلم می‌خواهد کسی را که حقم را پایمال کرده، از بین ببرم
0/646								از روی عصبانیت چیزهای زیادی را شکسته یا خراب کرده‌ام
0/614								بدم نمی‌آید با خودم چاقو حمل کنم
								تا جایی که بتوانم از چراغ قرمز رد می‌شوم
0/802								اگر کسی را عاشقانه دوست داشته باشم، حاضرم با او رابطه جنسی داشته باشم
0/796								رابطه جنسی باعث محکم‌تر شدن عشق می‌شود
0/721								به‌نظر من وقتی دو نفر از نظر احساسی به هم نزدیک شدند، نزدیکی جسمی ایرادی ندارد
0/695								به غیر از ازدواج، من راه‌های دیگری را برای رفع نیاز جنسی انتخاب می‌کنم
0/762								بیشتر دوستان من دوست دختر/پسر دارند
0/762								برای شناخت جنس مخالف لازم است که آدم دوست دختر/پسر داشته باشد
0/756								دوست دختر/پسر داشتن بد نیست
0/725								من تا به حال دوست پسر/دختر داشته‌ام
0/791								من اگر راننده بودم، سعی می‌کردم از مسیری بروم که بتوانم با سرعت بیشتری برانم
0/729								من از سرعت زیاد لذت می‌برم
0/711								من هر چقدر هم که سریع رانندگی کنم، می‌توانم ماشین/موتور را کنترل کنم
0/652								من بیشتر وقت‌ها حوصله رانندگی با سرعت کم را ندارم
0/564								من از حرکات نمایشی مانند لایی کشیدن، تک‌چرخ‌زدن و مسابقه با دیگران خوشم می‌آید
1/12	1/23	1/41	1/64	2/31	3/57	12/33		مقادیر ویژه
7/09	7/50	7/84	8/37	9/84	10/61	13/65		درصد واریانس تبیین شده
64/92	57/83	50/33	42/49	34/11	24/27	13/65		درصد واریانس تراکمی تبیین شده

222  
222

تعدیل یافته<sup>2</sup> (AGFI)، شاخص برآزش تطبیقی<sup>3</sup> (CFI)، شاخص برآزش هنجار شده<sup>4</sup> (NFI) و جذر برآورد واریانس خطای تقریب<sup>5</sup> (RMSEA) (جدول 2) نشان گر برآزش مناسب عامل های پنجم، ششم و هفتم، به دلیل معنادار نشدن شاخص برآزش<sup>2</sup> آنها بود. بیشتر مقادیر مربوط به شاخص های GFI، AGFI و CFI نیز بالاتر از 0/90 بودند، که این امر تأیید کننده عامل های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی است.

در بررسی پایایی<sup>6</sup> IARS، برای همسانی درونی<sup>7</sup>، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون<sup>8</sup> هر گویه با خرده مقیاس مربوط محاسبه شد (جدول 3). ضریب آلفای کرونباخ کل 38 گویه IARS 0/94 بود.

(به ترتیب): گرایش به مواد مخدر (گویه های 17-24)، گرایش به الکل (گویه های 25-30)، گرایش به سیگار (گویه های 12-16)، گرایش به خشونت (گویه های 7-11)، گرایش به رابطه و رفتار جنسی (گویه های 31-34)، گرایش به رابطه با جنس مخالف (گویه های 35-38) و گرایش به راندگی خطرناک (گویه های 4-1 و 6). این هفت عامل به ترتیب 7/0، 7/50، 7/84، 8/37، 9/84، 10/61، 13/65 درصد و روی هم رفته 64/84 درصد واریانس کل را تبیین کردند.

برای تأیید عامل های استخراج شده، با کاربرد بسته نرم افزاری لیزرل، مدل تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد. محاسبه شاخص های برآزش<sup>2</sup>، شامل مجذور کای ( $\chi^2$ )، شاخص خوبی برآزش<sup>1</sup> (GFI)، شاخص خوبی برآزش<sup>1</sup>

جدول 2- تحلیل عاملی تأییدی مربوط به عوامل هفت گانه مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی

عامل	$\chi^2$	df	p	RSMEA	GFI	AGFI	CFI
اول	396/38	20	0/03	0/13	0/92	0/86	0/93
دوم	99/82	9	0/01	0/093	0/97	0/94	0/98
سوم	94/94	5	0/001	0/12	0/97	0/91	0/98
چهارم	41/82	5	0/02	0/082	0/99	0/96	0/97
پنجم	1/81	2	0/55	0/00	1/00	1/00	1/00
ششم	4/71	2	0/095	0/033	1/00	0/99	1/00
هفتم	11/39	5	0/550	0/033	1/00	0/99	1/00

جدول 3- ضریب آلفای کرونباخ و کمینه و بیشینه همبستگی گویه های هر خرده مقیاس با نمره کل خرده مقیاس در مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی

خرده مقیاس	آلفای کرونباخ	کمینه همبستگی گویه ها با خرده مقیاس	بیشینه همبستگی گویه ها با خرده مقیاس
گرایش به مواد مخدر	0/90	600	0/768
گرایش به الکل	0/90	0/700	0/828
گرایش به سیگار	0/93	0/749	0/859
گرایش به خشونت	0/78	0/522	0/616
گرایش به رابطه و رفتار جنسی	0/87	0/659	0/786
گرایش به رابطه با جنس مخالف	0/83	0/604	0/746
گرایش به راندگی خطرناک	0/74	0/321	0/600

- 1- Goodness of Fit Index
- 2- Adjustment Goodness of Fit Index
- 3- Comparative Fit Index
- 4- Normed Fit Index
- 5- Root Mean Square Error of Approximation
- 6- reliability
- 7- internal consistency
- 8- Pearson correlation

## بحث

یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی نشان داد IARS می‌تواند 64/84 درصد واریانس خطرپذیری را تبیین کند. هم‌چنین یافته‌ها نشان داد خرده‌مقیاسی که در ابتدا برای سنجش خطرپذیری جنسی ساخته شده بود، خود به دو عامل گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی با جنس مخالف تقسیم شد. یافته‌های تحلیل عاملی تأییدی نیز بر عوامل به‌دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی صحت گذاشت و شاخص‌های برازندگی GFI و CFI نیز نشان‌گر برازش مناسب بیشتر عامل‌های به‌دست آمده بود. میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده‌مقیاس‌ها به ترتیب 0/94 و 0/74-0/93 بود. پایین‌ترین میزان آلفا، مربوط به گرایش به رانندگی خطرناک بود که احتمالاً یکی از مهم‌ترین دلایل آن، دسترسی نداشتن نوجوانان ایرانی به خودروی شخصی است، که امکان پاسخ‌گویی دقیق به گویه‌های مربوط را دشوار ساخته است. یافته‌ها نشان داد گویه پنجم خرده‌مقیاس رانندگی خطرناک، همسانی کمی با سایر گویه‌ها داشت و در عامل استخراج شده نیز جای نگرفت. بنابراین حذف یا تغییر آن به افزایش هم‌خوانی گویه‌ها و اعتبار خرده‌مقیاس کمک می‌کند. با آن‌که دو خرده‌مقیاس گرایش به رانندگی خطرناک و گرایش به خشونت از اعتبار کافی برخوردار بودند، می‌توان با تجدیدنظر در گویه‌ها، اعتبار مقیاس را بهبود بخشید؛ برای نمونه در عامل گرایش به رانندگی خطرناک، گویه‌هایی مانند رانندگی بدون گواهی‌نامه، کمربند یا کلاه ایمنی می‌تواند مفید باشد.

در کل به نظر می‌رسد IARS با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف خطرپذیری (انجام رفتار پرخطر، داشتن باورهای نادرست درباره رفتار پرخطر، قرار گرفتن در معرض محیط پرخطر و معاشرت با هم‌سالان پرخطر)، تصویر جامع‌تری نسبت به ARQ (گالونه و همکاران، 2000) و YRBS (مراکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌ها، 2003)، که تنها انجام رفتار پرخطر را می‌سنجند، به‌دست می‌دهد.

IARS نقطه برش ندارد، که با کاربرد آن بتوان دو گروه بهنجار و در معرض خطر را متمایز و برای پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی گروه پرخطر چاره‌جویی کرد. بنابراین تعیین نقطه برش مقیاس می‌تواند موضوع پژوهش‌های آتی باشد. هم‌چنین در مقیاس کنونی تمامی مؤلفه‌های خطرپذیری IARS از اهمیت مشابه و وزن یکسانی برخوردارند،

در صورتی که به‌نظر می‌رسد در عالم واقع، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر به یک اندازه نوجوان را در معرض خطر قرار ندهد، یا این‌که خطرپذیری جنسی و خشونت، آسیب‌یکسانی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین تعیین وزن گرایش به رفتارهای پرخطر نسبت به یکدیگر می‌تواند موضوع دیگری برای پژوهش‌های آتی باشد. نکته دیگر این‌که به دلیل ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران و امکان خودسانسوری، کتمان و وارونه‌نمایی واقعیت، به دلیل بی‌اعتمادی و ترس از توییح و مجازات، در تدوین این مقیاس تلاش شد تا حد امکان از طرح گویه‌های مستقیم و حساسیت‌زا در مورد رفتارهای پرخطری مانند سابقه رابطه جنسی یا داشتن رابطه جنسی نامن پرهیز شود. به این ترتیب، طرح این‌گونه گویه‌ها در شرایط مناسب‌تر و با توییح کمتر و در پی آن، به‌دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر در مورد رفتارهای پرخطر نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. پاسخ‌گویان پژوهش حاضر، نوجوانان مشغول تحصیل در دبیرستان‌های شهر تهران بودند. بنابراین تعمیم یافته‌ها به نوجوانان ترک تحصیل کرده و شهرهای دیگر باید با احتیاط صورت پذیرد. اجرای این مقیاس روی نوجوانان ترک تحصیل کرده، هم‌چنین کاربرد آن در سطح ملی، همراه با مقایسه میان شهرهای مختلف، مناطق شهری و روستایی و اقوام گوناگون برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود.

## سپاسگزاری

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، برای حمایت مالی از پژوهش حاضر، قدردانی می‌شود. [بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است].

## منابع

- Ayatollahi, S. A., Mohammadpoor, A., & Rajaeifard, A. (2005). Predicting the three stages of smoking acquisition in the male students of Shiraz's high schools. *Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences*, 64, 10-15. (Persian)
- Baumrind, D. (1987). A developmental perspective on adolescent risk taking in contemporary America. In: C. E. Irwin (Ed.). *Adolescent social behavior and health, new directions for child development*. San Francisco: Jossey Bass.

- Bergman, M. M., & Scott, J. (2001). Young adolescents well being and health risk behaviors: Gender and socioeconomic differences. *Journal of Adolescence*, 24, 183s-197.
- Beyth-Marom, R., & Fischhoff, B. (1997). Adolescents' decisions about risks: A cognitive perspective. In: J. Schulenberg, J. L. Maggs, & K. Hurrelmann (Eds.). *Health risks and developmental transitions during adolescence*. New York: Cambridge University Press.
- Boyer, T. W. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. *Developmental Review*, 26, 291-345
- Brener, N. D., Kann, L., Kinchen, S. A., Grunbaum, J. A., Whalen, L., Eaton, D., Hawkins, J., & Ross, J. G. (2004). Methodology of the youth risk behavior surveillance system. *Morbidity & Mortality Weekly Report*, 53, 1-13.
- Carr Gregg, M. R., & Grover, S. R. (2003). Risk taking behaviour of young women in Australia, screening for health risk behaviors. *Medical Journal of Australia*, 178, 601-604.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2003). *Questionnaire of Youth Risk Behavior Survey (YRBS)*. Retrieved from <http://www.ftp.cdc.gov/pub/data/yrbs/2003/yrbs2003codebook.pdf>, 1, October, 2006.
- Cornelius, J. R., Reynolds, M., Martz, B. M., Clark, D. B., Kirisci, L., & Tarter, R. (2008). Premature mortality among males with substance use disorders. *Addictive Behaviors*, 33(1), 156-160.
- Goldstein, A. L., Walton, M. A., Cunningham, R. M., Trowbridge, M. J., & Maio, R. F. (2007). Violence and substance use as risk factors for depressive symptoms among adolescents in an urban emergency department. *Journal of Adolescent Health*, 40, 276-279.
- Gullone, E., & Moore, S. (2000). Adolescent risk-taking and the five-factor model of personality. *Journal of Adolescence*, 23(4), 393-407.
- Gullone, E., Moore, S., Moss, S., & Boyd, C. (2000). The adolescent risk-taking questionnaire. *Journal of Adolescent Research*, 15, 231-250.
- Hanna, E. Z., Yi, H., Dufoura, M. C., & Whitmore, C. C. (2001). The relationship of early-onset regular smoking to alcohol use, depression, illicit drug use, and other risky behaviors during early adolescence: Results from the youth supplement to the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Journal of Substance Abuse*, 13(3), 265-282.
- Jeynes, W. H. (2002). The relationship between the consumption of various drugs by adolescents and their academic achievement. *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 28(1), 15-35.
- Kelishadi, R., Ardalan, G., Gheiratmand, R., Delavari, A., & Heshmat, R. (2006). Smoking behavior and its influencing factors in a national representative sample of Iranian adolescents. *Preventive Medicine*, 42, 423-426.
- Lindberg L. D., Boggess, S., & Williams, S. (2000). *Multiple threats: The co-occurrence of teen health risk-behaviors*. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Retrieved from <http://www.urban.org/family/at-risk/multiplethreats.html>, 5, February, 2006.
- Marquez, M. P., & Galban, N. (2004). *Getting hotter, going wilder? Changes in sexual risk-taking behavior among Filipino youth*. Paper presented at the seventh International Conference on Philippine Studies, Leiden, and The Netherlands, 16-19 June 2004. Retrieved from [http://web.kssp.upd.edu.ph/talastasan/papers/marquez\\_i\\_cophil\\_paper\\_revised.pdf](http://web.kssp.upd.edu.ph/talastasan/papers/marquez_i_cophil_paper_revised.pdf), 22, December, 2006.
- Marshall, G. (1998). *Oxford Dictionary of sociology*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Farahani, F., Alikhani, S., Zare, M., Tehrani, F. R., Ramezankhani, A., & Alaeddini, F. (2006). Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. *International Family Planning Perspectives*, 32, 35-44.
- Poorasl, A. M., Vahidi, R., Fakhari, A., Rostami, F., & Dastghiri, S. (2007). Substance abuse in Iranian high school students. *Addictive Behaviors*, 32, 622-627.
- Schafers, B. (2004). *Soziologie des Jugendalters*. (translated by K. Rasekh). Tehran: Ney Publications. (Persian)