



## وتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن با اختلالهای روانی در جمعیت عمومی زاهدان

دکتر کاظم ملکوتی<sup>\*</sup>، نور محمد بخشانی<sup>\*\*</sup>، دکتر غلامرضا بابایی<sup>\*\*\*</sup>، دکتر یاسمن متقی پور<sup>\*\*\*\*</sup>

### چکیده

استرسهای روانی - اجتماعی به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای بدنی و روانی، مقوله‌ای بهداشتی اند. از این رو شناسایی این استرسهای ارزیابی آنها در گروههای مختلف برای تعیین گروههای آسیب پذیر ضروری می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی، کمی سازی آن و مقایسه علایم روانی هر یک از رویدادهای استرس زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است. آزمودنیهای پژوهش را ۴۱۰ نفر (۲۱۱ زن، ۱۹۹ مرد با میانگین سنی ۳۱/۳ سال) تشکیل داده‌اند. این افراد بر اساس نمونه گیری خوشای - تصادفی از جمعیت عمومی شهرستان زاهدان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای آماری Z، آنالیز واریانس و روش توکی به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین استرس و زنان مشکلات عصبی - روانی بیشتر و شدیدتر است. مردان، افراد جوانتر، زنان و مردان بلوج با رویدادهای استرس زای بیشتری مواجه می‌گردند. بسته‌ترین شدند یکی از اعضاء خانواده، زاد و ولد، مرگ و میر غیرمنتظره، مشکلات مالی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، بیکاری و اختلافات خانوادگی از شایعترین رویدادهای استرس زای زندگی بوده‌اند.

### کلید واژه: رویدادهای استرس زا، اختلالات روانی، زاهدان

\* روانپرشن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، خیابان جمال زاده جنوبی، مرکز آموزشی و درمانی شهید اسماعیلی.

\*\* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زاهدان، بیمارستان جامع روانپرشن.

\*\*\* متخصص آمار حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، گروه آمار.

\*\*\*\* روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، بزرگراه چمران، خیابان تابناک، بیمارستان آیت الله طالقانی.

که استمرار شرایط پر استرس، درمان بیماران مبتلا به برونه راسی<sup>(۱۶)</sup> را با پیش آگهی بدتری رویرو می کند. بدین ترتیب "استرس" به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای جسمانی و روانی، مقوله ای بهداشتی بوده و در پیشگیری اولیه دارای اهمیت است. بسیاری از راهبردهای روانشناختی سعی در کنترل حرکتها، کاهش فشارهای روانی و کمک به سازگاری مؤثر در شرایط بحران دارند.

این بررسی با توجه به تجربه بالینی، مشاهده رویدادهای استرس زای بیشمار و پی در پی در شرح حال بیماران و با این فرض که ساکنین شهر زاهدان به دلیل وجود شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی با شرایط استرس زای روانی بالایی رویرو بوده و رویدادهای استرس زای بیشتری را در مدت معینی تجربه می کنند، انجام شد.

اهداف پژوهش عبارت از شناسایی و رتبه بندی رویدادهای استرس زای زندگی، اندازه گیری کمی استرس و بررسی عالیم روانی مرضی در جمعیت مورد نظر و تبیین نقش استرس در بروز اختلالها روانی می باشد.

## روشن

این بررسی از نوع بررسیهای توصیفی - مقطوعی بوده و به منظور مقایسه عالیم روانشناختی در دو گروه افرادی که رویدادهای استرس زای معینی را در زندگی تجربه نموده اند با کسانی که این تجربه را نداشته اند انجام گردیده است.

1-Jasmin	2-Cantin
3-Tenant	4- Irwin
5-life change unit (L.C.U)	
6-Mepherson	7- Herbison
8- Romans	9-Andrews
10-Bebbington	11- Wilkins
12-Ross	13-Ventura
14-Blazer	15- Shari
16-agoraphobia	

استرس عبارت از بهم خوردن تعادل درونی بصورت تغییرات هیجانی، شناختی و فیزیولوژیکی است که در اثر عوامل بیرونی (مانند رویدادهای زندگی، سرما، گرما، رطوبت و ...) و یا تحریکات درونی (مانند ارضا غرایز، امیال، تکانه ها ...) بوجود می آید و درجه تهدید آمیز بودن آن در یک ارزیابی شناختی تعیین می گردد (جامسین<sup>(۱)</sup> و کاتین<sup>(۲)</sup>، ۱۹۹۱).

استرس به عنوان یک پدیده روانشناختی، از عوامل مهم در بروز و استمرار بسیاری از اختلالهای روانی است (تنانت<sup>(۳)</sup>، ۱۹۷۸). استرس می تواند با تضعیف سیستم ایمنی بدن مانند کاهش سلولهای لنفوцит و مانند آن، بروز برخی از بیماریها را تسهیل کند (ایرون<sup>(۴)</sup>، ۱۹۸۷). پژوهش‌های راهه و همکارانش (۱۹۷۳) نشان داد هر چه استرس ناشی از واحد تغییرات زندگی<sup>(۵)</sup> زیادتر باشد، احتمال بروز بیماریهای چون سکته قلبی، رینیت، کولون اسپاستیک و گاستریت افزایش می یابد. مفرسون<sup>(۶)</sup>، هریسون<sup>(۷)</sup> و رومانس<sup>(۸)</sup> (۱۹۹۳) نشان دادند که هر چه فاصله بین بروز استرس تا آغاز بیماری بیشتر باشد اثر تخریبی آن کمتر است. عده ای از پژوهشگران فاصله زمانی لازم را ۱ تا ۶ ماه دانسته اند. (آندروز<sup>(۹)</sup>، ۱۹۸۱، بینگتون<sup>(۱۰)</sup>، ویلکینز<sup>(۱۱)</sup>، ۱۹۹۳). نتایج بسیاری از بررسیها نشان داده اند که استرس علاوه بر اینکه موجب بروز بیماریهای جسمانی می شود، در بروز اختلالهای روانی از جمله اسکیزوفرنیا (بینگتون، ۱۹۹۳، روس<sup>(۱۲)</sup>، ۱۹۹۳؛ وتورا<sup>(۱۳)</sup>، ۱۹۹۲) اضطراب (بلیزر<sup>(۱۴)</sup>، ۱۹۸۷؛ شاری<sup>(۱۵)</sup>، ۱۹۹۳) و افسردگی شدید (فرانک، ۱۹۹۴) نیز مؤثر است. بررسیها نشان داده اند در افراد مبتلا به بیماری افسردگی شدید، فراوانی رویدادهای زندگی و استرس ناشی از آن در دوران پیش از آغاز بیماری بیشتر از فراوانی وقوع این رویدادها در افراد سالم است. این همبستگی در زنان افسرده بیشتر از مردان افسرده است. شرایط پرفشار روانی نه تنها در بروز بیماریها، بلکه در سیر بیماری و نتایج درمانی نیز اثر منفی می گذارند. شاری (۱۹۹۳) نشان داد

نتایج نشان می‌دهد که بروز بیماری در افراد مجرد، بلوچها، کسانی که تحصیلات ابتدایی دارند و زنان شیوع بیشتری داشته و از مشکلات روان‌شناختی شدیدتری در رنج می‌باشند ( $p < 0.05$ ).

پرسشنامه برای تعیین علایم روانی و شدت آنها استفاده شد. فرم کوتاه شده دارای پرسش‌های مربوط به جسمی سازی هیجانات، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و روانپریشی بوده و ضریب کلی علایم مرضی (GSI)<sup>(۲)</sup> ملاک وجود احتمالی بیماری یا سلامت برای هر یک از آزمودنیها در نظر گرفته شد. پس از محاسبه نمره میانگین GSI در نمونه مورد بررسی، بر اساس نتایج به دست آمده از بررسیهای پیشین کسانی که نمره GSI آنها بالاتر از میانگین بود بیمار احتمالی و آنها که کمتر از میانگین بود سالم احتمالی (گروه گواه) تلقی گردیدند. (باقری یزدی و همکاران، ۱۳۷۳؛ بهادر خان و همکاران، ۱۳۷۲). جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر، جمعیت شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بود. شهرستان زاهدان به ۱۸ منطقه بهداشتی - درمانی تقسیم شده و دارای ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است. برای انتخاب نمونه‌ها از هر منطقه یک یا دو محله انتخاب و بر اساس جمعیت هر منطقه آزمودنیها مورد نظر به صورت تصادفی از بین ساکنین ۱۵ ساله و بالاتر انتخاب شدند.

برای رتبه‌بندی رویدادهای زندگی از روش‌های آمار توصیفی و برای تعیین حد مرضی استرس از معادله رگرسیون استفاده شد. در معادله رگرسیون کمیتی از استرس که از میانگین نمره GSI به دست آمده از کل نمونه‌ها بیشتر بود، حد مرضی استرس نامیده شد و احتمالاً کسانی که با این مقدار از استرس و یا بیشتر مواجه

آزمودنیهای پژوهش را ۴۲۰ نفر از مردم شهرستان زاهدان تشکیل داده‌اند که به شیوه نمونه‌گیری خوشای تصادفی انتخاب شده‌اند.

ابزار پژوهش عبارت بودند از:

الف) پرسشنامه رویدادهای زندگی: پیش از انجام پژوهش اصلی، پرسشنامه‌ای دارای ۶۷ پرسش مربوط به رویدادهای گذشته زندگی که ساختار کلی آن با پرسشنامه پیکل<sup>(۱)</sup> و همکاران (۱۹۷۱) مطابقت داشت تنظیم گردید. در تنظیم این پرسشنامه ملاحظات فرهنگ ایرانی و فرهنگ بومی در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از بررسی مقدماتی نشان داد که مدت زمان لازم برای پاسخگویی به این پرسشنامه، پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات بطور متوسط ۸۰ دقیقه (۱۲۰-۴۵ دقیقه) است که پس از ۴۵ دقیقه به دلیل خستگی آزمودنی و شرایط نامساعد تکمیل پرسشنامه‌ها (در کوچه و خیابان)، دقت آزمودنیها در پاسخ به سوالات کاهش یافته و گاهی از ادامه آن خودداری می‌نمودند. از این رو ۱۱ پرسش آخر پرسشنامه رویدادهای زندگی که دارای پایین‌ترین نمره نسبت به میانگین بوده و از نظر ایجاد فشار روانی کمترین اثر را داشتند، حذف شدند و نیز از فرم کوتاه شده SCL-90-R استفاده شد. هنگام پاسخگویی از آزمودنیها خواسته شد که فقط جنبه منفی فشار ناشی از رویدادها را در نظر گرفته و ناراحتی حاصل از هر یک از رویدادها را (در صورتی که بطور فرضی رخ دهد) که ممکن است بر یک خانواده متوسط (از نظر اقتصادی - اجتماعی) زاهدانی وارد شود از ۱ تا ۲۰ نمره گذاری نمایند و پس از آن هر یک از موارد را که در یکسال گذشته شخصاً تجربه کرده‌اند، علامت گذاری کنند. در نمره گذاری مرحله اول نمره میانگین هر یک از رویدادها و رتبه‌بندی آنها و در قسمت دوم مقدار استرس هر یک از آزمودنیها و فراوانی هر یک از رویدادها در نمونه مورد بررسی بدست آمد.

ب) پرسشنامه غربالگری SCL-90-R: از این

تحلیل سایر داده‌ها استفاده گردید. کلیه محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

### نتایج

مشخصات آزمودنیهای پژوهش در جدول ۱ نشان داده شده است.

گردد می‌بایست به یکی از اختلالهای روانی دچار شوند. از ضریب همبستگی پرسون برای تعیین رابطه استرس و علایم روانی و از آزمون  $t$  مستقل برای مقایسه میزان استرس در دو گروه سالم و بیمار و مقایسه GSI در دو گروه استرس بالا و پایین استفاده گردید و برای مقایسه نسبت افراد بیمار به سالم در GSI بالا و پایین آزمون  $Z$  به کار برده شد. از آزمون تحلیل واریانس و روش توکی نیز برای

جدول ۱- مشخصات آزمودنیهای پژوهش بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و قومیت

متغیرها	جنسیت	وضعیت تأهل	وضعیت تحصیلی	وضعیت مالی	القومیت	فراآنی		مرد		زن		مجرد متاهل		کم‌سواد متوجه دیپلم و بالاتر		ضعیف متوجه خوب زابلی بلوچ غیربویمی		
						فراآنی	تعداد	فراآنی	درصد	فراآنی	درصد	فراآنی	درصد	فراآنی	درصد	فراآنی	درصد	
						۱۰۵	۱۳۳	۱۷۲	۷۰	۲۴۹	۹۱	۹۴	۱۸۹	۱۲۷	۳۲۶	۸۴	۱۹۹	۲۱۱
						۲۵/۶	۳۲/۴	۴۲	۱۷/۱	۶۰/۷	۲۲/۲	۲۲/۹	۴۶/۱	۳۱	۷۹/۵	۲۰/۵	۴۸/۵	۵۱/۵

رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زا به دو صورت انجام جدول ۲ ارائه گردیده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، تجربه استرس روانی بستری شدن یکی از اعضای خانواده (به دلیل مشکلات بهداشتی - درمانی)

رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زا به دو صورت انجام گرفت:

- ۱) بر حسب میانگین نمرات
- ۲) بر حسب فراوانی بروز رویدادها

Andeasbeh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۲۰

جدول ۲- توزیع فراوانی رویدادهای آزمودنیهای پژوهش بر حسب میانگین نمره‌های انحراف معیار

ردیف	رویدادهای استرس‌زا	میانگین	انحراف معیار فراوانی نسبی
۱	مرگ همسر	۱۹/۳۵	۲/۷
۲	مرگ فرزند	۱۹/۱۱	۴/۴
۳	مرگ یکی از اعضاء خانواده بجز همسر و فرزند (مانندوالدین، برادر و خواهر)	۱۸/۸۲	۱۳
۴	وجود اعتیاد به مواد مخدر حداقل در یکی از اعضاء خانواده	۱۸/۴۸	۳/۴
۵	خیانت همسر	۱۸/۲۵	۱
۶	طلاق	۱۸/۳۵	۰/۲
۷	محکومیت به زندان	۱۸/۰۶	۱/۲
۸	بیکاری دائم (نداشتن شغل ثابت و مشخص)	۱۷/۹۸	۳/۴
۹	تنزل مقام	۱۷/۶۸	۳/۲
۱۰	اختیار همسر دیگر توسط شوهر	۱۷/۰۶	۱/۷
۱۱	بروزیک حادثه غیرمترقبه (تصادف اتومبیل، هدف حمله قرارگرفتن)	۱۶/۹۳	۰/۵
۱۲	مشکلات مالی سنگین	۱۶/۸۲	۱۰/۴

جدول ۲- ادامه

ردیف	رویدادهای استرس زا	میانگین	انحراف معیار فراوانی نسبی
۱۳	صرف مواد مخدر در یکی از اعضاء خانواده بدون اعتیاد	۱۶/۸۱	۴/۲۷
۱۴	بستری شدن یکی از اعضاء خانواده (به علت بیماری شدید)	۱۶/۷۱	۴/۰۱
۱۵	تحت تعقیب قرار گرفتن به علت تخلفات مالی	۱۶/۶۸	۴/۴۶
۱۶	متارکه با همسر به دنبال منازعه و درگیری	۱۶/۵۹	۴/۴۷
۱۷	بیکاری فرزندان	۱۶/۵۵	۴/۱۲
۱۸	از کار برکنار شدن	۱۶/۲۱	۴/۷۹
۱۹	عدم موقیت تحصیلی یا شکست تحصیلی (مردود شدن در یک امتحان یا حذف اختیاری واحد درسی)	۱۶/۱۰	۴/۴۴
۲۰	متارکه با همسر بدون درگیری قبلی (ترک منزل)	۱۶/۰۱	۴/۶۴
۲۱	بالاگرفتن درگیری با همسر	۱۵/۹۹	۴/۳۶
۲۲	مرگ یک دوست نزدیک	۱۵/۹۱	۴/۲۸
۲۳	احضار شدن به دادگاه به علت تخلفات قانونی	۱۵/۸۵	۴/۶۴
۲۴	دستگیر شدن موقت یکی از اعضاء خانواده	۱۵/۸۱	۴/۵۶
۲۵	بروز بیماری جسمی مهم در فرد (بستری شدن یا یکماه کناره گیری از کار به علت بیماری)	۱۵/۶۱	۴/۶۱
۲۶	پایان تحصیل (اخراج یا ترک مدرسه به هر شکل)	۱۵/۶۰	۴/۵۵
۲۷	شکست شغلی یا حرفه‌ای	۱۵/۵۷	۴/۷۴
۲۸	سطط جنین یا زایمان بچه مرده	۱۵/۲۳	۵/۲۶
۲۹	بهم خوردن نامزدی	۱۵/۱۴	۵/۳۷
۳۰	غیبت طولانی شوهر به علت رفتن به شهر دیگر برای کار و غیره	۱۵/۱۲	۵/۱۶
۳۱	انتخاب همسر بدون دخالت و انتخاب خود	۱۵/۰۱	۵/۷۰
۳۲	بالاگرفتن درگیری با یکی از اعضای خانواده که در یک منزل زندگی می‌کنند	۱۴/۹۱	۴/۵۴
۳۳	بالاگرفتن اختلاف با نامزد	۱۴/۸۳	۵/۱
۳۴	مشکلات مالی در حد متوسط	۱۴/۶۸	۴/۹۱
۳۵	دستگیر شدن موقت	۱۴/۵۸	۵/۲
۳۶	گرفتن وام سنگین از بانک (بیش از نصف درآمد سالانه)	۱۴/۰۹	۵/۰۹
۳۷	درگیری با یکی از اعضای خانواده یا اقوام که با هم در یک محله زندگی نمی‌کنند	۱۴/۰۶	۴/۷۴
۳۸	خدمت زیر پرچم فرزند در زمان جنگ	۱۳/۶۳	۶/۱۹
۳۹	حاملگی با داشتن ۵ فرزند یا بیشتر	۱۳/۶۰	۶/۹۴
۴۰	درگیری با همکار یا رئیس	۱۳/۴۴	۴/۸۸
۴۱	عدم کفایت حقوق و درآمد برای تأمین مخارج زندگی	۱۳/۳۸	۴/۹۱
۴۲	تفاوت محل سکونت یا رفتن به یک کشور خارجی	۱۳/۲۰	۶/۶۴
۴۳	حاملگی ناخواسته	۱۲/۷۴	۶/۱۳
۴۴	شرکت در یک امتحان مهم	۱۲/۳۲	۶/۳۵
۴۵	تحلف خفیف از قانون	۱۲/۰۳	۵/۸۰

Andeesheh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۲۱

## جدول ۲- ادامه

ردیف	رویدادهای استرس زا		
انحراف معیار فراوانی نسبی	میانگین	انحراف معیار فراوانی نسبی	رویدادهای استرس زا
۴۶	۷/۱	۶/۷۱	۱۱/۸۵
۴۷	۱۳/۴	۵/۴۲	۱۱/۶۱
۴۸	۹/۳	۵/۶۸	۱۰/۷۴
۴۹	۳/۲	۶/۴۷	۱۰/۱۴
۵۰	۸/۱	۵/۵۵	۱۰/۰۱
۵۱	۱/۷	۶/۶۴	۹/۶۳
۵۲	۶/۱	۶/۵۱	۷/۸۰
۵۳	۶/۶	۷/۳۳	۶/۷۸
۵۴	۱۷/۶	۷/۵۱	۶/۶۵
۵۵	۱۰/۳	۷/۵۵	۶/۱
۵۶	۱۰/۳	۶/۲۲	۴/۴۲

بیش از دیگر موارد (۳۹/۶٪) توسط افراد مورد بررسی گزارش گردیده است. پس از آن مشکلات مالی متوسط (۱۷/۶٪) مرگ یک دوست (۱۷/۶٪) و تولد یک فرزند (۱۷/۴٪) قرار داشته است. میانگین استرس و علائم روانی به دست آمده از SCL-90-R در جدول ۳ ارائه گردیده است. همان طور که ملاحظه می شود افسردگی، اضطراب و جسمی سازی هیجانات، به ترتیب شدیدترین مشکلات روانی بوده اند.

بیش از ۴۲٪ آزمودنیها بالای میانگین GSI و (۱۷۴ نفر) آزمودنیها بالای میانگین GSI و (۱۵۸ نفر) آنها بالاتر از حد مردمی استرس قرار داشتند. ضریب پیرسون همبستگی مثبتی میان استرس و علایم روانی نشان داد ( $r=0.359$ ) و ( $P<0.001$ ). برای ارزیابی دقیق تر، استرس در دو گروه بیمار ( $GSI>82$ ) و سالم ( $GSI<82$ ) به کمک آزمون  $t$  تحلیل گردید. نتایج نشان داد میزان استرس در گروه بیمار ( $X=71/6$ ,  $SD=65/5$ ) بیش از میزان استرس در گروه سالم ( $X=46/2$ ,  $SD=49/9$ ) است ( $t=4/45$ ,  $P<0.001$ ). در مرحله بعد نمونه ها را به دو گروه استرس بالا و پایین (بر حسب میانگین = ۵۷/۲) تقسیم نموده و نمره GSI در گروه استرس بالا ( $X=1/0$ ,  $SD=0/64$ ) و گروه استرس پایین ( $X=0/58$ ,  $SD=0/68$ ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون  $t$  تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد ( $t=5/36$ ,  $P<0.001$ ). مقایسه علایم روانی پنجگانه (افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، جسمی سازی هیجانات، روانپریشی) و GSI در افراد مجرد و متأهل بجز در روانپریشی تفاوت

بیش از دیگر موارد (۳۹/۶٪) توسط افراد مورد بررسی گزارش گردیده است. پس از آن مشکلات مالی متوسط (۱۷/۶٪) مرگ یک دوست (۱۷/۶٪) و تولد یک فرزند (۱۷/۴٪) قرار داشته است. میانگین استرس و علایم روانی به دست آمده از SCL-90-R در جدول ۳ ارائه گردیده است. همان طور که ملاحظه می شود افسردگی، اضطراب و جسمی سازی هیجانات، به ترتیب شدیدترین مشکلات روانی بوده اند.

Andeeshbeh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۲۲

## جدول ۳- توزیع فراوانی نمرات ابعاد مختلف SCL-90-R بر حسب میانگین و انحراف معیار.

ابعاد	میانگین	انحراف معیار
استرس	۵۷/۲	۵۸/۳
جسمی سازی هیجانات	۰/۸۲	۰/۷۵
افسردگی	۱/۰۱	۰/۷۶
اضطراب	۰/۸۸	۰/۷۵
پرخاشگری	۰/۸۱	۰/۸
روانپریشی	۰/۵۳	۰/۵۵
GSI	۰/۸۲	۰/۶۳
PSDI <sup>(۱)</sup>	۱/۸۴	۰/۵۷

Vol.3 NO.3 /Winter:1998  
۱۳۷۶  
سال سوم، شماره ۳، زمستان

داری در علایم جسمی سازی هیجانات ( $P < 0.001$ ,  $F = 7/277$ ) و افسردگی ( $P < 0.01$ ,  $F = 4/091$ ) نشان داد. مقایسه نشانه‌های یاد شده در زنان و مردان در جدول ۴ نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود زنان مشکلات عصبی - روانی بیشتر و شدیدتری داشته‌اند. تایج تحلیل واریانس و آزمون  $t$  در مورد رویدادهای زندگی در گروههای مختلف در جدول ۵ ارائه گردیده است. همان طور که یافته‌ها نشان می‌دهند مردها،

معنی داری نداشته است. روانپریشی در افراد مجرد ( $X = 0/67$ ,  $SD = 0/65$ ) بیشتر از افراد متاهل ( $X = 0/49$ ,  $SD = 0/52$ ) بوده است. در گروههای اقتصادی (خوب، متوسط، ضعیف) مقایسه نشانه‌های یادشده با آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنی داری نداشته است. در گروههای تحصیلی (دیپلم و بالاتر، متوسطه، ابتدایی یا بیسواد) تحلیل واریانس و روش توکی فقط میان دو گروه کم سواد و دیپلم به بالا تفاوت معنی

جدول ۴ - میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای مورد بررسی در ابعاد پنج گانه آزمون SCL-90-R و آزمون استرس بر حسب جنسیت

اعلایم روانی	جنسیت	اعلایم روانی	زن	اعلایم روانی	مرد
جسمی سازی هیجانات		میانگین	۰/۷۴	میانگین	۰/۶۲
افسردگی			۰/۷۱		۰/۷۶
اضطراب			۰/۷۷		۰/۶۸
پرخاشگری			۰/۸۳		۰/۷۴
روانپریشی			۰/۵۵		۰/۵۶
استرس			۰/۱۸	۰/۵۹	۰/۶۶
GSI			۰/۶۱	۰/۷۱	۰/۷۷

Andeeshch  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۲۳

#### ادامه جدول ۵

شماره رویدادهایی که در مقایسه با گروههای موردمطالعه گروههای دیگر بیشتر رخ داده است*	۲۶-۲	خوب	وضعیت مالی	۵	ادامه جدول ۵
	۳۹-۱۱	متوسط			
	۵۴-۳۵	ضعیف			
	۲۵	زابلی	قومیت		
۲۵-۲۴-۲۲-۲۰-۱۰	بلوج				
۵۲-۳۴	غیربومی				
-	زابلی	تعامل زن و قوم			
۲۵-۲۴-۲۲-۲۰-۱۰	بلوج				
۵۲	غیربومی				
۵۶-۱۷-۶	زابلی	تعامل مرد و قوم			
۴۶-۳۲-۳۰-۱۱-۲-۲۴	بلوج				
۳۰-۲۸-۲۴	غیربومی				

\*  $P < 0.05$

جدول ۵ - مقایسه فراوانی رویدادهای استرس زای زندگی در گروههای مختلف بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی، وضعیت مالی، قومیت، تعامل زن و قوم، تعامل مرد و قوم

جنین	سن	جنس	زن	مرد	گروههای موردمطالعه	شماره رویدادهایی که در مقایسه با گروههای دیگر بیشتر رخ داده است*
	پایین	۳۰-۲۰-۱۸-۱۱	۵۶	۴۰-۳۲-۲۵-۱۴-۲۰-۱۶	۵۶-۴۴-۱۹-۱۵-۱۲	
	بالا				۵۲-۵۰-۴۶-۴۵-۴۳-۴۲-۴۱	
وضعيت تأهل	مجرد	۴۷-۴۶-۴۵-۴۳-۳۰-۱۸-۱۱	۵۶-۵۱-۴۴-۲۳-۱۹-۱۵-۶	۳۰-۲۸	۵۶-۳۲-۳۰-۱۱-۲	۵۶-۳۰-۱۷
وضعيت تحصيلی	دیپلم	۴۶-۳۲-۳۰-۱۱-۲				
وضعيت مالی	متاهل					

جوانترها، زنان و مردان بلوچ در یکسال گذشته با رویدادهای استرس زای بیشتری رویرو گردیده‌اند. برای نمونه رویرو شدن جوانترها با رویدادهایی چون حاملگی خواسته و ناخواسته (مورد ۱۱ و ۳۰) انجام کار زیاد و داشتن پیشه دوم (مورد ۱۸) بالاگرفتن درگیری با همسر (مورد ۲۰) و آسیب پذیری روانی بیشتر آنها، بر اهمیت رویدادهای استرس‌زا در زندگی این گروه از افراد جامعه تأکید دارد.

### بحث در نتایج

از آنجاکه پیدایش استرس پدیده‌ای چندوجهی بوده و تعامل متغیرهای زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی در پیدایش آن مؤثرند، بنظر می‌رسد تعیین کمی استرس و استنتاج بیماری زایی آن در سطح فردی نادرست است. افزایش نمره انحراف معیار به موازات کم اهمیت شدن رخدادهای زندگی و نیز بالا بودن آن در بسیاری از رویدادها نشان می‌دهد که افراد، فشارزایی رویدادها را بسیار متفاوت ارزیابی می‌کنند. برای نمونه رویدادی توسط فردی نمره ۲۰ و توسط فرد دیگری نمره صفر داده شده است.

مقایسه جدول رتبه بندی رویدادهای استرس زای زندگی با پژوهش‌های مشابه (جدول ۶) نشان می‌دهد که ۱۰ رویداد اول در سه بررسی حاضر، متقی پور و همکاران (۱۳۶۸) و پیکل و همکاران (۱۹۷۱) با اندک تفاوتی، مشابه زیادی دارند. این یافته نشان می‌دهد که برخی رویدادها هنگامی که خاصیت فشار زایی آنها شدید باشد می‌توانند مستقل از مداخلات فرهنگی - قومی و ویژگی‌های روانشناختی افراد اثرات فشارزایی خود را اعمال کنند و این طرز تلقی با نظریه هلمز<sup>(۱)</sup> (راهه ۱۹۶۷) که استرس را بر مبنای محرك خارجی ارزیابی می‌کردند، مطابقت دارد. تفاوت بارز رتبه‌های بسیاری از رویدادهای زندگی در سه بررسی یادشده، از جمله ازدواج که در بررسی حاضر در رتبه ۵۵، در پژوهش متقی پور و همکاران

(۱۳۷۰) در رتبه ۲۹ و در پژوهش پیکل و همکاران (۱۹۷۰) در رتبه ۵۲ قرار دارد، گویای آن است که ارزیابی میزان فشارزایی بسیاری از رخدادهای زندگی صرفاً بر محرك بیرونی محدود نشده بلکه متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، به ویژه ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های سازگاری و مکانیزم‌های دفاعی فرد در آن مداخله می‌کنند. این یافته‌ها مؤید نظریه‌ای است که استرس را دستاورده تعامل محرك خارجی و مشخصات روانشناختی از جمله ارزیابی شناختی آن رویداد می‌داند (لازاروس<sup>(۲)</sup>، ۱۹۸۱).

در رابطه با نقش استرس در بروز بیماری، یافته‌های این پژوهش همانند پژوهش‌های گذشته (پیکل و همکاران، ۱۹۶۹؛ راهه، ۱۹۷۴؛ اندروز و تنانت، ۱۹۷۸؛ اندروز، ۱۹۸۱؛ بلیزر، ۱۹۸۷؛ ایروین، ۱۹۸۷؛ ونتورا، ۱۹۹۲؛ مفرسون، ۱۹۹۳؛ بینگتون، ۱۹۹۳). نشان داد که استرس همبستگی مثبتی با اختلال‌های روانی داشته ( $P < 0.05$ ) و بعنوان یک عامل خطرزای مهم تلقی می‌گردد. مقایسه نمره عالیم روانی و استرس با بررسیهای مشابه (با قری یزدی، ۱۳۷۳؛ میرزایی، ۱۳۵۹؛ دولت آبادی، ۱۳۷۳) نشان می‌دهد که آزمودنیهای پژوهش حاضر مشکلات روانی شدیدتری دارند (جدول ۷). بالا بودن نمره GSI ممکن است به علت شدید بودن نشانه‌های روانی و نیز حذف ۴ مورد از نشانه‌های روانی از SCL-90-R مانند وسوس و فویبا باشد؛ چراکه اگر آزمودنیها در موارد حذف شده نمره کمتری داشتند میانگین GSI پایین می‌آمد.

کمتری داشتند میانگین GSI که ملاک تفکیک افراد سالم از بیمار تلقی گردید، تحلیل رگرسیون نشان داد که کمیتی از استرس  $\frac{58}{3}$  با میانگین  $\frac{82}{0}$  GSI= مطابقت دارد. بدین ترتیب کسانیکه در یکسال گذشته با استرس برابر یا بیشتر از  $\frac{58}{3}$  واحد مواجه گردند احتمال بیشتری برای ابتلاء به اختلال روانی دارند.

جدول ۶- مقایسه ده رویداد استرس زای اول بر حسب میانگین در سه پژوهش، پژوهش حاضر، بررسی متقی پور و پژوهش پیکل

ردیف	رویداد استرس زای (پژوهش حاضر)	میانگین انحراف معیار رویداد استرس زای (متقی پور)	میانگین انحراف معیار رویداد استرس زای (پیکل)	ردیف	میانگین انحراف معیار رویداد استرس زای (متقی پور)	میانگین انحراف معیار رویداد استرس زای (پیکل)	ردیف
۱	مرگ همسر	۱/۹/۳۵	۱/۹/۴۷	۲/۲/۲۷	مرگ همسر	۱/۹/۱۱	۱/۹/۰۹
۲	مرگ فرزند	۱/۹/۱۱	۱/۹/۰۹	۲/۰/۹۸	محکومیت به زندان	۱/۸/۸۲	۱/۸/۰۱
۳	مرگ بیکی از اعضاء خانواده بهزه همسر	۱/۸/۱	۱/۸/۰۵	۱/۸/۱	خیانت همسر	۱/۷/۰۵	۱/۷/۰۱
۴	و فرزند مانند والدین، خواهر و برادر	۱/۸/۴۸	۱/۸/۰۱	۱/۸/۱	طلاق	۱/۸/۴۸	۱/۸/۰۱
۵	وجود اختیاه به مواد مخدر در حدائق بیکی از اعضاء خانواده	۱/۸/۴۵	۱/۸/۰۳	۱/۸/۳۵	مرگ فرزند	۱/۸/۰۳	۱/۸/۰۱
۶	خیانت همسر	۱/۸/۳۲	۱/۸/۰۷	۱/۸/۰۱	بسیاری شدن بیکی از اعضاء خانواده (به علت بیماری شدید)	۱/۸/۰۱	۱/۸/۰۱
۷	طلاق	۱/۸/۱	۱/۸/۰۱	۱/۸/۰۱	مرگ بیکی از اعضاء خانواده بهزه همسر (والدین، برادر یا خواهر)	۱/۸/۰۱	۱/۸/۰۱
۸	مشکلات مالی سنجین (بدهکاری سنجین، ورشکستگی)	۱/۷/۰۸	۱/۷/۰۲	۱/۷/۰۱	بیکاری دائم (نه اشتبه شغل ثابت)	۱/۷/۰۱	۱/۷/۰۱
۹	تنزل مقام	۱/۷/۰۱	۱/۷/۰۳	۱/۷/۰۳	بیماران هوایی شهر	۱/۶/۶۸	۱/۶/۶۳
۱۰	اختیار همسر دیگر توسط شوهر	۱/۷/۰۱	۱/۷/۰۱	۱/۷/۰۱	تنولد فرزند (برای مادر)	۱/۷/۰۱	۱/۷/۰۱

جدول ۷- مقایسه میانگین نمره های مقیاسهای پنج گانه آزمون SCL-90-R در پژوهش های باق ری یزدی، میرزا ای، دولت آبادی و پژوهش حاضر

مقیاسها	تحقيقات سه گانه	نمره میانگین(۱)	نمره میانگین(۲)	نمره میانگین(۳)	در پژوهش باق ری یزدی	در پژوهش دولت آبادی	در پژوهش حاضر	نمره میانگین	نمره میانگین(۱)	نمره میانگین(۲)	نمره میانگین(۳)
		۱۳۷۳	۱۳۵۹	۱۳۷۳							
جسمی سازی هیجانات	۰/۸۲	۰/۴۶	۰/۵۸	۰/۷۵	۰/۶۶	۰/۶۲	۰/۶۰	۰/۵۵	۰/۶۳	۱/۳۵	---
انسدادگی	۱/۰۱	۰/۴۹	۰/۳۵	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۶۲	۰/۶۰	۰/۲۰	۰/۳۵	۰/۳۶	۰/۳۵
اضطراب	۰/۸۸	۰/۴۶	۰/۳۶	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۲۰	۰/۳۵	۰/۳۵	۰/۴۰
پرخاشگری	۰/۸۱	۰/۳۱	۰/۳۵	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۵۵	۰/۶۳	۰/۳۵	۰/۴۰
روان پریشی	۰/۵۳	۰/۲۲	۰/۲۶	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۶۰	۰/۶۰	۰/۲۰	۰/۳۵	۰/۳۵	۱/۳۵
GSI											
PSDI											

می تواند به علت تفاوت های روان شناختی، فرهنگی، قومی و نیز زندگی جمعی و مت مرکز که در بیشتر خانواده های جامعه مورد بررسی وجود دارد و منبع خوبی برای حمایته ای لازم در شرایط استرس زا است، باشد.

مقایسه نشانه های روانی در میان گروه های مختلف (جدول ۴ و ۵) نشان می دهد که بروز بیماری در افراد مجرد، بلوچها، کسانی که تحصیلات ابتدایی دارند و زنان شیوع بیشتری داشته و از مشکلات روان شناختی شدیدتری در رنج می باشند ( $P < 0.05$ ).

فراآنی رویدادها در گروه های مختلف نشان می دهد که هر چند مردها، افراد جوانتر، زنان و مردان بلوچ با رویدادهای استرس زای بیشتری مواجه هستند ولی از میان آنها زنان بلوچ، افراد کم سواد و افراد مجرد آسیب پذیری بیشتری دارند.

- نمونه مورد بررسی در این پژوهش ساکنین مناطق روستایی می بود و توسط SCL-90-R مورد ارزیابی روانی قرار گرفته اند.
- نمونه مورد بررسی در این پژوهش گروهی از ساکنین تهران، گرگان و گنبد و برخی از شهرهای شمالی کشور بوده و توسط SCL-90-R ارزیابی شده اند.
- جامعه مورد بررسی در این پژوهش مهاجرین جنگ تحملی ساکن در تهران بوده و توسط SCL-90-R ارزیابی شده اند.

تفاوت اندک بین نمره میانگین استرس در یکسال گذشته (۵۷/۲) در کل آزمودنیها با حد مرضی استرس (۵۸/۳) گویای رویرو شدن آزمودنیها با استرس بالا می باشد و می توان انتظار داشت که اختلالهای روانی در آن جامعه شیوع بیشتری داشته باشد. هنگامی که ۴۲٪ آزمودنیها بالاتر از نقطه برش و ۳۸٪ آنها با استرس بالاتر از حد مرضی مواجه باشند، چنین فرضیه ای با قوت بیشتری مطرح می گردد.

مقایسه این نتایج با یافته های هلمز و راهه (۱۹۶۷) همخوانی ندارد. در نظریه آنها ۸۰٪ کسانی که در یکسال گذشته با ۳۰۰ واحد استرس مواجه گردیده باشند دچار بیماری می شوند. در این بررسی خط برش استرس که با بیماری زایی توأم است (۵۸/۳) و در مقیاس آنها که هر رویداد از صفر تا صد نمره گذاری گردیده این نمره برابر ۵/۵ است. در پژوهش حاضر ۳۸٪ آزمودنیها برابر ۲۹۱/۵ باشند. در پژوهش حاضر ۳۸٪ آزمودنیها برابر با ۲۹۱/۵ واحد استرس در یکسال گذشته داشته اند. به بیان دیگر در مقایسه با پژوهش پیشین با وجود نزدیکی مقدار استرس فقط ۳۸٪ کسانی که در یکسال گذشته با ۲۹۰ واحد استرس مواجه گردیده اند دچار اختلالهای عصبی - روانی خواهند شد. این تفاوت

## شماره ۹۶

متقی پور، یاسمن؛ مهاجر، مرتضی؛ کاتوزیان، بهروز (۱۳۶۸). رتبه بندی رویدادهای استرس زای زندگی: مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال چهاردهم، شماره ۱ و ۲.

سیرزایی، رقیه (۱۳۵۹). ارزیابی پایایی و اعتبار آزمون SCL-90-R در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران.

Andrews, G., & Tennant, C. (1978). Life events, stress, social support, coping style and risk of psychological impairment: *Journal of Nervous and Mental Disease*, 166, 5.

Andrews, G. (1981). A prospective study of life events and psychological symptoms. *Psychological Medicine*, 11, 295-301.

Bebbington, S., & Wilkins, J. P. (1993). Life events and psychosis. *British Journal of Psychiatry*, 162, 72-9.

Bebbington, S., (1993). Stress inoculation and the onset of affective disorder. *British Journal of Psychiatry*, 162, 358-62.

Blazer, D. (1987). Stressful life event and onset of a generalized anxiety syndrome. *American Journal of Psychiatry*, 144, 9.

Frank, E. (1994). Life events and the research diagnostic outcome & endogenous subtype. *Archive of General Psychiatry*, 51.

Holmes, T., & Rahe, H. (1967). The social readjustment rating scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11: 213-8.

Irwin, M. (1987). Life events, depressive symptoms and immune function. *American Journal of Psychiatry*,

هدف عمله این بررسی زمینه یابی و شناسایی عوامل استرس زا در گروههای مختلف و تبیین نقش استرس در بروز اختلالهای روانی است. از این رو از آنجا که نقطه برش بیماری‌زاوی مطرح شده ( $GSI=82$ ) از نظر حساسیت<sup>(۱)</sup> و ویژگی<sup>(۲)</sup> بررسی نگرددیده و مصاحبه بالینی مطابق با ملاکهای تشخیصی در تأیید یا رد وجود بیماری روانی انجام نشده، آمار مربوط به شیوع اختلالهای روانی تقریبی بوده و انجام مطالعه همه گیر شناسی جهت درستی این فرضیه پیشنهاد می‌شود. از محدودیتهای دیگر این بررسی که از نوع گذشته نگر می‌باشد و بر حافظه آزمودنیها متکی است، همانند بررسیهای مشابه امکان خطا و اشتباه در بیاد آوری خاطرات وجود دارد. بنابر این انجام پژوهش‌های مشابه به صورت آینده نگر پیشنهاد می‌شود.

## منابع

باقری یزدی، سید عباس؛ بوالهری، جعفر؛ شاه محمدی، داود (۱۳۷۳). بررسی همه گیری شناسی اختلالهای روانی در مناطق روستایی میبد یزد، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره یک، ۴۱-۳۲.

بهادرخان، جواد؛ براهنی، محمد تقی؛ شاه محمدی، داود (۱۳۷۲). بررسی همه گیر شناسی اختلالهای روانی در مناطق روستایی گناباد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپزشکی تهران.

دولت آبادی، شیوا، (۱۳۷۳). بررسی مسائل روانی - اجتماعی، مهاجرین جنگ تحملی، گزارش منتشر نشده، انتیتو روانپزشکی تهران.

کوپر، کارل ال. (۱۳۷۳). فشار روانی، راههای شناخت و مقابله، ترجمه مهدی قراچه داغی و شریعت زاده؛ تهران: انتشارات رشد.

متقی پور، یاسمن؛ مهاجر، مرتضی؛ کاتوزیان، بهروز (۱۳۷۰). رتبه بندی رویدادهای استرس زا در گروهی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دارو و درمان، سال هشتم،

144,4.

Jasmin, G., & Cantin, M. (1991). Stress. Basel: Karger Press.

Lazarus, A. A. (1981). The practice of multimodel behaviour therapy. New York: McGraw - Hill.

Mepherson, H., Herbison, P., & Romans, S. (1993). Life events and relapse in established bipolar. *British Journal of Psychiatry*, 163, 381-85.

Paykel, E. (1971). Scaling of life events. *Archive of General Psychiatry*, 25.

Paykel, S., & Meyers, J. (1969). Life events and depression. A controlled study. *Archive of General Psychiatry*, 21, 753-60.

Paykel, E., & Klerman, G. (1970). Treatment setting and clinical depression. *Archive of General Psychiatry*, 22, 11-21.

Rahe, H., & Floister, I. (1974). A model for life changes and illness research. *Archive of General Psychiatry*, 32.

Rahe, H., & Bennett, L. (1973). Subject's recent life changes and coronary heart disease in Finland. *American Journal of Psychiatry*, 130,

Ross, M. G. (1993). Stressful life events and schizophrenia: *British Journal of Psychiatry*, 162, 161-6.

Shari, L. W. (1993). Chronic life stress and treatment outcome in agoraphobia with panic attacks, *American Journal of Psychiatry*, 150,

Tennant, C. (1978). The cause of life events in neurosis, *Journal of Psychosomatic Research*, 22, 41- 45.

Ventura, J. (1992). Life events and schizophrenia relapse after withdrawal & medication. *British Journal of Psychiatry*, 161, 615-20.

Andeesheh  
Va  
Raftar  
اندیشه و رفتار  
۲۸

سال سه / شماره ۳ / زمستان ۱۳۹۶  
Vol.3/NO.3/Winter.1998

