



## شیوع اختلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی

محمد ناظر<sup>\*</sup>, دکتر عزت‌الله<sup>\*\*</sup>, احمد رضا صیادی<sup>\*\*\*</sup>

### چکیده

**هدف:** در بررسی حاضر رابطه میان شدت اختلالهای روانپزشکی و شدت وابستگی به مواد افیونی به عنوان یک پیش‌آگهی منشی در درمان افراد معتاد به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. **روش:** این بررسی از نوع توصیفی-مقطعی است. آزمودنیهای پژوهش را ۲۴۰ نفر (۲۳۲ مرد، ۸ زن) تشکیل داده‌اند که به تصادف از میان بیماران معتاد به مواد افیونی مراجعه کننده برای درمان انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، آزمون MMPI و مصاحبه روانپزشکی بوده است که به صورت انفرادی اجرا شده است. داده‌ها به کمک آزمونهای آماری خسی دو، تحلیل واریانس و روش توکی تحلیل گردیده است. **یافته‌ها:** شایعترین روش مصرف کشیان ترباک با سیخ و سنگ (۲۱/۱٪)، میانگین طول مدت مصرف ۵/۹۶ سال، میانگین سن شروع اعتیاد ۲۶ سالگی و میانگین دفعات ترک ۱/۱ مرتبه بوده است. ۵۰/۴٪ نمونه دارای یک یا چند تشخیص روانپزشکی بودند و به ترتیب اختلال شخصیت خد اجتماعی با ۲۵٪، افسردگی با ۲۰٪ و اخطراب با ۱۸/۳٪ شایعترین اختلالها بوده‌اند. این بررسی نشان داد که با افزایش شدت وابستگی به مواد شدت اختلالهای روانپزشکی پیشرفت شده است. به طوری که مصرف کنندگان ترباک با وانور و سیخ و سنگ به ترتیب ۳۰/۵٪ و ۳۹/۲٪ و تدخین و تزریق کنندگان هروئین به ترتیب ۷/۷٪ و ۹۲/۳٪ داری تشخیص روانپزشکی بودند. **نتیجه:** بیمار بودن معتادان دور از واقعیت نیست در درمان باید به شدت اعتیاد و تشخیص‌های روانپزشکی همراه توجه داشت. شدت اعتیاد نوعی پیش‌آگهی منشی در ترک ناموفق و بالاتر بودن همزمانی تشخیص‌های روانپزشکی است.

Andeeshieh  
Va  
Raftari  
اللهش و رفاري  
۳۸

**کلید واژه:** اختلالهای روانپزشکی، وابستگی به مواد افیونی، اعتیاد، ترباک، تشخیص همزمان

\*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، رفسنجان، بیمارستان مرادی، بخش روانپزشکی.

\*\*روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، رفسنجان، بیمارستان مرادی، بخش روانپزشکی.

\*\*\*کارشناس ارشد کاردیومانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، رفسنجان، بیمارستان مرادی، بخش روانپزشکی.

## مقدمه

بیماری توأم<sup>۱</sup> به تشخیص همزمان دو یا چند اختلال روانی در یک فرد گفته می‌شود. وابستگی به مواد افیونی و در کنار آن وجود سایر اختلالهای روانپزشکی همچون افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنیا و اختلالهای شخصیتی باعث مقاومت در درمان و بازگشت دوباره بیماری می‌گردد (گست فرنده، ۱۹۹۶؛ پانی،<sup>۲</sup> تروسگ،<sup>۳</sup> ۱۹۹۷). امروزه پرسشی که برای بسیاری از صاحب‌نظران کشور ما مطرح می‌باشد این است که آیا معتاد مجرم است یا بیمار؟ در بررسیهای انجام شده شیوع همبودی اختلالهای روانپزشکی و وابستگی به مواد افیونی بسیار متفاوت گزارش گردیده است. این تفاوت به روش پژوهش و نمونه مورد بررسی بستگی دارد، برای نمونه انجام پژوهش بر روی جمعیت عادی یا جمعیت درمانگاههای روانپزشکی یافته‌های متفاوتی ارائه خواهد داد (میلر،<sup>۴</sup> ۱۹۹۷).

یک بررسی زمینه یابی گستره نشان داد که ۷۶٪ مردان و ۶۵٪ زنان که سوء مصرف یا وابستگی به مواد داشته‌اند دارای یک تشخیص روانپزشکی می‌باشند و شایعترین اختلالها، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ترس‌های مرضی و اختلالهای افسردگی به ویژه افسرده خویی بوده است (برادی<sup>۵</sup> و همکاران، ۱۹۹۱). همچنین بررسی یاد شده نشان داد که ۳۵٪ تا ۶۰٪ مبتلایان به سوء مصرف یا وابسته به مواد شخصیت ضد اجتماعی و ۳۰٪ تا ۵۰٪ آنان چهار افسردگی و تقریباً ۲۰ بار بیشتر از جمعیت عادی اقدام به خودکشی داشته‌اند (کاپلان،<sup>۶</sup> سادوک،<sup>۷</sup> ۱۳۷۵).

ریچر<sup>۸</sup> و همکاران (۱۹۹۶)، به نقل از میلر،<sup>۹</sup> در پژوهشی شیوع اختلالهای روانی را در سوء مصرف کنندگان به مواد والکل به شرح زیر گزارش نمودند. اختلالهای خلقی ۲۶٪،

اختلالهای اضطرابی ۲۸٪، اسکیزوفرنیا ۶٪، شخصیت ضد اجتماعی ۱۷٪، سایر اختلالهای روانی ۵٪. ریچر در بیماران روانپزشکی شیوع اعتیاد را بررسی و به شرح زیر گزارش نمود: شیوع سوء مصرف مواد در اختلالهای خلقی ۱۹٪، در اختلالهای اضطرابی ۱۱٪، در اسکیزوفرنیا ۵٪، در اختلالهای شخصیتی ۴٪ و در سایر اختلالهای روانی ۱۴٪ گزارش نمود (همان‌جا).

میلر و همکاران (۱۹۹۰) تشخیص همزمان مصرف مواد والکل وجود یک اختلال روانی را در جمعیت عادی بررسی نمودند و دریافتند که ۸٪ مرد ها و ۲۳٪ زن ها با افسردگی، ۰٪ مرد ها و ۳٪ زن ها با اختلال دو قطبی، ۷٪ مرد ها و ۷٪ زن ها با اسکیزوفرنیا، ۱۴٪ مرد ها و ۱۰٪ زن ها با شخصیت ضد اجتماعی و ۱۳٪ مرد ها و ۷٪ زن ها با اختلال آسیمگی، ۱٪ مرد ها و ۳٪ زن ها با اختلال ترس مرضی همراه داشتند.

برونر<sup>۱۰</sup> و همکاران (۱۹۹۷)، به نقل از سادوک و سادوک،<sup>۱۱</sup> ۲۰۰۰ در پژوهشی شیوع اختلالهای شخصیتی در وابستگان به مواد افیونی را به شرح زیر گزارش کردند: کل اختلالهای شخصیتی ۴۰٪، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۳۳٪، اجتنابی ۳٪، مرزی ۱۳٪، منفعل مهاجم ۷٪، پارانوئید ۴٪، نمایشی ۸٪، خودشیفت ۱۶٪، وسوسی ۱٪. همچنین وی و همکاران آمار اختلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی را به شرح زیر گزارش کردند: اختلالهای خلقی ۱۱٪ در مرد ها و ۲۷٪ در زن ها، افسردگی اساسی ۸٪

1- comorbidity	2- Gastfriend
3- Pani	4- Trosgu
5- Miller	6- Brady
7- Kaplan	8- Sadock
9- Regier	10- Brooner

درمان دچار واپستگی دارویی می‌شوند. توبابن<sup>۱۱</sup> (۱۹۹۹) در پژوهشی نشان داد هنگامی که بیماری دارای دو تشخیص همزمان اختلالهای روانپزشکی و واپستگی دارویی یا الكل است، درمان هر دو اختلال با مشکلات بیشتری همراه است. آبراهام<sup>۱۲</sup> و فاوا<sup>۱۳</sup> (۱۹۹۹) نشان دادند که دلیل بالا بودن میزان اعتیاد دارویی در بیماران افسرده آن است که این بیماران با مصرف الكل یا کوکائین یا سایر مواد، نوعی خود درمانی انجام می‌دهند.

به طور کلی اعتیاد در بیماران روانی گونه‌ای درمان به شمار می‌رود (خانتزین<sup>۱۴</sup>، ۱۹۸۵ به نقل از میلر، ۱۹۹۷). شاید این مسئله یکی از دلایل همزمانی آنها باشد. مینکوف<sup>۱۵</sup> (۱۹۸۹)، به نقل از میلر، ۱۹۹۷)، گزارش کرد که درمان بیماران معتاد با تشخیص‌های روانپزشکی همراه نیاز به راهبردهای درمانی ویژه دارد. بروم<sup>۱۶</sup> و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که تشخیص‌های روانپزشکی همزمان در مصرف کنندگان مواد به عنوان معیاری برای ماندن در درمان و درمان موفق به شمار می‌رود. همچنین آنان نشان دادند که درمان مصرف کنندگان مواد با تشخیص روانپزشکی نسبت به مصرف کنندگان بدون تشخیص روانپزشکی موفقیت کمتری دارد. در پژوهش حاضر همزمانی واپستگی به مواد افیونی و اختلالهای روانپزشکی و برخی متغیرهای دیگر

در مسروطهای ۷٪/۲۳٪ در زنها، افسرده خویی ۴٪/برای مردها و ۴٪/۴٪ برای زنها، اختلالهای اضطرابی ۱٪/برای مردها، ۷٪/۱٪ برای زنها، ترس مرضی ساده ۹٪/۱٪ مردها و ۳٪/۵٪ در زنها، فوبی اجتماعی ۹٪/۱٪ در مردها و ۶٪/۳٪ در زنها، آسیمگی ۱٪/۴ در مردها و ۸٪/۱٪ در زنها، گزارش گردید. له مان<sup>۱</sup>؛ مه یر<sup>۲</sup>، کورتسی<sup>۳</sup>، تامپسون<sup>۴</sup> (۱۹۹۴) نشان دادند که اعتیاد در بیماران روانی شدت بیشتری دارد، یعنی میزان مصرف، سریعتر افزایش می‌باشد و واپستگی به مواد در آهارازودتر رخ می‌دهد. کوله‌و<sup>۵</sup>، رینج<sup>۶</sup>، راموس<sup>۷</sup> (۲۰۰۰) نشان دادند که بین میزان افسرده و شدت مصرف مواد و اعتیاد رابطه وجود دارد و هرچه افسرده شدیدتر باشد، اعتیاد مزمن‌تر خواهد بود. گلدشتاین و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که اعتیاد در مصرف کنندگان مواد و الكل دارای شخصیت ضداجتماعی زودتر مزمن می‌شود و اعتیاد آنها طولانی‌تر است.

افقه و خلیلیان (۱۳۷۵) نشان دادند که ۴٪/۴٪ از افراد معتاد پیش از گرایش به مواد افیونی ۱۳٪/٪ دچار نوعی افسرده‌گی بوده‌اند و گرایش به این مواد دچار افسرده‌گی شده‌اند.

طاهری و سمیعی (۱۳۷۶) نشان دادند که از کل مراجعان به مرکز ترک سربپایی بهزیستی تهران ۲۱٪/٪ سابقه ناهنجاری روانی پیشین و ۲۸٪/٪ سابقه خودکشی، همچنین در هنگام مراجعته ۲۰٪/٪ آنان از اضطراب، ۱۸٪/٪ از افسرده‌گی رنج می‌برده‌اند. ۸٪/٪ هم اضطراب و هم افسرده‌گی داشته‌اندو ۳۵٪/٪ دارای سایر اختلالهای روانی بوده‌اند.

پژوهش کروزی<sup>۸</sup>، ورتین<sup>۹</sup>، دکسویتز<sup>۱۰</sup> (۱۹۹۹) در زمینه تشخیص همزمان اختلالهای روانپزشکی در واپستگان به مواد افیونی در پیگیری ۵ ساله نشان داد بیمارانی که نشانه‌هایی از افسرده‌گی، اضطراب و رفتارهای ضداجتماعی دارند در طول

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1- Lehman    | 2- Myers      |
| 3- Corty     | 4- Thompson   |
| 5- Coelho    | 6- Range      |
| 7- Ramos     | 8- Krausy     |
| 9- Verthein  | 10- Deqchwitz |
| 11- Thobaben | 12- Abraham   |
| 13- Fava     | 14- Khantzian |
| 15- Minkoff  | 16- Brome     |

چون نوع ماده، روش مصرف، طول مصرف، سن و دفعات ترک مورد بررسی قرار گرفته است.

## روش

بررسی حاضر از نوع توصیفی - مقطعی است. هدف اصلی بررسی تشخیص همزمان اختلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی بوده است. جامعه مورد بررسی را کلیه مراجعان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان رفسنجان تشکیل داده‌اند. نمونه مورد بررسی ۲۴۰ نفر (۲۳۲ مرد، ۸ زن) بودند که به روش تصادفی نظام دار از میان مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهزیستی رفسنجان در مدت ۶ ماه از خرداد تا آذرماه ۱۳۷۹ انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها را یک پرسشنامه جمعیت شناختی دارای ۳۰ پرسش، پرسشنامه ۷۱ سؤالی MMPI و مصاحبه بالینی روانپزشکی تشکیل داده‌اند. مصاحبه بالینی روانپزشکی توسط روانپزشک یا کارشناس ارشد روانشناسی بالینی انجام گردیده است. برای بررسی اعتبار و همبستگی میان نتایج این آزمون و نتایج مصاحبه روانپزشکی ضریب همبستگی معاسبه شد و ضریب ۰/۷۸ بدست آمد و تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت انفرادی، طی ۲ جلسه در یک هفته صورت گرفته است.

تحلیل داده‌ها به کمک آزمونهای آماری، مجذور خی، تحلیل واریانس یک متغیری و روش توکی انجام شد. به دلیل محدودیت امکانات پژوهشی تنها ۸ تشخیص مطرح شده در آزمون MMPI مورد بررسی قرار گرفت. از ارائه سایر داده‌های بدست آمده در مصاحبه خودداری شده است.

## یافته‌ها

میانگین سنی نمونه مورد بررسی ۳۰ سال،

میزان تحصیلات ۳۷/۵٪ ابتدایی و ۳۷/۵٪ راهنمایی بوده است. ۷۴/۲٪ آزمودنیها متأهل و شغل ۳۰٪ آنها کارگر و بنا بود. با نگاهی به جدول شماره ۲ در میان ۸ روش مصرف، رایج‌ترین روش کشیدن تریاک با سیخ و سنگ و قلیان (۰/۲۸٪) و کشیدن تریاک با وافور (۰/۱۹٪) بود. کشیدن هروئین در ۱۵/۸٪ گزارش گردید. طولانی‌ترین مدت اعتیاد در تزریق شیره با میانگین ۱۵ سال و خوردن شیره با میانگین ۷/۹۳ سال و کشیدن شیره با ۷/۷ سال بود. کوتاه‌ترین مدت اعتیاد در کشیدن تریاک با سیخ و سنگ با میانگین ۴/۷۹ سال و با وافور ۵/۱ سال بود. میانگین مدت مصرف در کل نمونه ۵/۹۶ سال بوده است که با تحلیل واریانس و روش تعییبی توکی بین گروههای ۱ و ۷ (گروه ۲ و ۷) و (۲ و ۵) تفاوت معنی دار ( $p < 0/05$ ) و سایر حالتها تفاوت معنی دار نداشتند. سن شروع میانگین کل نمونه ۲۴ سالگی بود، در تزریق کنندگان هروئین ۱۸/۹ سالگی و در مصرف کنندگان شیره ۱۶ سالگی بوده است. اما مصرف کنندگان تریاک با وافور با میانگین ۲۸/۵ دیرتر از همه مصرف این ماده را آغاز کرده‌اند. تحلیل واریانس بین گروه کشیدن تریاک با وافور و گروه تزریق شیره و تزریق هروئین با روش توکی تفاوت معنی‌دار نشان داد. اما تفاوت سایر گروه‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود. میانگین ترک ناموفق قبلی در کل نمونه ۱/۱ مرتبه بوده است. ۶۰٪ آزمودنیها سابقه ترک پیشین داشتند. این بررسی نشان داد که با افزایش شدت اعتیاد شمار دفعات ترک ناموفق نیز افزایش می‌یابد بطوریکه میانگین ترک در مصرف کنندگان تریاک با وافور ۰/۶۷ دفعه و در تزریق کنندگان هروئین ۰/۲۸ دفعه بوده است. در گروه اخیر ۱۶٪ بدون سابقه ترک بودند. ۵۹ نفر (۰/۲۵٪) سابقه اعتیاد را در اعضای درجه اول

می شود. در مصرف کنندگان تریاک با وافور ۳۰/۵٪ و سینک و سینگ ۳۹/۲٪ دارای تشخیص روانپزشکی بودند در حالی که در مصرف کنندگان هروئین به شیوه دود کردن و تزریق به ترتیب ۷۳/۷٪ و ۹۲/۳٪ دارای یک یا چند تشخیص روانپزشکی بودند. که این تفاوت به کمک آزمون خی دو ( $\chi^2 = 27/2$ ,  $p < 0.001$ ) معنی دار بود.

خانواده خود گزارش نمودند. جدول ۳ نشان می دهد که ۵۰/۴٪ آزمودنیها دارای یک یا چند تشخیص روانپزشکی هستند که در آن شخصیت ضد اجتماعی با ۲۵٪، افسردگی با ۲۰٪ و اختلالهای اضطرابی با ۱۸/۳٪ بیشترین فراوانی را داشته اند. نکته مهم این که با شدت پیدا کردن اعتیاد در صد اختلالهای روانپزشکی بیشتر

جدول ۱- توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش بر حسب جنس، سن و میزان تحصیلات

درصد	فراوانی	متغیر	
۹۶/۶	۲۳۲	مرد	جنس
۳/۴	۸	زن	
۹/۲۲	۲۲	۱۱-۲۱	گروه سنی
۵۶/۲	۱۳۵	۲۲-۳۱	Andeesheh Va Raftari اندیشه و رفتار
۲۶/۲	۶۳	۳۲-۴۱	۴۲
۷	۱۷	۴۲-۵۱	
۰/۸۳	۲	۵۲-۶۱	
۰/۴	۱	۶۲-۷۱	
۶۳	۱۰	۱- بیساد	میزان تحصیلات
۳۷/۵	۹۰	۲- ابتدایی	
۳۷/۵	۹۰	۳- راهنمایی	
۱۴/۶	۳۵	۴- دیپلم	
۶/۲	۱۰	۵- دانشگاه	
۲۲/۵	۵۴	۱- مجرد	وضعیت تأهل
۷۴/۲	۱۷۵	۲- متاهل	
۲/۰	۶	۳- متارکه	
۰/۸	۲	۴- طلاق	
۴۱/۲	۳۴	۱- بیکار	شغل
۱۰	۲۴	۲- کارمند	
۲۲/۱	۵۳	۳- آزاد	
۳۵	۷۳	۴- کارگروپنا	
۴	۱	۵- سریاز	
۰/۴	۷	۶- خانه دار	
۲/۹	۲	۷- بازنشسته	
۱۹/۲	۴۶	۸- کشاورز	

جدول ۲- توزیع آزمودنیهای پژوهش بر حسب نوع ماده، روش و مقدار مصرف، سن اعتماد، دفعات ترک و وجود معتقد در خانواده

متغیر	قیلان									
	تدخین					سینگ				
	ن	ن	ن	ن	ن	تریاک	تریاک	تریاک	تریاک	تریاک
تعداد افراد نمونه	۲۴۰	۱۳	۲	۳۸	۲۹	۹	۳۴	۶۹	۴۶	
درصد	۱۰۰	۵/۴	۰/۸۳	۱۵/۸	۱۲/۱	۳/۸	۱۴/۲	۲۸/۸	۱۹/۲	
میانگین مقدار مصرف به گرم	۲/۲	۰/۰	۲/۱	۳	۴	۳/۰	۳	۴/۶		
حداکثر و حداقل مصرف	۰	۷	۶	۴/۶	۷	۹	۷	۱۸/۰		
میانگین طول مصرف به سال	۱	۴/۶	۱	۰/۹	۲/۳	۲/۰	۰/۰	۰/۰		
میانگین سن شروع	۵/۹۶	۷/۳	۱۰	۰/۰	۷/۹۳	۷/۷	۶/۶۷	۴/۷۹	۵/۱	
افراد با سابقه ترک میانگین	۲۴	۱۸/۹	۱۶	۲۱/۰	۲۳	۲۲	۲۵	۲۳/۹	۲۸/۵	
دفعات ترک	۱۴۵	۱۱	۲	۲۷	۲۰	۷	۲۲	۳۷	۱۹	
وجود معتقد در خانواده	۱/۱	$\bar{X}=۲/۳۸$	$\bar{X}=۴/۰$	$\bar{X}=۱$	$\bar{X}=۱/۴$	$\bar{X}=۲/۴$	$\bar{X}=۱$	$\bar{X}=۱$	$\bar{X}=۰/۷۷$	
وایستگان به مواد افیونی (n=۲۴۰)	۰۹	۳	۰	۹	۷	۱	۱۰	۲۳	۶	

جدول ۳- درصد تشخیص همزمان یک یا چند بیماری با توجه به نوع ماده و روش مصرف در  
وابستگان به مواد افیونی (n=۲۴۰)

نوع اختلال	روش مصرف									
	تریاک (درصد) سینگ (درصد) قیلان (درصد)	تریاک (درصد) سینگ (درصد) وافور (درصد)								
افسردگی	۲۰/۴	۶۹	۰۰	۲۸/۹	۳۱	۱۱/۱	۱۸/۹	۱۳	۴/۳	
هیپومانی و مانيا	۰/۸	۳۸	۰	۰/۲	۳/۴	۱۱/۱	۸/۸	۱/۴	۲/۱	
اضطراب	۱۸/۳	۷۷/۹	۰۰	۲۱	۳۱	۱۱/۱	۲/۹	۱۴/۴	۸/۶	
خودبیمارانگاری	۱۰/۴	۱۵/۳	۰۰	۱۸/۴	۱۷/۲	۴۴/۴	۰/۸	۲/۸	۷/۰	
اسکیزوفرنی	۷/۶	۳۸	۰	۷/۸	۶/۸	۲۲/۲	۰/۸	۱/۴	۲/۱	
ضداجتماعی	۲۵	۴۶	۰۰	۳۱/۵	۳۴/۴	۴۴/۴	۲۴/۴	۱۸/۸	۱۰/۸	
هیستری	۱۲/۹	۷/۶	۰	۱۰/۵	۱۳/۷	۱۱/۱	۱۸/۹	۱۳	۱۰/۸	
افکار پارانوئید	۱۷/۱	۵۳/۸	۰۰	۳۱/۵	۲۷/۵	۳۳/۳	۱۱/۷	۷/۲	۲/۱	
بی تشخیص *	۴۹/۶	۷/۷	۰۰	۶۲/۳	۴۱/۳	۴۴/۴	۰۰	۶۰/۸	۶۹/۶	
تشخیص **	۵۰/۴	۹۲/۳	۰۰	۷۳/۷	۰۸/۷	۰۰/۶	۰۰	۳۹/۲	۳۰/۵	

\* بی تشخیص روانپزشکی      \*\* با یک یا بیش از یک تشخیص روانپزشکی

## بحث

است. به بیان دیگر مصرف کنندگان هروئین بیشتر جوان بوده‌اندو زودتر با مواد آشنا شده‌اند. مصرف کنندگان تریاک با وافور در ۲۸/۵ سالگی با این ماده آشنا شده‌اند و تزریق کنندگان شیره و هروئین به ترتیب در ۱۶ سالگی و ۱۸/۹ سالگی با مواد آشنا شدند. این امر نشان می‌دهد که آشنایی زودتر با مواد یک عامل خطر به شمار می‌رود.

از نظر وجود اختلالهای روانپزشکی با اعتیاد، یافته‌های به دست آمده با پژوهش‌های ریچر<sup>۱</sup> و همکاران (۱۹۹۰) به نقل از میلر، (۱۹۹۷)، برادی<sup>۲</sup> و همکاران (۱۹۹۱) و برونر<sup>۳</sup> و همکاران (۱۹۹۷) به نقل از سادوک سادوک، (۲۰۰۰) هماهنگی دارد. به طور کلی در بررسیهای انجام شده بر افسردگی، شخصیت ضد اجتماعی و اضطراب تأکید شده است.

میزان افسردگی در پژوهش حاضر ۲۰/۵٪ و در بررسی ریچر و همکاران (۱۹۹۰) به نقل از میلر، (۱۹۹۷) ۲۶/۴٪ و در پژوهش برونر و همکاران (۱۹۹۷) به نقل از سادوک سادوک (۲۰۰۰) ۱۱/۴٪ در مردها و ۲۷/۵٪ در زنها و در بررسی ظاهري و سمیعی (۱۳۷۶) ۱۸٪ گزارش شده است. شخصیت ضد اجتماعی در پژوهش حاضر ۲۵٪، در بررسی ریچر ۱۷/۵٪ و در بررسی برونر و همکاران ۳۳/۹٪ گزارش گردیده است. در پژوهش حاضر اضطراب ۱۸/۳٪ در برابر ۲۸/۳٪ در بررسی ریچر و همکاران (۱۹۹۰) به نقل از میلر، (۱۹۹۷) ۶/۱٪ در مردها و ۱۰/۷٪ در زنها در بررسی برونر و همکاران (۱۹۹۷) به نقل از سادوک سادوک، (۲۰۰۰) بوده است.

یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر افزایش

این پژوهش نشان داد که میانگین سن نمونه مورد بررسی ۳۰ سال و ۵۶٪ آنان ۲۲-۳۱ ساله بوده‌اند. این یافته نشان می‌دهد که ده سوم زندگی دهه پر خطری برای اعتیاد به شمار می‌رود. همچنین ۹۶/۶٪ نمونه را مردان تشکیل می‌دهند. از این رو باید اعتیاد را مشکل مردان جامعه دانست. ۷۵٪ آزمودنیها تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و تنها ۴/۲٪ تحصیلات بالای دیپلم داشته‌اند. این یافته ظاهرآ نشان می‌دهد که افراد با تحصیلات پایین احتمال درگیری بیشتری با مشکل اعتیاد دارند. از سوی دیگر نسبت افراد بالای دیپلم در جامعه نیز کمتر است.

از نظر شغل ۱۴/۲٪ نمونه بی کار و ۳۵٪ کارگر و بنا بوده‌اند که خود نشان دهنده وضعیت اقتصادی اجتماعی نابسامان معتمدان است.

اصلی‌ترین مصرف دود کردن تریاک با سیخ و سنگ (۲۸/۷٪) است و به دنبال آن دودکردن تریاک با وافور (۱۹/۲٪) و سپس دودکردن هروئین با (۱۵/۸٪) قرار دارد. این بررسی نشان داد که روش مصرف با وضعیت اقتصادی- اجتماعی و طول مدت اعتیاد تغییر می‌کند. عمولاً معتمدان مصرف تریاک را به روش دود کردن به وسیله وافور شروع می‌کنند، سپس به شیوه زیر تغییر می‌دهند: تریاک با سیخ و سنگ، تریاک خوردن، تدخین شیره، خوردن شیره، تدخین هروئین، تزریق شیره و در نهایت به تزریق هروئین می‌رسند. میانگین مصرف در تریاک با وافور ۴/۶ گرم و در هروئین ۲/۱ گرم بود. میانگین مدت اعتیاد مصرف کنندگان با وافور ۵/۱ سال در مصرف کنندگان شیره به شکل تدخین ۷/۷ سال و به شکل خوردن ۷/۹ سال و تزریق شیره ۱۵ سال بوده است. این رقم در وابستگان به هروئین ۵/۵ سال و سن شروع اعتیاد در آنها ۲۱/۵ سال بوده

- inpatient psychiatric sample. *American Journal of Drug & Alcohol Abuse*, 17, 389-399.
- Coelho, R., Range, I. R., Ramos, E. (2000): Depression and severity of substance abuse. *Psychopathology*, 33, 103-109.
- Gastfriend, D.R.(1996). When a substance use disorder is the cause of treatment resistance. In B.K. Pollak, H. Mark(Eds.). *Challenges in clinical practice: Pharmacologic and psychosocial strategies*. New York, Guilford press.
- Goldstein, R. B., Powers, S.I., Mccusker, J. (1999). Antisocial behavioral syndromes among residential drug abuse treatment clients. *Drug & Alcohol Dependence*, 53, 171-187.
- Lehman, A. F., Myers, C. P., Corty, E., & Thompson, J. (1994). Severity of substance use disorder among psychiatric in patients. *Journal of Nervous and Mental Diseases*, 182, 104-107.
- Sadock, B. J., Sadock, V. B. (2000). *Comprehensive textbook of psychiatry* (7<sup>th</sup>ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Krausy, M., Verthein, V., Deqxwitz, P.(1999). Psychiatric comorbidity in opiate addicts. *European Addict Researches*, 5, 55-62.
- Miller, N. S., Mahler, J. C., Belkin, B. M. (1990). Psychiatric diagnosis in alcohol and drug dependence. *Annual of Clinical Psychiatry*, 3, 79-89.
- Miller, N.S. (1997). *The principles and practice of addiction in psychiatry*, Philadelphia: W. B. Saunders Company.
- Pani, P. P., Trosgu, E., & Contu, P. (1997). Psychiatric severity and treatment response in a comprehensive methadone maintenance treatment programme. *Drug and Alcohol, Dependence*, 48, 119-126.
- Thobaben, M. (1999). Dual disorders: Clients suffering from psychiatric disorders and alcohol or drug abuse disorders. *Home-Care Providing*, 12, 52-53.

درصد اختلالهای روانی با شدت یافتن وابستگی به مواد افیونی با یافته‌های پژوهشی له مان و همکاران(۱۹۹۴) و کولهـو و همکاران (۲۰۰۰) هماهنگی دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و سایر بررسیها می‌توان گفت که در درمان اعتیاد توجه به سایر اختلالهای روانپزشکی همراه ضروری است. از سوی دیگر توجه به شدت اعتیاد به عنوان عاملی برای شدت بخشیدن اختلالهای روانی و پیش آگهی منفی در درمان نیز اهمیت دارد. با توجه به بالا بودن میزان ترک ناموفق در معتمدان شدید مانند مصرف کنندگان هروئین در مقایسه با مصرف کنندگان تریاک نیاز به توجه درمانگران به راهبردهای خاص در درمان این بیماران و جلوگیری از اعتیاد مجدد را نشان می‌دهد.

## منابع

- افقه، سوسن: خلیلیان: علیرضا (۱۳۷۵). بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به مواد افیونی در استان مازندران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سال ۶ شماره ۱۲، ۲۹-۳۵.
- کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین؛ کرب، جک (۱۳۷۰). خلاصه روانپزشکی؛ ترجمه نصرت ا... پورافکاری. تهران: شهرآب.
- طاهری، حمیدرضا؛ سمعی، مرسله (۱۳۷۶). بررسی علل و عوامل شروع اعتیاد در سنین کودکی و نوجوانی. خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان. زنجان، ۲۳-۲۵ مهر.
- Abraham, H.D., Fava, M. (1999). Order of onset of substance abuse and depression in a sample of depressed outpatients. *Comprehensive Psychiatry*: 40, 44-50.
- Broome, K. M., Flynn, P. M., Simpson, D.D. (1999). Psychiatric comorbidity measures a predictors of retention in drug abuse treatment programs. *Health Services and Researches*, 34, 796-806.
- Brady, K., Lydrrard, R. B. (1991). Substance abuse in an