



با کلوفن و کلونیدین در سمزدایی مواد افیونی

دکتر سید علی احمدی ابهری^{*}، دکتر امیر شعبانی^{**}، دکتر شاهین آخوندزاده^{***}، دکتر سید محمد اسعدي^{****}

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان اثربخشی و عوارض درمان با کلوفن و کلونیدین در سمزدایی مواد افیونی انجام شده است. **روش:** در یک مطالعه دوسرکور ۲۶ بیمار سرپا بی با تشخیص وابستگی به مواد افیونی (طبق ملاک های DSM-IV) به طور تصادفی با کلوفن ($n=32$) یا کلونیدین ($n=34$) به مدت ۱۴ روز دریافت کردند. **یافته ها:** مردو دارو اثربخشی مشابهی را در مورد نشانه های فیزیکی و روانی نشانگان ترک نشان دادند. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر مقیاس های افسردگی و اضطراب دیده شد. نیمرخ عوارض جانبی در دو گروه کم و بیش مشابه بود، به جز موارد «استفراغ» و «سرخوشی» که به طور معنی داری در گروه با کلوفن بیشتر دیده شد. **نتیجه:** با کلوفن را می توان از جهات مختلف معادل کلونیدین در سمزدایی مواد افیونی در نظر گرفت.

کلید واژه: باکلوفن، کلونیدین، مواد افیونی، سمزدایی

مقدمه

می کند. بیشتر از دو گروه دارویی در سمزدایی این مواد استفاده می شود: آگونیست ها- آنتاگونیست های مواد افیونی و آگونیست های آر آدرنرژیک (مانند کلونیدین^۱). هر یک از این داروها دارای ناکارآمدی ها و زیان هایی هستند که درمان را دشوار می کنند؛ مانند میزان بالای ریزش^۲، عوارض جانبی- مانند افت

درمان سندرم ترک (سم زدایی) گامی مهم در درمان وابستگی به مواد افیونی است. سندرم ترک در افراد وابسته به مواد افیونی طی ۶ تا ۸ ساعت پس از آخرین مصرف شروع می شود، در روز دوم و سوم به بالاترین شدت می رسد و طی ۷ تا ۱۰ روز فروکش

* روانپژشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران. تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه.

** روانپژشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. تهران، کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج، مرکز آموزشی - درمانی روانپژشکی ایران (نویسنده مسئول).

*** پسیکوفارماکولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران. تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه.

**** روانپژشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران. تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه.

و کلونیدین در سم زدایی افراد وابسته به مواد افیونی (آخوندزاده و همکاران، ۲۰۰۰؛ احمدی ابهری و همکاران، ۲۰۰۱) نشان داده شد که طی ۱۴ روز تفاوت معنی‌داری از نظر باقی‌ماندن افراد در برنامه درمانی و نشانه‌های فیزیکی ترک مواد افیونی بین دو گروه وجود نداشت. در حالی که افراد گروه باکلوفن به‌طور معنی‌داری نشانه‌های روانی و افت وضعیتی فشارخون کمتری داشتند.

بررسی حاضر با دو هدف انجام شد: اول آن‌که، چون مطالعه پیش اولین آزمایش بالینی برای ارزیابی اثربخشی باکلوفن در سم زدایی مواد افیونی با نمونه‌ای کم‌وپیش کوچک بود، در این بررسی با تکرار تجربه، فرضیه پیش‌گفته با نمونه‌ای جدید و معیارهایی دیگر دوباره ارزیابی شد. دوم آن‌که، همان‌گونه که اشاره شد یک یافته جالب بررسی‌های پیشین در کمترین‌دن نشانه‌های روانی در گروه باکلوفن بود که با یک فهرست پنج علامتی ارزیابی می‌شد. نویسنده‌گان این بار با تمرکز بیشتر بر این موضوع و برای افزایش پایایی^{۲۲} و روایی^{۲۳} نتایج، اقدام جدیدی نمودند.

روش

در مجموع ۶۶ بیمار (۶۵ مرد، ۱ زن) مراجعه‌کننده به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان روزبه که دارای معیارهای کامل وابستگی به مواد افیونی (طبق DSM-IV^{۲۴}) بودند پس از دریافت رضایت آگاهانه به‌طور تصادفی و یکی در میان (به دلیل

-
- | | |
|---|----------------------------|
| 1-Gamma-aminobutyric Acid | |
| 2- Synergism | 3- baclofen |
| 4- Gordon | 5- Galeotti |
| 6- Ghelardini | 7- Bartolini |
| 8- GABA-ergic | 9- Wise |
| 10- Bardo | 11- Willick |
| 12- Kokkinidis | 13- ventral tegmental area |
| 14- mesolimbic | 15- accumbens |
| 16- Xi | 17- Stein |
| 18- Chahl | 19- Chieng |
| 20- Christie | 21- Capasso |
| 22- reliability | 23- validity |
| 24- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV | |

فشارخون و رخوت ناشی از کلونیدین- و خطر وابستگی به آگونیست‌های مواد افیونی مثل متادون. بنابراین، یافتن جایگزین‌هایی که دارای اثربخشی بیشتر، عوارض جانبی کمتر و فاقد خطر وابستگی بیمار باشد ارزشمند خواهد بود.

در سال‌های گذشته شواهد ناچیزی در مورد تعامل بین گیرنده‌های GABA_B^۱ و افیونی به دست آمده است. اثر سینرژیسم^۲ بین آگونیست‌های این گیرنده‌ها روی درد وجود دارد. باکلوفن^۳ آگونیست گیرنده GABA_B. اثر ضد درد مورفين (آگونیست گیرنده افیونی مل) را در درمان درد پس از عمل جراحی تقویت می‌کند (گوردون^۴ و همکاران، ۱۹۹۵). به نظر می‌رسد، که هر دو گیرنده دارای سازوکار عمل زیینه‌ای مشابهی هستند؛ به‌گونه‌ای که مورفین و باکلوفن از طریق فعال کردن پروتئین‌های G حساس به سم سیاه سرفه باعث اثر ضد درد مرکزی می‌شوند (گالاثوتی^۵، قلاردینی^۶ و بارتولینی^۷، ۱۹۹۶). تجربه‌های آزمایشگاهی اثرات واسطه‌ای و تنظیم‌کننده سامانه گاباائرژیک^۸ را در سازوکارهای پاداش مغز نشان داده است (وایس^۹، ۱۹۹۸؛ باردو^{۱۰}، ۱۹۹۸؛ ویلیک^{۱۱} و کوکینیدس^{۱۲}، ۱۹۹۰). هم‌چنین نیز نشان داده شده است که باکلوفن می‌تواند با فعال کردن گیرنده‌های GABA_B در VTA^{۱۳} و از طریق افزودن غلظت GABA در مژولیمبیک^{۱۴} آزادشدن دوپامین را در هسته آکومبنس^{۱۵} مهار کند و مانع تقویت مصرف هروئین شود (ایکس‌آی^{۱۶} و اشتین^{۱۷}، ۱۹۹۹؛ ایکس‌آی و همکاران، ۲۰۰۰). جالب‌تر آن‌که شواهدی آزمایشگاهی موجودند که بر مهار واکنش‌های ترک مواد افیونی توسط باکلوفن دلالت دارند (کاہل^{۱۸}، ۱۹۹۰؛ چینگ^{۱۹} و کریستی^{۲۰}؛ کاپاسو^{۲۱}، ۱۹۹۹؛ زرین دست و موسی احمدی، ۱۹۹۹). در مجموع، این یافته‌های مقدماتی احتمال اثر بخشی با کلوفن را در درمان نشانگان ترک مواد افیونی مطرح می‌کنند.

در بررسی‌های پیشین در یک آزمایه دوسر کور، تصادفی و کنترل شده برای مقایسه اثر بخشی باکلوفن

جمعیت شناختی و سایر متغیرهایی که می‌توانند بر پیامدهای سم‌زدایی تأثیر بگذارند ثبت شدند. تعداد قرص‌های مصرفی در دو گروه یکسان بود. باکلوفن با مقدار مصرف روزانه ۱۵ میلی‌گرم شروع می‌شد و به تدریج به ۴۰ میلی‌گرم در روز چهارم می‌رسید و تا روز دهم با همین مقدار ادامه می‌یافتد. کلونیدین با مقدار مصرف روزانه $0/3$ میلی‌گرم آغاز می‌شد و به تدریج به $0/8$ میلی‌گرم در روز چهارم می‌رسید و تا روز دهم با همین مقدار ادامه می‌یافتد. پس از ده روز اول، در هر دو گروه مقدار مصرف دارو به تدریج کاهش می‌یافتد و در پایان قطع می‌شود. داروها در هر دو گروه به صورت سه و عده در روز داده می‌شوند. شدت نشانه‌های فیزیکی ترک با "پرسشنامه کوتاه‌مدت ترک مواد افیونی" (SOWS)^۳ ارزیابی شد که شامل ده ماده تهوع، کرامپ‌های شکمی، اسپاسم‌های عضلانی، احساس سرما، کوبش قلب، تنفس عضلانی، درد، خمیاز، اشک ریزش و مشکلات خواب می‌باشد. SOWS مقیاسی است که نوع ۳۲ ماده‌ای آن بارها بررسی شده و نوع ده ماده‌ای آن نیز که در این مطالعه به کار رفته توسط گوسوب^۴ مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی نشان داده که همبستگی بین این دو نوع SOWS قابل توجه است ($r=0.97$). هم‌چنین او نشان داده که نوع ده ماده‌ای آن نیز دارای روایی معیاری است و نمره آن طی مرحله حاد ترک افزایش می‌یابد و سپس به تدریج به میزان طبیعی برمی‌گردد (گوسوب، ۱۹۹۰). برای نمره گذاری این پرسشنامه هر ماده آن از صفر تا سه نمره می‌گیرد. بیماران به تصادف در دو گروه درمان باکلوفن یا کلونیدین جای داده می‌شوند. در صورتی که بیمار دوره ۱۴ روزه را به پایان می‌برد و نتیجه آزمایش ادرار مواد افیونی نیز منفی می‌شد «کامل کننده» به شمار می‌رفت. بیماران می‌توانستند در هر مرحله از پژوهش به میل خود از بررسی خارج شوند.

1- cannabis

2- hallucinogen

3- Short Opioid Withdrawal Scale

4- Gossop

دوسرکوربودن بررسی توسط فردی غیر از درمانگر) در یکی از دو گروه باکلوفن یا کلونیدین برای سم‌زدایی جای داده شدند. میانگین سن بیماران گروه باکلوفن ۳۳ سال (انحراف معیار $10/4$) و میانگین سن گروه کلونیدین، $32/6$ (انحراف معیار $6/7$) بود. میانگین سن شروع در آزمودنی‌های گروه باکلوفن $24/7$ (انحراف معیار، $8/1$) و در گروه کلونیدین $22/7$ (انحراف معیار، $5/1$ ، میانگین مدت مصرف مواد در گروه باکلوفن، $5/1$ سال (انحراف معیار، 5) و در گروه کلونیدین $6/6$ (انحراف معیار، $4/8$) بود. میانگین شمار ترک‌های پیشین در گروه باکلوفن، $1/9$ و در گروه کلونیدین، $2/8$ بار بود. تفاوت معنی‌داری میان ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران در دو گروه یافت نشد. این ویژگی‌ها در جدول ۱ نشان داده شده است.

ماده مصرفی	۱۰٪ افراد هروئین و ۹۰٪ تریاک بود.
بیشتر معتادان به هروئین آن را به صورت تزریقی به کار می‌برند. بیشتر معتادان به تریاک آن را به صورت استنشاقی ($48/3$) یا خوراکی ($41/7$) مصرف می‌کرند. مدت مصرف مواد افیونی به‌طور متوسط $5/84$ سال بود ($4/93 =$ انحراف معیار). همه موارد به صورت سرپایی انجام شد. سن آزمودنی‌ها بین $۶۰/۱۸$ سال بود و رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش داده بودند. افراد زیر از بررسی کنار گذاشته شدند: بیمارانی که باردار یا شیرده بودند، فشارخون سیستولیک کمتر از 90 میلی متر جیوه داشتند، بیماری طبی ناپایدار و جدی داشتند، از سایر داروها استفاده می‌کردند، سابقه پسیکوز، مانیا یا افسردگی اساسی شدید داشتند، به‌طور هم‌زمان به الکل، کوکائین، کانایس ^۱ یا داروهای توهمندا ^۲ وابسته بودند یا سابقه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و یا عقب ماندگی ذهنی داشتند.	

از بیماران در ابتدای ورود به بررسی، تاریخچه روانپزشکی و تاریخچه مشکلات طبی گرفته شد و نیز یک مصاحبه نیمه ساختار یافته با ملاک‌های تشخیصی DSM-IV و معاینه بدنی انجام گرفت. ویژگی‌های

برای ارزیابی نشانه‌های روانی از یک فهرست پنج ماده‌ای شامل کج خلقی، اضطراب، بی‌قراری، تحریک‌پذیری و میل به مصرف مواد استفاده شد که از صفر تا سه نمره برای هر ماده در نظر گرفته شد. همانند بررسی پیش (آخوندزاده و همکاران، ۲۰۰۰) یک نمره کلی نیز برای مجموع نمرات SOWS، نشانه‌های روانی و یک نشانه فیزیکی اضافی که در SOWS وجود ندارد (اسهال) در نظر گرفته شد. شدت عوارض جانبی نیز با یک فهرست ۲۳ ماده‌ای ارزیابی شد که شامل مواردی می‌شد که در منابع مختلف به عنوان عارضه مصرف این دارو گزارش شده است (احمدی ابهری و همکاران، ۲۰۰۱). همه ملاک‌های سنجش یادشده در روزهای صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۴ ارزیابی و ثبت شدند. مقیاس ۱۷ ماده‌ای اندازه گیری افسردگی هامیلتون (HDRS)^۱ (حداقل = صفر، حداکثر = ۵۰) و مقیاس اندازه گیری اضطراب هامیلتون (HARS)^۲ (حداقل = صفر، حداکثر = ۵۶) نیز در روزهای صفر، ۷ و ۱۴ ارزیابی و ثبت شدند.

آزمون اضطراب هامیلتون در اواخر دهه ۱۹۵۰ برای ارزیابی نشانه‌های جسمانی و شناختی تهیه شد. این آزمون دارای ۱۴ ماده است و هر ماده از صفر تا چهار نمره می‌گیرد. نمره ۱۴ به عنوان آستانه اضطرابی (که از نظر بالینی معنی‌دار است) مطرح شده است. این آزمون برای استفاده درمان‌گران بالینی طراحی شده و دارای پایایی کم و بیش خوبی بر اساس مطالعه‌های همخوانی درونی، بین آزمون‌گر و آزمون - بازآزمون می‌باشد. روایی آزمون نیز نسبت به سایر مقیاس‌های اضطراب خوب است. برای پیگیری پاسخ درمانی در بررسی‌های مربوط به اختلال اضطرابی منتشر به طور گسترشده‌ای از

جدول ۱- ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در بیماران مورد بررسی در دو گروه باکلوفن و کلونیدین

متغیر	باکلوفن (n=۳۲)	کلونیدین (n=۳۴)	جنس
مرد	فراوانی (درصد) (۹۶/۹)۳۱	فراوانی (درصد) (۱۰۰)۳۴	منس
زن	(۳/۱)۱	(۰)۰	
تأهل			
متأهل	(۵۹/۴)۱۹	(۶۷/۶)۲۳	هرگز ازدواج نکرده
مطلقه / بیوه	(۴۰/۶)۱۳	(۳۲/۴)۱۱	
تحصیلات			
زیر دپلم	(۵۳/۱)۱۷	(۷۹/۴)۲۷	دپلمه
دپلمه	(۳۷/۵)۱۲	(۱۷/۶)۶	
اشتغال			
تحصیلات دانشگاهی	(۹/۴)۳	(۲/۹)۱	بیکار
بیکار	(۳۴/۴)۱۱	(۱۷/۶)۶	
وضعیت زندگی			
شاغل	(۶۵/۶)۲۱	(۸۲/۴)۲۸	با خانواده یا هم خانواده پایدار
با خانواده یا هم خانواده پایدار	(۹۳/۸)۳۰	(۹۴/۱)۳۲	
مصرف مواد در خانواده بیمار			
تنهای	(۳/۱)۱	(۰)۰	سایر موارد
سایر موارد	(۳/۱)۱	(۵/۹)۲	
مصرف مواد در سایر افراد			
وجود ندارد	(۵۶/۳)۱۸	(۷۳/۵)۲۵	مهم زندگی:
وجود دارد	(۴۳/۷)۱۴	(۲۶/۵)۹	
نوع ماده افیونی:			
وجود ندارد	(۲۵)۸	(۱۴/۷)۵	هروئین
وجود دارد	(۷۵)۲۴	(۸۵/۳)۲۹	
روش مصرف ماده افیونی:			
ترویاک	(۹۰/۶)۲۹	(۹۱/۲)۳۱	استنشاقی
استنشاقی	(۵۰)۱۶	(۴۱/۲)۱۴	
تزریقی			
خوراکی	(۶/۳)۲	(۸/۸)۳	تزریقی
تزریقی	(۴۰/۶)۱۳	(۵۳/۳)۱۲	
چندراه			
چندراه	(۳/۱)۱	(۱۴/۷)۵	

ب. شدت سندرم ترک. تغییرات اندازه‌های SOWS نشانه‌های روانی و نشانه‌های کلی طی دوره سم زدایی با باکلوفن و کلونیدین در نمودارهای ۱ تا ۳ نشان داده شده است. با هر سه مقیاس اثر اصلی زمان^۰ معنی‌دار و منحنی مربوطه به شکل چهاربعدی^۱ و با حداقل شدت نشانه‌ها در روز سوم بود. اثر اصلی گروه درمانی^۷ در مورد هر سه مقیاس یادشده معنی‌دار نبود، هر چند این اثر در مورد مقیاس نشانه‌های روانی بسیار نزدیک به معنی‌داری است ($p=0.051$, $df=1/28$, $F=4/14$) و میانگین مقیاس نشانه‌های روانی در گروه باکلوفن در کل دوره سم زدایی کمتر از گروه دیگر بود. تعامل معنی‌داری میان عوامل زمان و گروه درمانی در مورد هیچ یک از سه مقیاس یادشده وجود نداشت.

ج. افسردگی و اضطراب. اثر اصلی زمان در مورد مقیاس‌های HDRS و HARS معنی‌دار ($p<0.05$) و منحنی مربوط چهاربعدی بود، ولی اثر اصلی گروه درمانی و تعامل زمان- گروه درمانی در مورد هیچ یک از دو مقیاس یادشده معنی‌دار نشد.

د. عوارض جانبی. در کل از نظر شدت عوارض جانبی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه باکلوفن و کلونیدین وجود نداشت ($p=0.99$, $df=1/21$, $X^2=2/71$). با این حال، دو عارضه استفراغ و سرخوشی^۸ به‌طور معنی‌داری با مصرف باکلوفن بیش از مصرف کلونیدین در ارتباط بود (استفراغ: ۳۳٪ در برابر ۰٪، $p<0.05$; سرخوشی: ۴۶٪ در برابر ۰٪، $p<0.01$: آزمون دقیق فیشر از نظر بروز افت وضعیتی فشارخون نیز تفاوت بین دو گروه را معنی‌دار نشان نداد.

این آزمون استفاده می‌شود (Sadock و Sadock^۱, ۲۰۰۰؛ هامیلتون، ۱۹۵۹).

آزمون افسردگی هامیلتون نیز در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای ارزیابی شدت افسردگی اساسی با تکیه بر نشانه‌های جسمانی تهیه شد و هر ماده از صفر تا دو و یا از صفر تا چهار نمره می‌گیرد. نمره کمتر از هشت طبیعی در نظر گرفته می‌شود. این آزمون نیز برای استفاده درمان‌گران بالینی طراحی شده و از نظر همخوانی درونی و ارزیابی بین آزمون‌گر دارای پایایی خوب است. روایی آزمون نیز بر اساس سایر مقیاس‌های افسردگی خوب است (Sadock و Sadock^۱, ۲۰۰۰؛ هامیلتون، ۱۹۶۷).

برای مقایسه مشخصات بیماران دو گروه نمره‌های SOWS، نشانه‌های روانی، نمره‌های کلی HDRS و HARS، آزمون‌های^۹ t و خی دو به کار برده شد. برای ارزیابی اثر درمان (باکلوفن در برابر کلونیدین)، اثر زمان (روزهای ارزیابی بیماران) و تعامل درمان- زمان^{۱۰} آزمون تحلیل واریانس به کار برده شد. سایر متغیرها (شامل روزهای باقی ماندن بیمار در درمان، بسامد تکمیل سم زدایی، و بسامد عوارض جانبی) نیز با کمک آزمون تی، آزمون خی دو یا آزمون دقیق فیشر^{۱۱}، دو گروه مقایسه شدند.

یافته‌ها

الف. باقی ماندن بیماران در برنامه درمانی^{۱۲}. نسبت بیماران «کامل کننده» برنامه درمانی در گروه‌های باکلوفن و کلونیدین به ترتیب ۴۶/۸٪ و ۴۴/۱٪ بود که تفاوت‌شان از نظر آماری معنی‌دار نیست. میانگین روزهای شرکت در درمان برای دو گروه باکلوفن و کلونیدین به ترتیب ۸/۷۸ (انحراف معیار=۵/۷۷) و ۸/۱۲ (انحراف معیار=۵/۴۶) بود که تفاوت معناداری با هم نداشتند.

1- Sadock and Sadock

2- treatment - by - time interaction


3- Fisher's exact test 4-retention in treatment

5- main effects of time 6- quadratic


7- main effects of treatment

8- euphoria


نمودار ۱- میانگین نمره‌های SOWS در دو گروه باکلوفن و کلونیدین



نمودار ۲- میانگین نمره‌های نشانه‌های روانی در دو گروه باکلوفن و کلونیدین



نمودار ۳- میانگین نمره کلی در دو گروه باکلوفن و کلونیدین



کارنووات^۶ و هاردمون^۷، ۱۹۹۸). یافته‌های این بررسی را باید با در نظرداشتن محدودیت‌های روش شناختی^۸ آن دید. اول آن که نبود وجود تفاوت معنی‌دار در بررسی حاضر به معنی نبود تفاوت بین باکلوفن و کلونیدین نیست. به علت کوچک بودن گروه‌های مورد بررسی، توان تعیین تفاوت‌های موجود بین دو گروه کم بود و این موضوع به ویژه در مورد معیارهایی که فقط برای بیماران «کامل کننده» بررسی تحلیل شده بودند، صادق است.

بنابراین، انجام بررسی‌هایی با حجم نمونه بزرگتر و باکترل دارو نما لازم است. دوم آن که، استفاده از برنامه مقدار مصرف ثابت برای همه بیماران، چه بسا نتایج کاربردی‌تری برای ارزیابی اثربخشی و عوارض

بحث

یافته‌های پژوهش حاضر اثربخشی درمان باکلوفن و کلونیدین را در درمان نشانگان ترک مواد افیونی مطرح می‌کند. این نتایج با یافته‌های پژوهش‌های آزمایشگاهی و پیش بالینی^۱، که اثر آگونیست‌های گیرنده GABA_B را در مهار واکنش‌های ترک مواد افیونی مطرح می‌کنند، همخوان است و بر امکان این که باکلوفن می‌تواند جایگزینی برای کلونیدین در سم‌زدایی مواد افیونی باشد، دلالت دارد. گرچه در این پژوهش یافته مهم بررسی پیشین تکرار شد، پژوهشگران نتوانستند هیچ‌گونه برتری معنی‌داری را برای باکلوفن در بهبودی نشانه‌های روانی (به ویژه با مقیاس‌های معیار افسردگی و اضطراب) و یا در زمینه نیمرخ عوارض جانبی نسبت به کلونیدین نشان دهند.

میزان سم‌زدایی موفق در بررسی حاضر با میزان‌های گزارش شده پیشین قابل مقایسه است (گوسوب، جونز^۲ و گرین^۳، ۱۹۸۶؛ اندیکات^۴ و واتسون^۵، ۱۹۹۴؛

1 preclinical
3- Green
5- Watson
7- Hardman

2- Johns
4- Endicott
6- Carnwath
8- methodological

حاضر به سایر مواد افیونی (بهویژه هروئین) احتیاط کرد.

منابع

- Ahmadi-Abhari,S.A.,Akhondzadeh,S.,Assadi,S. M., Shabestari,O.L.,Farzanehgan,Z.M., & Kamlipour, A.(2001).Baclofen versus clonidine in the treatment of opiates withdrawal, side-effects aspect:a double-blind randomized controlled trial.*Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 26, 67-71.
- Akhondzadeh,S.,Ahmadi-Abhari,S.A.,Assadi,S. M., Shabestari,O.L.,Kashani, A. R., & Farzanehgan, Z.M.(2000).Double-blind randomized controlled trial of baclofen vs. clonidine in the treatment of opiates withdrawal.*Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 25, 347-353.
- Armenian,S.H.,Chituape,M.A.,Stitzer,M.L. (1999). Predictors of dischargers against medical advice from a short-term hospital detoxification unit. *Drug and Alcohol Dependence*, 56, 1-8.
- Backmund,M.,Meyer,K., Eichenlaud, D., & Schutz, C.G.(2001),Predictors of completing an in-patient detoxification program among intravenous heroin users,methadone substituted and codeine substituted patients. *Drug and Alcohol Dependence*, 64, 173-180.
- 1- Fishbain
3- Cutler
5- Strang
7- Tsia
9- Janiri
11- Persico
13- Tempesta
15- Backmund
17- Eichenland
19- Westermeyer
- 2- Rosomoff
4- Lin
6- Su
8- Hu
10- Mannelli
12- Seritti
14- Hartman
16- Meyer
18- Schuts
- داروها داشته باشد، ولی کمتر با عملکرد معمول بالینی همخوانی دارد و ممکن است که باعث سوگیری به سمت نشان دادن اثر بزرگتری برای باکلوفن یا کلونیدین شود. به هر روی، به کارگیری رژیم‌های دارویی انعطاف‌پذیر نیازمند برنامه‌ریزی پیچیده‌ای برای کورماندن ارزیاب در طول بررسی است. در هر صورت مقدار مصرف کلونیدین در بررسی حاضر در طیف پیشنهادشده برای سمزدایی مواد افیونی (فیش‌بین^۱، روسموف^۲، کاتلر^۳ و روسموف، ۱۹۹۳) و قابل مقایسه با مطالعه‌های مشابه است (لین^۴، استرانگ^۵، سو^۶، تسی^۷ و هو^۸؛ ۱۹۹۷؛ ژانیری^۹، مانلی^{۱۰}، پرسیکو^{۱۱}، سرتی^{۱۲} و تمپستا^{۱۳}؛ ۱۹۹۴؛ هارتمن^{۱۴} و همکاران، ۱۹۹۱). سوم آنکه، افزایش کند مقدار مصرف هر دو دارو ممکن است به سطوح کم داروها در روزهای نخست سمزدایی را در پی داشته باشد. بنابراین، نشانه‌های ترک در دو گروه به‌طور موثری تسکین نمی‌یافتد و این امر می‌توانست باعث نتایج غیر معنی دار در بررسی حاضر شده باشد. به هر روی، نشانه‌های ترک تریاک (که ماده اصلی در نمونه این بررسی بود) نسبت به هروئین کنترل شروع می‌شود و عموماً پس از روز دوم یا سوم به بالاترین شدت خود می‌رسد.
- چهارم آنکه، عارضه سرخوشی در شمار بیشتری از بیماران «کامل کننده» بررسی در گروه باکلوفن دیده شد و این امر می‌تواند باعث تقویت نتیجه مطلوب در این گروه شده باشد.
- نکته آخر این که بیشتر آزمودنی‌های این بررسی افراد وابسته به تریاک و شمار کمی افراد وابسته به هروئین بودند و از آنجا که نشانگان ترک مواد افیونی مختلف، متفاوت است (بک‌موند^{۱۵}، مایر^{۱۶}، ایچلوود^{۱۷} و شوتز^{۱۸}، ۲۰۰۱) و افراد وابسته به هروئین و تریاک دارای نیمرخ مشکلات اجتماعی و طبی متفاوتی هستند (وستر مایر^{۱۹}، ۱۹۷۶) باید در تعیین یافته‌های بررسی

- Bardo, M.T.(1998).Neuropharmacological mechanisms of drug reward : beyond dopamine in the nucleus accumbens.*Critical Reviews in Neurobiology*, 12, 37-67.
- Capasso,A.(1999).GABA_B receptors are involved in the control of acute opioid withdrawal in isolated tissue.*Progress in Neuropsychopharmacology and Biological psychiatry*,23,289-299.
- Carnwath,T.,&Hardman,J.(1998).Randomized double-blind comparison of lofexidine and clonidine in the out-patient treatment of withdrawal.*Drug and Alcohol Dependence*, 50, 251-254.
- Chahl,L.A.(1990).Effects of putative neurotransmitters and related drugs on withdrawal contractures of guinea-pig isolated ileum following brief contact with [Met 5] enkephalin.*British Journal of pharmacology*, 101, 908-912.
- Chieng, B., & Christie, M. D. (1996). Local opioid withdrawal in rat single periaqueductal gray neurons in vitro.*Journal of Neuroscience*,16, 7128-7136.
- Enidicott, P., & Watson, B.(1994). Interventions to improve the AMA-discharge rate for opiate-addicted patients. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, 32, 36-40.
- Fishbain,D.A.,Rosomoff,H.L.,Cutler,R.,& Rosomoff, R. S. (1993). Opiate detoxification protocols, a clinical manual. *Annals of Clinical Psychiatry*, 5,53-65.
- Franken,I.H., & Hendriks, V. M. (1999). Predicting outcome of inpatient detoxification of substance abusers. *Psychiatric services*, 50, 813-817.
- Galeotti, N., Ghelardini, C., & Bartolini, A.(1996). Effect of pertussis toxin on morphine, diphenhydramine,baclofen,clomipramine and physostigmine antinociception. *European Journal of Pharmacology*, 308, 125-133.
- Gordon,N.C.,Gear,R.W.,Heller,P.H.,PaulS,Miasko wski,C.,& Levine J. D. (1995). Enhancement of morphine analgesia by the GABA_B agonist baclofen. *Neuroscience*, 69,345-349.
- Gossop, M., Johns, M., & Green, L. (1986). Opiate withdrawal:in-patient versus out-patient programmes and preferred versus random assignment to treatment. *British Medical Journal*, 293,103-104.
- Gossop,M.(1990).The development of Short Opiate Withdrawal Scale(SOWS).*Addiction and Behavior*, 15,487-490.
- Hamilton,M.(1959).The assessment of anxiety states by rating.*British Journal of Medical Psychology*, 32, 50-55.
- Hamilton, M. (1967). Development of a rating scale for primary depressive illness.*British Journal of Social and Clinical Psychology*, 6, 278-296.
- Hartman, F, Poirier, M. F., Bourdel, M. C., Loo, H., Lecomte,J.M.,&Schwartz,J.C.(1991). Comparison of acetorphan with clonidine for opiate withdrawal symptoms.*American Journal of psychiatry*, 148, 627-629.
- Janiri, L., Mannelli, P., Persico, A. M., Serreti., & Tempesta,E.(1994).Opiate detoxification of methadone maintenance patients using lefetamine, clonidine and buprenorphine.*Drug and Alcohol Dependence*, 36, 139-145.
- Lin, S. K., Strang, I., Su, L. W., Tsai, C. J., & Hu, W. H. (1997). Double-blind randomized controlled trial of lofexidine versus clonidine in the treatment of heroin withdrawal.*Drug and Alcohol Dependence*, 48, 127-133.

- Sadock,B.J.,& Sadock,V.A. (2000). Comprehensive textbook of Psychiatry (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
- Westermeyer, J. (1976). The pro-heroin effects of anti-opium laws in Asia. *Archives of General Psychiatry*, 33, 1135-1139.
- Willick, M. I., & Kokkinidis, L. (1995). The effects of ventral tegmental administration of GABA_A, GABA_B and NMDA receptor agonists on medial forebrain bundle self-stimulation. *Behavioral Brain Research*, 70, 31-36.
- Wise, R. A. (1998). Drug-activation of brain reward pathways. *Drug and Alcohol Dependence*, 51, 13-22.
- Xi,Z.X., & Stein, E. A. (1999). Baclofen inhibits heroin self-administration behavior and mesolimbic dopamine release. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 290, 1369-1374.
- Xi,Z.X.,&Stein,E. A. (2000). Increased mesolimbic GABA concentration blocks heroin self-administration in the rat. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 294, 613-619.
- Zarrindast,M.R.,&Mousa-Ahmadi,E.(1999). Effects of GABAergic system on naloxone induced jumping in morphine-dependent mice. *European Journal of Pharmacology*, 381, 129-133.