



بررسی الگوهای ذهنی طرحواره‌ای کمال‌گرایی و تأیید خواهی در افسردگی

نوشزاد سام خانیانی^{*}، دکتر رخساره یزدان‌دوست^{**}، دکتر علی‌اصغر اصغری^{***} افسردگی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی دو دیدگاه متفاوت درباره تفکر افسردگی است. دیدگاهی که افسردگی را بازتابی از افزایش عمومی دسترس پذیری ساختارها و خاطرات منفی می‌داند و دیدگاهی که تفکر افسردگی را بازتابی از تغییر در سطح کلی تراز نمایی‌های شناختی تعریف می‌کند. **روش:** آزمودنی‌های این پژوهش ۵۶ نفر بودند که در سه گروه گنجانده شده بودند: ۱۸ نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (۱۰ زن، ۸ مرد)، ۱۸ نفر مبتلا به اختلال وسوسات جبری (۱۰ زن، ۸ مرد) و ۱۰ نفر بهنجار (۱۰ زن، ۱۰ مرد) که به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی پیش‌بینی‌های متعارض برآمده از این دو دیدگاه بیماران افسرده، بیماران وسوسی و گروه گواه بهنجار به تکلیف جملات ناتمام، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد کمال‌گرایی و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد تأییدخواهی پاسخ دادند. **یافته‌ها:** تایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی‌داری در آزمون تکلیف جملات ناتمام، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و در زمینه تأییدخواهی، میان سه گروه افسرده، وسوسی و بهنجار وجود دارد. هم‌چنین آزمون پیگیری توکی نشان داد که گروه افسرده تفاوت معنی‌داری با گروه بهنجار دارد، اما تفاوت موجود میان گروه افسرده و وسوسی معنی‌دار نبود. **نتیجه:** تایج از پیش‌بینی دیدگاه الگوهای ذهنی طرحواره‌ای حمایت می‌کند. اگرچه وجود شناخت‌های مربوط به کمال‌گرائی و تأییدخواهی برای بیماران وسوسی هم مورد تأیید قرار گرفت، اختصاصی بودن آن برای بیماران افسرده تأیید نشد.

کلید واژه: الگوهای طرحواره‌ای، دسترس‌پذیری ساختاری، کمال‌گرایی، تأییدخواهی

مقدمه

پیوند دادن میان شناخت درمانی بالینی و پژوهش‌های

بنیادی صورت گرفته که بینش نوینی در نظریات

در چند دهه‌ی اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای

* کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، تهران، خیابان مصطفی خمینی، ایستگاه کالاتری، مرکز بهزیستی شهید ملت دوست. کد پستی ۱۱۱۷۶.
E-mail: samkhalian_n@yahoo.com (نویسنده مسئول).

** دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران. تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستجردی، مرکز آموزشی-درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع).

*** دکترای تخصصی روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران. تهران، خیابان طالقانی، کوچه جهان، پلاک ۱، انسیتو روانپزشکی تهران.

اطلاعات معینی را به عنوان درونداد می‌پذیرند، پردازشی ویژه‌ی خود دارند و نتایجی که بدان می‌رسند (فرضیات برونداد) تنها به بخش معینی از ویژگی‌های پدیده‌ی مورد نظر آن‌ها محدود می‌شود. در مورد زبان، باور معتقد است که زبان جدا از تفکر می‌باشد و ساختار پیمانه‌ای دارد (چامسکی^{۱۶}؛ فودور، ۱۹۸۳؛ به نقل از اندرسون^{۱۷}، ۱۹۹۵). فودور براین باور است که پیمانه‌های ذهنی جدا از هم، نخست اطلاعات ورودی را تحلیل و سپس این تحلیل را به شناخت کلی منتقل می‌کنند.

الگوی زیر منظمه‌های شناختی متعامل برچند وجهی‌بودن بازنمایی شناختی تأکید دارد. در این الگو یک پیمانه‌ی ضمنی^{۱۸} مرکزی اطلاعات استخراج شده از پیمانه‌های اختصاصی دیگر را تلفیق می‌کند (ماتئوس، ۱۹۹۷). از آنجا که این دو پیمانه اجازه می‌دهند که هیجان‌ها از انواع اطلاعات کاملاً متفاوت استخراج شوند (مانند بیان گزاره‌ای، ادراکی، احساس‌های بدنی) می‌توانند عملیات شناختی متفاوتی را که هیجان‌های متفاوت را جهت دار می‌نمایند، تبیین کنند. بنابراین، الگوی چندوجهی می‌تواند بر شماری از مشکلات که در الگوهای شبکه‌ای منفرد ایجاد می‌شوند، برتری جوید. بنا بر دیدگاه ICS سوگیری پردازش شناختی در سطوح عالی‌تر بازنمایی شناختی صورت می‌پذیرد.

در این سطح، شناخت به‌شکل^{۲۰} الگوهای ذهنی طرحواره‌ای^{۲۱} بازنموده می‌شود. شناخت‌ها در سطوح

برخاسته از کارهای بالینی ایجاد کرده است. در این زمینه چارچوب‌های نظری متفاوتی در علوم شناختی برای درک شیوه‌ی تفکر در افسردگی ارایه شده است. این دیدگاه‌ها سطوح متفاوتی از بازنمایی‌های شناختی را، به عنوان پایگاه اثرات وابسته به خلق، در نظر گرفته‌اند.

بر پایه‌ی نظریه‌ی شبکه تداعی باور^۱ (۱۹۸۱) بیماران افسرده، رویدادها را منفی‌تر تعبیر می‌کنند، و خلق افسرده به‌طور انتخابی فعالیت یا دسترسی به ساختارهای تفسیری منفی را افزایش می‌دهد. بر پایه‌ی نظریه‌ی دسترسی‌پذیری ساختاری^۲، هر هیجان خاص به صورت گره‌واره^۳ در شبکه‌ی تداعی باز نموده می‌شود و با بازنمایی‌های دیگر شبکه ارتباط دارد. فعال شدن گره‌واره موجب افزایش دسترسی به مواد هماهنگ با خلق و در نتیجه سوگیری پردازش هماهنگ با خلق می‌شود (محمد علیلو، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸). بنا بر دیدگاه باور، شناخت در قالبی همسان^۴ و مستقل^۵ از معانی اختصاصی وارتباط میان آن‌ها بازنمایی می‌شود. برپایه‌ی این الگو شناخت‌ها به صورت ساختارهای اختصاصی- گزاره‌ای^۶ موجب سوگیری پردازش هیجانی در افسردگی می‌شوند.

رویکرد دیگر یعنی "زیر منظمه‌های شناختی متعامل (ICS)" (تیزدیل^۷ و بارنارد، ۱۹۹۳،^۹) میان معانی اختصاصی و معانی کلی و شهودی^{۱۰} (انتزاعی‌تر) تمایز می‌گذارد (قاسمزاده، ۱۳۷۹). این دیدگاه به سطوح متفاوت بازنمایی شناختی قابل است که از نظرکیفی با هم تفاوت دارند و برخلاف نظریه‌ی رقبه بر این باور است که این معانی کلی و فraigir^{۱۱} هستند که با هیجان ارتباط مستقیم دارند. رویکرد ICS از دو اندیشه شکل گرفته است: پیمانه‌ای بودن^{۱۲} ذهن و سطوح چندگانه بازنمایی شناختی. از نظر فودور^{۱۳}، به نقل از کارستون^{۱۴} (۱۹۹۶) ذهن از بخش‌های کم و بیش مستقلی تشکیل شده است و هر یک راهبردهای ویژه‌ی خود را دارد. به بیان دیگر، پیمانه‌ها از نظر شناختی نفوذناپذیر^{۱۵} و محدود به حوزه‌ی ویژه‌ای هستند. آن‌ها

1- Bower's associative network

2- construct accessibility 3- node

4- uniform

5- single

6- propositional

7- interactive cognitive subsystems

8- Teasdale

9- Barnard

10- intuitive

11- holistic

12- modularity

13- Fodor

14- Carston

15- impenetrable

16- Chamsky

17- Anderson

18- implicit

19- Mathews

20- form

21- schematic mental model

واژه‌های مثبت بیشتری پاسخ خواهند داد؛ ۵- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با وسوسی‌ها در DAS کمال‌گرایی نمره بیشتری به دست خواهند آورد و ۶- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با وسوسی‌ها در DAS تأییدخواهی، نمره بیشتری کسب خواهند کرد.

روش

این پژوهش از نوع پس‌رویدادی است. بیماران افسرده، وسوسی و افراد بهنجار به تکلیف جملات ناتمام و مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) کمال‌گرایی و تأییدخواهی پاسخ دادند. داده‌ها به کمک تحلیل واریانس یک سویه تحلیل شدند.

آزمودنی‌های افسرده بر پایه‌ی تشخیص روانپزشکی و ملاک‌های تشخیصی DSM-IV به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس روی آن‌ها آزمون افسردگی بک (BDI)^{۱۲} اجرا شد. کسانی که نمره‌ی پایین‌تر از ۲۰ در آزمون بک دریافت کردند از گروه نمونه حذف شدند. در مجموع ۱۸ نفر (۱۰ زن و ۸ مرد) آزمودنی‌های گروه نمونه افسرده را تشکیل دادند. میانگین و انحراف معیار سن آن‌ها به ترتیب برابر با ۲۸/۷ سال و ۷/۴ بود. آزمودنی‌های وسوسی نیز بر اساس تشخیص روانپزشکی و ملاک‌های DSM-IV به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. روی گروه اخیر نیز آزمون وسوسی- جبری مادزلی^{۱۳} (MOCI) اجرا شد. کسانی که در آزمون نمره کمتر از ۱۱ گرفتند از گروه نمونه حذف شدند. در مجموع ۱۸ نفر (۱۰ زن، ۸ مرد) آزمودنی وسوسی انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سن آن‌ها به ترتیب برابر با ۲۷/۷ سال و ۵/۶ بود. آزمودنی‌های دو گروه افسرده و وسوسی از میان مراجعتان به درمانگاه انسستیتو روانپزشکی تهران،

1- prototype

2- core feature

3- dynamic

4- Champion

5- Power

6- perfectionism

7-need for approval

8- Segal

9- Williams

10- Sentence Completion Task

11- Dysfunctional Attitude Scale

12- Beck Depression Inventory

13- Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory

الگوهای طرحواره‌ای کلی، ضمنی و ناآشکارند. آن‌ها نمونه‌ی نخستین^۱ و شکل‌های بنیادی^۲ تجربه را بازنمایی می‌کنند. ارتباط معانی کلی الگوی طرحواره‌ای با معانی اختصاصی گزاره‌ای مانند ارتباط یک جمله با واژه‌های آن است. معنای برگرفته شده از یک جمله همواره فراتر از کلمات آن می‌باشد (تیزدیل، ۱۹۹۷). یک الگوی طرحواره‌ای، برخلاف طرحواره‌ها، گونه‌ی پویای^۳ بازنمایی شناختی است که پیوسته با دریافت اطلاعات تازه‌تر تغییر می‌کند (چمپیون^۴ و پاور^۵، ۱۹۹۵). بنابر دیدگاه ICS در افسردگی، الگوهای ذهنی طرحواره‌ای کمال‌گرایی^۶ و تأییدخواهی^۷ بر پردازش شناختی چیره می‌شوند (تیزدیل، سیگل^۸ و ویلیامز^۹، ۱۹۹۵). این الگوهای ضمنی ناکارآمد در سطح پایین‌تر افکار و تصورات ناکارآمد، شکل گزاره‌ای و اختصاصی تولید می‌کند که ممکن است به شکل افکار خودکار در سطوح پایین‌تر تجربه شوند. بر پایه‌ی الگوی ICS حالت افسردگی ناشی از چیره‌شدن الگوی طرحواره‌ای کمال‌گرایی و تأییدخواهی است که بر اساس آن فرد میان خودارزشمندی و موقفيت- شکست یا تأیید- عدم تأیید از سوی دیگران ارتباطی نزدیک می‌بیند.

حال با توجه به دو دیدگاه پیش‌گفته، پرسش پژوهش حاضر آن است که آیا سوگیری در پردازش اطلاعات افسردگی در سطح الگوهای طرحواره‌ای صورت می‌پذیرد؟ یا در سطح اختصاصی گزاره‌ای؟ و آیا محتوای آن کمال‌گرایی و تأییدخواهی است؟ فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: ۱- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار تکلیف جملات ناتمام^{۱۰} را با واژه‌های مثبت بیشتری پاسخ خواهند داد؛ ۲- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار در مقیاس نگرش ناکارآمد^{۱۱} (DAS) کمال‌گرایی نمره بیشتری کسب خواهند کرد؛ ۳- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار در DAS تأییدخواهی، نمره بیشتری به دست خواهند آورده؛ ۴- افراد مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با وسوسی‌ها تکلیف جملات ناتمام را با

تکمیل شده مثبت انجام می شود. در زیر دو نمونه از پرسش های تکلیف جملات ناتمام ارایه شده است.

کوچک	خوب	اگر من همیشه خود را برای خشنودی دیگران به زحمت بیاندازم. فردی خواهم شد.
حسنه	پیروز	اگر خیلی مواظب باشی که هرگز اشتباه نکنی خواهی شد.

این آزمون توسط پژوهشگر ترجمه و اعتبار صوری آن توسط نظر چهار متخصص روانشناسی احراز شد. اعتبار سازه برای این آزمون که همزمان با اجرای پژوهش به دست آمده است، در گزارش یافته ها آمده است.

پرسشنامه افسردگی بک (BDI): این آزمون را بک، وارد^{۱۱}، مندلسون^{۱۲}، ماک^{۱۳} و ارباگ^{۱۴} (۱۹۶۱) به نقل از مارنات^{۱۵}، (۱۹۹۰) معرفی کردند و در سال ۱۹۷۱ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ انتشار یافت. گرچه در نسخه اخیر، ماده ها اصلاح شده اند، بین این دو فرم همبستگی بالایی به دست آمده است. نقطه برش ۲۰ افسردگی بالینی را تفکیک می کند (اسکات، ۱۹۸۹). BDI برای سنجش شناخت های وابسته به افسردگی بسیار به کار گرفته شده است. ماده ها با بررسی نگرش ها و نشانه های افسردگی به دست آمده اند. در یک بررسی فراتحلیلی ضرب ب ثبات درونی آن ۰/۷۳ تا ۰/۰۹۳ با میانگین ۰/۰۸۶ به دست آمد. اعتبار بازآزمایی آن از ۰/۴۸ تا ۰/۸۶ گزارش شده است. در پژوهش حاضر نسخه سال ۱۹۷۸ به کار رفته که توسط یزداندوست (۱۹۸۸)؛ به نقل از حناسایزاده اصفهانی، (۱۳۷۸) ترجمه و انطباق شده است.

مرکز آموزشی درمانی شهید نواب صفوی و شهید اسماعیلی وقت و منحل شده فعلی انتخاب شدند. ۱۸ نفر (۱۰ زن و ۸ مرد) آزمودنی های گروه بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سن این گروه به ترتیب ۲۸/۲ سال و ۷/۴ بود. آزمودنی های سه گروه از نظر سن و جنس هم تا شدند.

ابزارهای پژوهش به شرح زیر بوده است:

مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS): این مقیاس (وایزمن^۱، ۱۹۷۹، به نقل از مور^۲ و بلکبرن^۳، ۱۹۹۴) پرسشنامه ای ۴۰ ماده ای است که میزان موافق افراد را با نگرش های ناکارآمد در زمینه های گوناگون می سنجد. دو زمینه ای اصلی این مقیاس موافقی و وابستگی است که از راه پژوهش تحلیل عامل مشخص شده اند. ایمبر^۴ و همکاران (۱۹۹۰) از راه تحلیل عامل که روی ۲۵۰ بیمار افسرده بالینی اجرا کردند، دو عامل قوی را از مقیاس نگرش های ناکارآمد برگرفتند. آن ها آن دو عامل را برای درک روانشناسی، کمال گرایی و تأیید خواهی نامیدند. همسانی درونی مقیاس پیش گفته برای کمال گرایی (۰/۹۱) (α=۰/۹۱) و برای تأیید خواهی (۰/۸۲) (α=۰/۸۲) DAS کمال گرایی دارای ۱۵ ماده و تأیید خواهی دارای ۱۱ ماده است. در این پژوهش نسخه ایمبر و همکاران (۱۹۹۰) به کار برده شد. این آزمون توسط نگارنده ترجمه و اعتبار صوری آن با نظر چهار متخصص روانشناسی احراز شد.

تکلیف جملات ناتمام: این ابزار را تیزدیل، تایلور^۵، کوپر^۶ هی هارست^۷ و پی کر^۸ (۱۹۹۵) بر پایه ای DAS صد پرسشی وایزمن و بک (۱۹۷۹، به نقل از هرسن^۹ و بلاک^{۱۰}، ۱۹۸۸) ساختند و دارای ۱۲ جمله ناتمام است. آزمون به گونه ای طراحی شده است که آزمودنی باید یک کلمه میثبت در جای خالی بگذارد تا یک نگرش ناکارآمد شکل بگیرد. تکلیف جملات ناتمام به زمینه های کمال گرایی و تأیید خواهی اشاره دارد. وظیفه آزمودنی پاسخ دادن به آن مطابق با دستور العمل "با اولین کلمه ای که به ذهنتان می رسد جای خالی جملات زیر را پر کنید" می باشد. نمره گذاری با شمارش تعداد

-
- | | |
|-------------|---------------|
| 1- Waisman | 2- Moore |
| 3-Blackbern | 4-Imber |
| 5-Taylor | 6-Cooper |
| 7- Hayhurst | 8- Payker |
| 9- Hersen | 10- Bellack |
| 11- Ward | 12- Mendelson |
| 13-Mock | 14- Erbough |
| 15- Marnat | |

میانگین و انحراف معیار آزمودنی‌های سه گروه افسرده، وسوسی و بهنجار در تکلیف جملات ناتمام، مقیاس نگرش ناکارآمد کمال‌گرایی و تأییدخواهی در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- میانگین و انحراف معیار نمره‌های آزمون‌ها به تفکیک گروه‌ها

آزمون‌ها						
DAS		DAS		تکلیف جملات		
ناتمام	کمال‌گرایی	تأییدخواهی	نمایش	میانگین انحراف	میانگین انحراف	میانگین انحراف
گروه‌ها	میانگین	انحراف	میانگین	انحراف	میانگین	انحراف
معیار	معیار	معیار	معیار	معیار	معیار	معیار

۱۶/۰۵	۵۰/۲۲	۲۰/۰۳	۵۸/۱	۱/۷۹	۵/۹۴	افسرده
۶/۴	۴۹/۱	۹/۶	۶۹/۸۳	۲/۱۹	۵/۶۷	وسوس
۱۰/۴	۳۹/۲۷	۱۸/۷	۴۶/۲	۲/۳۵	۳/۵	بهنجار

تفاوت نمرات سه گروه در زمینه‌ی جملات ناتمام به کمک تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی تفاوت معنی‌داری ($P<0.01$, $F=761$, $df=2$ و 51) را میان گروه‌ها نشان داد (جدول ۳).

جدول ۳- خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه در تکلیف جملات ناتمام

F	میانگین	درجه	مجموع	جدول ۱	
				میانگین	مجذورات
۶/۷۱**	۳۰/۱۵	۲	۶/۶۱	بین گروهی	آزادی
۴/۵۳۷	۵۱	۲۳۱/۳۹	۲۳۱/۳۹	درون گروهی	مجذورات

** $P<0.01$

آزمون پیگیری توکی نشان داد که گروه افسرده و بهنجار تفاوت معنی‌داری در زمینه‌ی تکلیف جملات ناتمام دارند ($P<0.01$, $Q=4/86$). تفاوت گروه‌های افسرده و وسوسی معنی‌دار نبود. گروه‌های وسوسی و

پرسشنامه‌ی وسوسی- جبری ماذلی (MOCI) هاجسون^۱ و راچمن^۲ (۱۹۹۷؛ به نقل از حناسازی‌اده اصفهانی، ۱۳۷۸) این پرسشنامه را تهیه کردند که دارای ۳۰ پرسش است و به طور خاص مربوط به نشانه‌های بیماری وسوس می‌باشد. از راه تحلیل عامل، پنج عامل در این پرسشنامه شناسایی شده است: (۱) شستشو؛ (۲) وارسی؛ (۳) کندی و تکرار؛ (۴) وجدان شکاک و (۵) نشخوار فکری. کراچکمپ و همکاران (۱۹۸۶)، به نقل از استکتی، (۱۳۷۶) پایایی این آزمون را 0.85 به دست آورند. دادر (۱۳۷۶) ضریب پایایی کل آزمون را 0.84 و اعتبار همگرای آن با مقیاس وسوسی- جبری یل- براون 0.87 و نقطه برش این آزمون را 11 گزارش نموده است.

یافته‌ها

نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که گروه‌های افسرده و وسوسی در آزمون تکلیف جملات ناتمام، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد تأییدخواهی تفاوت معنی‌داری نداشتند. ولی تفاوت آن‌ها در مقیاس نگرش‌های ناکارآمد کمال‌گرایی معنی‌دار بود. همچنین تفاوت گروه‌های وسوسی و بهنجار در آزمون تکلیف جملات ناتمام و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد تأییدخواهی معنی‌دار نبود، اما دو گروه اخیر در مقیاس نگرش‌های ناکارآمد کمال‌گرایی تفاوت معنی‌دار داشتند.

جدول ۱ میانگین، انحراف معیار و دامنه سنی آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد. که از این نظر سه گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند.

جدول ۱- توزیع فراوانی آزمودنی‌های سه گروه مورد بررسی بر حسب میانگین، انحراف معیار و دامنه سنی

گروه‌ها	تعداد	سن
میانگین	انحراف معیار	دامنه
افسرده	۷/۴	۲۸/۷
وسوس	۵/۶	۲۷/۷
بهنجار	۷/۴	۲۸/۲

گروه افسرده و وسوسی تفاوت معنی داری نداشتند، اما گروه های وسوسی و بهنجار تفاوت معنی داری داشتند.
(Q=۳/۵۸، P<۰/۰۵).

ضریب همبستگی برای تکلیف جملات ناتمام و DAS کمال گرایی برابر ۰/۵۷ بود و برای تکلیف جملات ناتمام و DAS تأییدخواهی برابر با ۰/۶۰ به دست آمد.

بحث

نخستین فرضیه‌ی پژوهش حاضر آن بود که افراد افسرده در مقایسه با افراد بهنجار تکلیف جملات ناتمام را با کلمات مثبت بیشتری پاسخ خواهند داد. نتایج پژوهش حاضر این فرضیه را تأیید می‌کند. این یافته با پژوهش‌های پیشین، از جمله تیزدیل و همکاران، (۱۹۹۵)، تیزدیل، لا یود^۱ و هاوتون^۲، (۱۹۹۸) همسو و ICS در تأیید دیدگاه ICS، می‌باشد. بنا بر نظریه‌ی سوگیری در پردازش اطلاعات هیجانی براساس اثرات آن در الگوهای ذهنی طرحواره‌ای عالی‌تر را، بهتر می‌توان درک کرد. افسردگی بر ارتباط درونی ساختارها تأثیر می‌گذارد، به طوری که تأثیری کلی و ساختاری بر پردازش اطلاعات دارد. این سوگیری در اثر چیرگی الگوی طرحواره‌ای کلی است که از نمونه اعلی تجربه گرفته شده است. این بافت کلی طرحواره‌ای پردازش اطلاعات هیجانی را به صورت کلی، نا آشکار جهت دار می‌کند. این درست برخلاف دیدگاه شبکه تداعی است که در این پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت. بک (۱۹۶۷، به نقل از بک و همکاران، ۱۹۶۸) همسو با دیدگاه شبکه پیشنهاد می‌کند اثر سوگیری پردازش هیجانی در سطح باورهای اختصاصی است که فرم گزاره‌ای و آشکار دارند و در یک فرایند آشکار عقلانی^۳ موجب سوگیری پردازش می‌شوند. هم‌چنین دیدگاه ICS با رویکرد شناخت درمانی بالینی از این لحاظ تفاوت دارد

بهنجار در این زمینه تفاوت معنی دار داشتند (P<۰/۰۱، Q=۴/۳۲).

تفاوت سه گروه در DAS کمال گرایی از راه تحلیل واریانس یک‌طرفه (جدول ۴) معنی دار نشان داده شد (df=۲ و ۵۱، F=۱۲/۴۶، P<۰/۰۱).

جدول ۴- خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه در *DAS کمال گرایی*

F	میانگین	درجه	مجموع	منبع تغییرات
				مجذورات
۲۵۰/۸/۷	۲	۵۰/۱۷/۴۴		بین گروهی
۱۲/۴۶**	۵۱	۱۰۲/۷۱/۶		درون گروهی

**P<۰/۰۱

آزمون پیگیری توکی نشان داد که گروه افسرده و بهنجار تفاوت معنی داری در این زمینه دارند (P<۰/۰۵، Q=۳/۵۶). گروه های افسرده و وسوسی (Q=۴/۶۹، P<۰/۰۱) و گروه های وسوسی و بهنجار تفاوت معنی داری در این زمینه داشتند (P<۰/۰۱، Q=۷/۰۶).

داده های به دست آمده از اجرای DAS تأییدخواهی از راه تحلیل واریانس یک‌طرفه در جدول ۵ نشان داده شده است. سه گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند (df=۲ و ۵۱، F=۴/۷۹، P<۰/۰۵).

جدول ۵- خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه در *DAS تأییدخواهی*

F	میانگین	درجه	مجموع	منبع تغییرات
				مجذورات
۴/۷۹*	۶۵۳/۱۳	۲	۱۳۰/۶/۳	بین گروهی
	۱۳۶/۰/۹	۵۱	۶۹۴/۰/۵	درون گروهی

*P<۰/۰۵

آزمون پیگیری توکی نشان داد که گروه افسرده با بهنجار تفاوت معنی دار دارد (P<۰/۰۵، Q=۳/۹۸).

من آرمانی موجب افسردگی می‌شود و ارزشمندی خود در رابطه با نیل آرزوهای تضادی^۵ (موفقیت، تأیید) تعريف می‌شود. اثرات کلی و فراگیر خود دوگانه که در حالت افسردگی بر سازوکارهای شناختی خود چیرگی می‌یابد و آرزوی نیل به خواسته‌های تضادی، یعنی آن‌هایی که نه به دست می‌آیند و نه صرف نظر می‌شوند، قابل مقایسه با اثرات کلی و فراگیر الگوهای ذهنی طرحواره‌ای کمال‌گرایی و تأیدخواهی است. به هر حال رویکرد ICS آن است که در چارچوب علوم شناختی، این فرایندهای ذهنی را تبیین کند.

همبستگی بالا و معنی‌دار میان تکلیف جملات ناتمام و DAS کمال‌گرایی و تأیدخواهی نشان می‌دهد که تکلیف جملات ناتمام گرایش‌های تفسیری موجود در بافت افسردگی (کمال‌گرایی و تأید خواهی) را اندازه‌گیری می‌کند. به بیان دیگر، بیان کننده‌ی اعتبار سازه برای تکلیف جملات ناتمام است. فرضیه چهارم پژوهش حاضر تأیید نشد. بنابرنتایج، الگوهای طرحواره‌ای کمال‌گرایی و تأیدخواهی در بیماران وسوسی نیز وجود دارد و به بیماران افسرده اختصاص ندارد. اگر ابطال‌گرای زودباور^۶ نباشیم (پاپر^۷، ۱۹۶۲، به نقل از آبرامسون و همکاران، ۱۹۹۷) و نخواهیم این فرضیه را با وجود نخستین یافته ابطال‌کننده کنار بگذاریم می‌توان این ناهمسویی را در راستای محدودیت‌های پژوهش حاضر تبیین کرد. گروه وسوسی از نظر خلق افسرده کنترل نشده بود. خلق

که ICS به یک رابطه دو جانبه میان خلق و شناخت باور دارد. بنابر دیدگاه بک (۱۹۶۸) شناختهای منفی پیشاپرداز^۸ خلق منفی هستند.

یافته‌های پژوهش حاضر با تأیید فرضیه دوم و سوم نشان‌دهنده تسلط محتوای شناختی کمال‌گرایی و تأیدخواهی در افسردگی است. این یافته با دیدگاه‌های نظری و پژوهشی همسو است، از جمله چمپیون و پاور (۱۹۹۵)، پیسیزنسکی^۹ و گرینبرگ^{۱۰}، آریتی^{۱۱} و بمپورد^{۱۲} (۱۹۸۷)، به نقل از پیسیزنسکی، و گرینبرگ، بک (۱۹۸۳)، به نقل از آبرامسون^{۱۳}، الوی^{۱۴} و هوگان^{۱۵} (۱۹۹۷)، بلات^{۱۶} (۱۹۷۵)، به نقل از چمپیون و پاور، (۱۹۹۵)، فیربادر^{۱۷} و مورتی^{۱۸} (۱۹۸۸)، پرسونز^{۱۹}، میراندا^{۲۰} و پرلوف^{۲۱} (۱۹۹۱). با این حال کمال‌گرایی و تأیدخواهی دیدگاه ICS با خودمختاری^{۲۲} و مردم‌گرایی^{۲۳} بک (۱۹۸۹) تفاوت دارد. از نظر بک، خودمختاری و کمال‌گرایی یک گرایش دیرپا و ماندگار^{۲۴} می‌باشد. مردم‌گرایی و خودمختاری نوعی سبک شناختی/شخصیتی^{۲۵} می‌باشد. طرحواره "کمال‌گرایی و تأیدخواهی" در نظریه‌ی زیر منظومه‌های شناختی متعامل نوع پویا کلی و فراگیر بازنمایی شناختی است که به صورت ضمنی و ناشی از آشکار فرایند پردازش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تحلیل ICS می‌گوید که افسردگی به گردش کار^{۲۶} الگوهای طرحواره‌ای مربوط می‌شود و متوجه ارتباط نزدیک خود ارزشمندی با تأیید اجتماعی یا پیشرفت است. هم‌چنین خلق بهنجار با الگوی ذهنی کارآمد مشخص می‌شود که در آن ارزشمندی شخص مستقل از آن است که آیا فرد توسط دیگران دوست داشته شود یا در انجام تکلیف موفق شود. در این معنی ICS با رویکردهای تحلیلی^{۲۷} توافق بیشتری دارد.

از نظر فروید (۱۸۸۶، ۱۹۱۷)، به نقل از چمپیون و پاور، (۱۹۹۵) افسردگی ناشی از معطوف شدن احساسات دوگانه^{۲۸} خصوصت‌آمیز از شیء از دست رفته^{۲۹} به خود می‌باشد. از این نظر فروید بین من^{۳۰} و من آرمانی^{۳۱} تمایز گذاشت. تضاد میان من و

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1- antecedent | 2- Pyszczynski |
| 3- Greenberg | 4- Ariety |
| 5- Bempord | 6- Abramson |
| 7- Alloy | 8- Hogan |
| 9- Blat | 10- Fairbother |
| 11- Moretti | 12- Persons |
| 13- Miranda | 14- Perloff |
| 15- autonomy | 16- sociotherapy |
| 17- enduring | |
| 18- cognitive/personality style | |
| 19- shifting | 20- psychoanalytic |
| 21- ambivalence | 22- lost object |
| 23- ego | 24- ego ideal |
| 25- discrepancy aspiration | |
| 26- naive falcifier | 27- Popper |

گفته شد یکی از پیش‌فرضهای الگوی طرحواره‌ای پویایی و بازآفرینی پیاپی آن است. به هر روی پژوهش حاضر این جنبه از الگوی طرحواره‌ای را مورد آزمون قرار نداده است.

پژوهش حاضر دیدگاه زیر منظمه‌های شناختی متعامل را مورد تأیید قرار داد. تیزدیل و بارنارد (۱۹۹۳) در قالب ICS می‌کوشند با تلفیق رویکردهای نظری و مشاهدات بالینی و یافته‌های آزمایشی تبیین جامع تری از فرایندهای شناختی در اختلال‌های هیجانی ارائه دهند، هرچند که این رویکرد تا اندازه‌ای کلی و نظری^۱ می‌باشد. بیرون کشیدن پیش‌بینی‌های ویژه و محدود از آن می‌تواند آن را پذیرای آزمایش کند؛ آنچه هدف پژوهش حاضر بوده است.

منابع

- اتکینسون، ریتا، ل.؛ اتکینسون، ریچارد، س.؛ هیلگارد، ارنست، ر.؛ اسمیت، ای. ای.؛ بم، د. جم.؛ هوکسما، س. ن. (۱۳۷۸). زمینه روان‌شناسی هیگارد. ترجمه محمد نقی برانه و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
- استکتی، گیل (۱۳۷۶). درمان رفتاری و سوساس، ترجمه عباس پیش‌بینی‌پور رودسری و مجید محمود علیلو. تبریز. روان‌پویا.
- حساب‌زاده اصفهانی، مریم (۱۳۷۸). بررسی کارآیی درمان شناختی-رفتاری روی تکرش‌های ناسالم و علاسم افسردگی در نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی (متالعه تکمودی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انتیتو روان‌پژشکی تهران.
- دادفر، محبوبه (۱۳۷۶). بررسی همبودی اختلالات شخصیت در بیماران وسوس-جبری و مقایسه آنها با افراد بینجای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انتیتو روان‌پژشکی تهران.
- فرهی تازه کند، حسن (۱۳۷۹). بررسی حافظه مقطعی بیماران مبتلا به اختلال وسوس فکری عملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انتیتو روان‌پژشکی تهران.

افسرده و سوساس در سطح بالایی همپوشی دارند (فرهی تازه کند، ۱۳۷۹). با وجود این می‌توان فرض کرد که دسته‌ای از بیماران در این الگوی طرحواره ای اشتراک دارند؛ به طوری که می‌توان آن‌ها را بخشی از یک طبقه‌ی بیماری شناختی دانست. نوروتیک یا روان‌رنجوری به دسته‌ای از بیماری‌ها گفته می‌شود که با ویژگی‌های اضطراب، ناشادی‌های شخصی و رفتار غیرانطباقی (که به ندرت آنقدر شدید هستند که نیازی به بستری کردن شخص باشد) همراه هستند (اتکینسون و همکاران، ۱۳۶۸). کلی^۲ (۱۹۸۵)، به نقل از مدلی^۳ (۱۹۶۱)، به نقل از همان‌جا) میان خود و خودآرمانی تمایز گذاشته و آن را مسبب ناراحتی‌های روان‌شناسختی دانستند. از این نظر می‌توان فرض کرد که در این گروه از بیماران، اهداف شخصی و روابط اجتماعی به شیوه بازنمایی الگوی طرحواره‌ای ترکیب می‌شوند. به طوری که نمایانگر تضاد میان وضعیت موجود و حالت آرمانی می‌باشد. به هر روی این مفروض نیاز به بررسی بیشتری دارد. می‌توان در یک طرح پژوهش مقطعی که در آن شدت خلق افسرده کنترل شده باشد آن را آزمود.

فرضیه‌ی پنجم و ششم پژوهش حاضر مورد تأیید قرار نگرفت. این یافته هم در راستای تبیین یافته‌های فرضیه‌ی چهارم تدوین می‌شود؛ یعنی در صورت اعتبار این یافته می‌توان محتواهای شناختی کمال‌گرایی و تأییدخواهی را در بیماران افسرده و سوساسی مشترک دانست. افرون بر آن، یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که گروه سوساسی به طور معنی‌داری در کمال‌گرایی فزونی داشتند. این یافته همسو با یافته‌های پژوهشی در زمینه سوساس می‌باشد (فرهی تازه کند، ۱۳۷۹). از محدودیت‌های پژوهش حاضر به کار نبردن گروه افسرده بهبود یافته می‌باشد. از آنجا که پژوهش‌های چندی نشان داده اند که الگوهای طرحواره‌ای وابسته به خلق‌اند (پرسونز و میراندا، ۱۹۹۱) وارد کردن این گروه بیماران می‌توانست پویایی (عدم ثبات) شناخت‌های کمال‌گرایی و تأییدخواهی را بیازماید. همان‌طور که

- vioral assessment techniques*. New York: Pergamon Press.
- Imber,S. D., Pilkonis, P. A., Sotsky, S. M., Elkin, I., Watkins,G.T.,Collins,F., Shea, T. M., Leber, W. R., & Glass, D. R. (1990). Mood-specific effects among tree treatment for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58,352-359.
- Maddi,S.P.(1989).Personality theories: *A comparative analysis* (5th ed). Chicago: The Dorsey.
- Marnat,G.(1990).*Handbook of psychological assessment*. New York: Willy. (p.p.102-103.)
- Mathews, A. (1997). Scientific foundation of cognitive therapy. In D.A.Clark,C.G. Fairbun (Eds.). *Science and practice in cognitive behavior therapy*. Oxford, Oxford University Press.
- Miranda, J., & Persons, J. b. (1998). Dysfunctional attitudes are mood state dependent. *Journal of Abnormal Psychology*, 99, 231-291.
- Moore, R. G., & Blackburn, I. (1994). the relationship sociotropy and autonomy to symptoms cognitions and personality in depressed patients. *Journal of Affective Disorders*, 32, 239-45.
- Persons,J.B.,Miranda,J., Perloff, J .M. (1991). Relationship between depressive symptoms and cognitive vulnerabilities of achievement and dependency. *Cognitive Therapy and Research*, 15, 221-235.
- Pyszczynski, T., & Greenberg, J. (1987). Self-regulatory perseveration and the depressive self-awareness theory of reactive depression. *Psychological Bulletin*, 102, 122-138
- Scott, M. (1989). *A cognitive behavioral approach to clients problems*. New York: Billing 8 Sons.
- Teasdale, J. D.& Barnard,P.J.(1993)*Affect Cognition*
- قاسمزاده، حبیب الله (۱۳۷۹). *شناخت و عاطفه: جنبه های بالینی و اجتماعی*. تهران: انتشارات فرهنگان.
- محمود علیلو، مجید (۱۳۷۷). سوگیری حافظه در افسردگی: پردازش طرحواره ای یا تسهیل عاطفی. *پژوهش های روان شناختی*. دوره ۵، شماره ۱ و ۲، ۸۶-۸۸.
- محمود علیلو، مجید (۱۳۷۸). بررسی آزمایشی اثر خلق بر عملکرد. *پژوهش های روان شناختی*. دوره ۵، شماره ۳ و ۴، ۴۷-۳۷.
- Abramson, L.Y., Alloy, L. B., Hogan, M. E. (1997). Cognitive/personality subtypes of depression: theories in search of disorders. *Cognitive Therapy and Research*, 27, 274-263.
- Anderson, J. R. (1995). *Cognitive psychology and its implications*, New York: Freeman. (p.363).
- Beck,A.T.(1989).*Cognitive therapy in clinical practice*. New York: Routledge.
- Beck, A. T., Steer, R., & Garbin, M. G. (1968). Psychometric property of the Beck Depression Inventory: Twenty five years evaluation. *Clinical Psychology Review*, 18 ,77-100.
- Bower,G. H. (1981). Mood and memory. *American Psychologist*, 36, 129-48.
- Carston,R.(1996).The architecture of the mind: Module and modularity.In D.W.Green (Ed.). *Cognitive Science*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Champion,L. A., & Power, M. J. (1995). Social and cognitive approaches to depression: toward a new synthesis. *British Journal of Clinical Psychology*, 34, 485-503.
- Fairbother,N.,& Moretti,M.(1988).Sociotropy autonomy and self-discrepancies: status in depressed remitted depressed and control participant. *Cognitive Therapy and Research*, 22, 279-296.
- Hersen,M.,Bellack,A.S.(1988). *Dictionary of beha-*

- and change: re-modeling depressive thought.* Uk: Erlbaum.
- Teasdale, J. D., Segal, Z., & Williams, J. M. (1995). How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attention control (mindfulness) training help? *Behavior Research and Therapy*, 33, 25-39.
- Teasdale J.D., Taylor, M.J., Cooper, Z., Hayhurst, H., Payker, E. S. (1995). Depressive thinking: Shifts in construct accessibility or in schematic mental model? *Journal of Abnormal Psychology*, 104, 500-507.
- Teasdale, J.D. (1997). The relationship between Cognition and emotion: The mind –in –place in mood disorders In D. M. Clark C. G Fairburn (Eds.). *Science and practice of cognitive behavior therapy*. (pp.67-93). Oxford: Oxford University Press.
- Teasdale, J.D., Liroyd, C.A., & Hutton, J. M. (1998). Depressive and dysfunctional schematic mental models. *British Journal of Clinical Psychology*, 37, 247-257.