

مقایسه مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک در ایجاد علایم وسوسی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دکتر شیما محسنی^{*}، عزیزه افخم ابراهیمی^{*}، دکتر بدیعی داش آموز^{***}

چکیده

هدف: در این بررسی اثر آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک در ایجاد علایم وسوسی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مقایسه شده است.

روش: در یک بررسی توصیفی- مقایسه‌ای ۶۴ بیمار در گروه آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و ۳۲ بیمار در گروه آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک (YBOCS) بررسی شدند. همه بیمارانی که بر پایه مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال‌های محور یک در تشخیص قطعی اسکیزوفرنیا دریافت کرده بودند، دو آزمون مقایس وسوسی - اجباری بیل- براؤن (YBOCS) و مقیاس مختصر درجه بندی روانپردازشکی (BPRS) را در آغاز، سه هفته و شش هفته پس از درمان اجرا نمودند. داده‌های به دست آمده با روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون آنالیز شدند.

یافته‌ها: در گروه دریافت کننده آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک متوسط نمره آزمون YBOCS به ترتیب پیش از آغاز درمان، سه هفته و شش هفته پس از آن ۲/۴۰، ۲/۳۰ و ۲/۱۸ به دست آمد و در گروه دریافت کننده آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک میانگین نمره آزمون YBOCS به ترتیب در آغاز درمان، سه هفته و شش هفته پس از درمان ۴/۱۲، ۴/۱۶ و ۴/۵۳ بود. تفاوت نمرات آزمون YBOCS در دو گروه دریافت کننده آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک پیش از درمان به سطح معنی داری نزدیک و در هفته سوم و ششم درمان، معنی دار بود ($p < 0.05$). در گروه تیپیک یک بیمار با سابقه خانوادگی مثبت کاهش علایم وسوسی و در گروه آتیپیک نیز یک بیمار با سابقه خانوادگی مثبت افزایش علایم وسوسی را نشان دادند.

نتیجه گیری: آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک می‌توانند علایم وسوسی (هر چند کم) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ایجاد کنند. با وجود اهمیت سابقه خانوادگی در تظاهرات بالینی وسوسی در مصرف کننده‌گان آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک، نقش این متغیر در کاهش با افزایش علایم وسوسی اندک بود.

کلیدواژه: آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک، آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک، علایم وسوسی، اسکیزوفرنیا

* روانپرداز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. انتیتو روانپردازی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

** کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، انتیتو روانپردازی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان. دورنگار: ۰۲۱-۶۶۵۰۶۸۵۳ (نویسنده مسئول). E-mail: afkhami@iums.ac.ir

*** روانپرداز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. بیمارستان روانپردازی ایران.

مقدمه

اسکیزوفرنیا مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با وجود شواهدی دال بر ظهور و یا بروز دوباره علایم وسوسات در بیماران تحت درمان با این دسته از داروها بهویژه کلوزاپین و ریسپریدون تا کنون هیچ گزارش سیستماتیکی برای ارزیابی ارتباط میان علایم وسوساتی و داروهای آنتی‌سایکوتیک آتیپیک و مقایسه آن با داروهای آنتی‌سایکوتیک تیپیک از ایه نشده است.

از آنجا که علایم وسوساتی القا شده در اثر این داروهای «وابسته به دوز» عنوان شده‌اند، ارزیابی بیماران مصرف کننده از نظر بروز یا افزایش علایم وسوساتی، بهویژه در بیماران مستعد از نظر بالینی ارزشمند خواهد بود و در نتیجه تشخیص زودتر، درمان زودرس این بیماری را در پی خواهد داشت (متزیس^{۲۸} و دوسیلو^{۲۹}، ۲۰۰۳).

بررسی حاضر با هدف مقایسه اثر آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک در ایجاد علایم وسوساتی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شده است.

روش

پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی- مقایسه‌ای است. آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری در درسترس انتخاب شدند. شمار آزمودنی‌ها بر پایه جدول کو亨 ۳۲ نفر در هر گروه دریافت کننده آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک تعیین شدند. این بیماران از میان بیماران بستری و سرپایی درمانگاه و بخش‌های بیمارستان روانپژوهی ایران، بخش روانپژوهی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و درمانگاه انسیتو روانپژوهی تهران که تشخیص اسکیزوفرنیا دریافت کرده بودند انتخاب گردیدند. ملاک‌های ورود، نداشتن آشفتگی ذهنی بیماران و توانایی نسبی برای پاسخگویی به پرسش‌های

سایکوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های روانی است، و با توجه به ایجاد اختلال در عملکرد و رفتار و همچنین اختلال در سنجش واقعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (садوک^۱ و سادوک، ۲۰۰۳). خوب‌خтанه با کشف داروهای آنتی‌سایکوتیک (نورولپتیک) امکان درمان این بیماران فراهم شده است و مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های کلاسیک بهبود بالینی چشم‌گیری در ۷۵ تا ۵۰ درصد آنها پذید آورده است. افرون بر آن نزدیک به ۹۰٪ این بیماران هم به نوعی از منافع این داروها برخوردار می‌شوند و در مورد آنتی‌سایکوتیک‌های نو (آتیپیک) این میزان بیشتر است (садوک و سادوک، ۲۰۰۷). آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک پیشرفت چشم‌گیری را در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به همراه داشته‌اند و امروزه به عنوان یک عامل مؤثر در درمان این بیماران و سایر اختلال‌ها با نمای سایکوتیک شناخته می‌شوند (گلدر، اوون^۳ و میو^۴، ۲۰۰۱). لی^۵، وو^۶، هایل^۷، دایاچکوا^۸ و لی (۲۰۰۶) در بیماران آسیابی مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز نشان دادند که الانزایین در مقایسه با داروهای تیپیک دستاوردهای درمانی بیشتری در این گروه از بیماران داشته است. یکی از ویژگی‌های مهم این داروها عوارض جانبی کمتر و کاهش خطر بروز عوارض اکستراپیرامیدال و دیس‌کینزی تأخیری است. تا کنون افزایش وزن و اختلال‌های سوخت‌وساز به عنوان مهم‌ترین عوارض جانبی کاربرد گستره این داروها گزارش شده و به تازگی نیز شواهدی گویای پدیدارشدن علایم وسوساتی به دنبال مصرف این داروها ارایه شده است. در بررسی‌های انجام شده در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ علایم وسوساتی ایجاد شده به دنبال مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک بیشتر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا گزارش شده بودند (موریسون^۹، کلارک^{۱۰}، گلدفرم^{۱۱} و مک‌کوی^{۱۲}، ۱۹۹۸؛ استنگلر-ونزکی^{۱۳}، ۱۹۹۹؛ خولار^{۱۴}، چو^{۱۵} و تیبو^{۱۶}، ۲۰۰۱؛ دوهان^{۱۷}، بوک^{۱۸}، هوگنکوم^{۱۹}، دینگمنز^{۲۰} و لینزن^{۲۱}، ۲۰۰۲؛ لیکوراس^{۲۲}، آلوینزو^{۲۳}، میکالوپولو^{۲۴} و راباویلاس^{۲۵}، ۲۰۰۳؛ سارین^{۲۶} و همکاران، ۲۰۰۴؛ فرام‌هله^{۲۷}، ۲۰۰۶).

با توجه به نقش احتمالی این داروها در بروز اختلال وسوساتی- اجباری و همچنین با توجه به مصرف رو به رشد این دسته از داروهای مقایسه مصرف این داروها و داروهای سنتی ضد سایکوز در ایجاد علایم وسوساتی در بیماران مبتلا به

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1- Sadock | 2- Gelder |
| 3- Owen | 4- Mayou |
| 5- Lee | 6- Wu |
| 7- Habil | 8- Dyachkova |
| 9- Morrison | 10- Clark |
| 11- Goldfrm | 12- Mccoy |
| 13- Stengler-Wenzke | 14- Khullar |
| 15- Chue | 16- Tibbo |
| 17- De Haan | 18- Beuk |
| 19- Hoogenboom | 20- Dingemans |
| 21- Linszen | 22- Lykouras |
| 23- Alevizos | 24- Michalopoulou |
| 25- Rabavilas | 26- Sareen |
| 27- Frommholt | 28- Menzies |
| 29- De Silva | |

ارزیابی شد و تغییرات علایم وسوسی در جهان کاربرد گسترده‌ای دارد. پایایی بین درجه‌بندی کنندگان این آزمون ۰/۹۸-۰/۷۲، گزارش شده است (ساجاتوویک و رامیرز، ۲۰۰۳). نقطه برش ۱۶ به بالا نماینده وسوس بالینی می‌باشد (کوران، ۱۹۹۹).

مقیاس مختصر درجه‌بندی روانپزشکی^۷ (BPRS): این مقیاس دارای ۱۸ پرسش می‌باشد و علایم سایکوتیک و غیر سایکوتیک را در افراد مبتلا به یک اختلال روانپزشکی بهویژه اسکیزوفرنیا اندازه‌گیری می‌کند. هر علامتی برروی یک مقیاس هفت‌نمره‌ای که دامنه آن از یک (وجود ندارد) تا هفت (بیش ترین میزان) است قرار دارد و بر پایه مشاهداتی که توسط متخصص بالینی در طی مصاحبه انجام می‌گیرد، درجه‌بندی می‌شود و بدین‌وسیله شدت علایم سایکوتیک در طول زمان پژوهش ارزیابی می‌گردد. ضرایب پایایی ۰/۵۶ تا ۰/۸۷ توسط سازندگان مقیاس گزارش شده است (ساجاتوویک و رامیرز، ۲۰۰۳).

برای اجرای پژوهش بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی یادشده که بر پایه مصاحبه SCID-I تشخیص اسکیزوفرنیا را دریافت کرده بودند، شناسایی شدند. کسانی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند و توسط روانپزشک بخش یا درمانگاه تحت درمان آنتی سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک قرار گرفته بودند پس از کسب رضایت آگاهانه شفاهی، وارد بررسی شدند. افراد انتخاب شده به کمک یک مصاحبه YBOCS و BPRS ارزیابی شدند. بیماران دچار اسکیزوفرنیا که بر پایه آزمون YBOCS دچار علایم وسوسی جدی بودند، از بررسی حذف شدند (نقطه برش ۱۶). از این بیماران در شروع درمان، هفته سوم و هفته ششم آزمون YBOCS گرفته شد.

برای تحلیل داده‌ها روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون t به کار برده شد.

یافته‌ها

در این بررسی ۶۴ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (۳۲) مصرف کننده آنتی سایکوتیک‌های آتیپیک و ۳۲ بیمار

اصحابه و آزمون‌ها بودند؛ هم‌چنین بیمارانی به بررسی وارد شدند که دست کم در طی دو هفته گذشته هیچ نوع داروی آنتی سایکوتیک دریافت نکرده باشند. ملاک حذف، استفاده فعلی بیماران از داروهای ضد وسوس (مهارکننده‌های اختصاصی بازجذب سروتونین و کلومپرامین) بود.

برای گردآوری داده‌ها ابزارهای زیر به کار برده شد:

اصحابه بالینی ساختار یافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV^۱ (SCID-I): این پرسشنامه ابزاری برای تشخیص گذاری بر پایه معیارهای DSM-IV است. اجرای این مصاحبه نیازمند قضاآت بالینی مصاحبه گر پیرامون پاسخ‌های مصاحبه‌شونده است. از این رو مصاحبه گر باید دانش و تجربه بالینی در زمینه آسیب‌شناسی روان را داشته باشد. گفتنی است که SCID-I بیش از هر مصاحبه تشخیصی استاندارد دیگری در بررسی‌های روانپزشکی به کار برده شده است. پایایی بین ارزیاب‌ها در سطح خوب و پایایی به روش بازآزمایی بالای ۰/۶۰ گزارش شده است (ساجاتوویک^۲ و رامیرز^۳، ۲۰۰۳).

نسخه ویژه ارزیابی اختلال‌های اصلی روانپزشکی به فارسی ترجمه شده (فرست، اسپیترز، گیبون و ویلیامز، ۱۳۸۴) و پس از نهایی شدن ترجمه، نسخه فارسی آن اعتباریابی شد که نشان‌دهنده پایایی، روایی و قابلیت اجرای مطلوب آن بوده است (شریفی و همکاران، ۱۳۸۳).


مقیاس وسوسی- اجباری ییل- براون^۴ (YBOCS): این مقیاس برای اندازه‌گیری شدت علایم وسوسی طراحی شده است (گودمن^۵ و همکاران، ۱۹۸۹، به نقل از ساجاتوویک و رامیرز، ۲۰۰۳)، بخش مهمی از آن بر پایه گزارش بیمار تکمیل و نمره گذاری نهایی بر پایه قضاآت بالینی مصاحبه گر انجام می‌شود. مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است و دارای ۱۰ ماده می‌باشد که هر ماده بین صفر تا چهار نمره می‌گیرد. این نمره‌دهی بر پایه گزارش بیمار و مشاهده مصاحبه گر در هنگام انجام آزمون انجام می‌شود. این آزمون در ایران در بررسی‌های چندی (از جمله طاهرخانی، حسینی نائینی، مصطفوی و حسینی، ۱۳۸۲؛ میرسپاسی و سالیانی، ۱۳۸۲؛ محمدی، مؤمنی، ترکیبان و قائلی، ۱۳۸۱) به کار برده شده است.

پنج ماده نخست این مقیاس برای ارزیابی وسوس‌های فکری است. پنج ماده بعدی برای ارزیابی وسوس‌های عملی است. برخلاف بسیاری از سیستم‌های نمره گذاری که تنها علایم وسوسی را ارزیابی می‌کند، مقیاس YBOCS توانایی ارزیابی شدت علایم اختلال را نیز دارد. این مقیاس برای

- 1- Structured Clinical Interview for DSM-IV axis I disorders
- 2- Sajatovic 3- Ramirez
- 4- Yale-Brown Obsessive- Compulsive Scale
- 5- Goodman 6- Koran
- 7- Brief Psychiatric Rating Scale

تیپیک و آتیپیک تغییرات دیده شده در عالیم وسوسی معنی دار هستند.

جدول ۲، مقایسه میانگین نمرات BPRS بیماران هر دو گروه را در آغاز و در هفته سوم و ششم پس از درمان نشان می دهد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت معنی دار نمرات BPRS بین دو گروه می باشد. عالیم روانپژشکی گروه آتیپیک پیش از درمان و سه هفته پس از آن به طور معنی داری کمتر از گروه تیپیک است. گرچه در هفته ششم درمان تفاوت معنی داری در هر یک از دو گروه در نمره BPRS دیده نشد، در هر دو گروه کاهش نسبی عالیم روانپژشکی مشاهده گردید.



شکل ۱- توزیع میانگین عالیم وسوسی در مقیاس وسوسی-اجباری بیان-براؤن (YBOCS) بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، پیش از درمان با آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و سه و شش هفته پس از شروع این درمان


صرف کننده آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک) وارد بررسی شدند. از کل ۶۴ بیمار مورد بررسی، ۴۳ بیمار (۶۷٪) مرد و ۲۱ بیمار (۳۲٪) زن بودند. از نظر سنی، ۱۷ بیمار (۲۶٪) در گروه سنی ۱۷-۲۳ سال، ۱۵ بیمار (۲۳٪) در گروه سنی ۲۴-۳۰ سال، ۱۵ بیمار (۲۳٪) در گروه سنی ۳۱-۳۷ سال، ۸ بیمار (۱۲٪) در گروه سنی ۳۸-۴۴ سال و ۱ بیمار (۱۴٪) در گروه سنی ۴۵-۵۰ سال قرار داشتند. از نظر وضعیت تأهل ۴۱ نفر از بیماران (۶۴٪) مجرد و ۲۱ بیمار (۳۲٪) متاهل و تنها دو بیمار (۳٪) مطلقه و بیوه بودند. از کل افراد مورد بررسی، ۱۶ بیمار (۲۵٪) سابقه خانوادگی مثبت اختلال وسوسی-اجباری داشتند.

در بررسی نوع آنتی‌سایکوتیک‌های مصرفی، ۱۷ بیمار (۲۶٪) مصرف کننده هالوپریدول، هفت بیمار (۱۰٪) مصرف کننده پرفنازین و هشت بیمار (۱۲٪) مصرف کننده تری‌فلوپرازین بودند. هم‌چنین از بین آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک چهار بیمار (۶٪) کلوزاپین، ۱۴ بیمار (۲۱٪) الانزاپین و ۱۴ بیمار (۲۱٪) ریسپریدون مصرف می نمودند.

شکل ۱، میانگین نمرات مقیاس YBOCS را پیش از درمان با آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و سه هفته و شش هفته پس از شروع این درمان نشان می دهد. هم‌چنان که نمودار نشان می دهد یک کاهش تدریجی در میانگین نمرات YBOCS دیده می شود (به ترتیب ۲/۴۰، ۲/۳۰ و ۲/۱۸).

شکل ۲، میانگین نمرات مقیاس YBOCS را پیش از درمان با آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک و سه هفته و شش هفته پس از شروع این درمان نشان می دهد. در این شکل نیز یک افزایش تدریجی و اندک در عالیم وسوسی دیده می شود (به ترتیب ۴/۱۲، ۴/۴۶ و ۴/۵۳). مقایسه درون گروهی نمرات به دست آمده به روش اندازه گیری مکرر نشان داد که این تغییرات در نمرات YBOCS هر دو گروه از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

جدول ۱، مقایسه نمرات YBOCS بیماران دریافت کننده آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک را پیش از درمان و سه و شش هفته پس از آن به کمک آزمون t نشان می دهد. هم‌چنان که مشاهده می شود در آغاز بررسی بین نمرات YBOCS دو گروه تفاوت معنی داری دیده نمی شود، هر چند که به سطح معنی داری نزدیک است. اما در هفته سوم و ششم پس از درمان تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد p<0.05؛ به بیان دیگر پس از دریافت آنتی‌سایکوتیک‌های



شکل ۲- توزیع میانگین عالیم وسوسی در مقیاس وسوسی-اجباری بیان-براؤن (YBOCS) بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، پیش از درمان با آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک و سه و شش هفته پس از شروع این درمان

جدول ۱- مقایسه میانگین نمرات مقیاس وسوسی-اجباری بیل-براؤن (YBOCS) بیماران دریافت‌کننده آنتی سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک پیش از درمان و سه و شش هفته پس از شروع این درمان

				زمان انجام آزمون	
		t	انحراف معیار	میانگین	داروهای آنتی سایکوتیک
N.S.	۱/۷۱	۳/۱۶	۲/۴۰	تیپیک	پیش از درمان
		۴/۵۸	۴/۰۹	آتیپیک	
۰/۰۵	۲/۰۳	۳/۳۱	۲/۳۱	تیپیک	سه هفته پس از درمان
		۴/۸۸	۴/۴۳	آتیپیک	
۰/۰۵	۲/۲۲	۳/۲۸	۲/۱۸	تیپیک	شش هفته پس از درمان
		۴/۹۶	۴/۵۳	آتیپیک	

جدول ۲- مقایسه میانگین نمرات مقیاس مختصر درجه بندی روانپردازی (BPRS) بیماران دریافت‌کننده آنتی سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک پیش از درمان و سه و شش هفته پس از شروع این درمان

				زمان انجام آزمون	
		t	انحراف معیار	میانگین	داروهای آنتی سایکوتیک
۰/۰۱	-۲/۶۱	۱۵/۹۵	۴۷/۵۳	تیپیک	پیش از درمان
		۱۲/۶۶	۳۸/۱۲	آتیپیک	
۰/۰۵	-۲/۱۶	۱۳/۹۴	۳۶/۸۷	تیپیک	سه هفته پس از درمان
		۱۱/۶۷	۲۹/۷۵	آتیپیک	
N.S.	-۱/۴۶	۱۳/۳۹	۲۹/۳۴	تیپیک	شش هفته پس از درمان
		۱۲/۱۷	۲۴/۶۵	آتیپیک	

وسوسی به دنبال مصرف ریسپریدون انجام شده بود، بروز علایم وسوسی در شش بیمار تحت درمان با ریسپریدون در هفته سوم پس از درمان گزارش شد، اما در بررسی یادشده با هیچ یک از بیماران در آغاز و یا پایان درمان، مقیاس YBOCS انجام نشده بود (آلوریوز، لیکوراس، زرواس^۱ و چریستودولو^۲، ۲۰۰۲) تا بتوان تغییرات در شدت وسوس را به صورت کمی نشان داد. موریسون (۱۹۹۸) در بررسی موردنی که به دنبال مصرف الانزاپین دچار تشدید علایم وسوس شده بود، افزایش نمره وسوس او در مقیاس YBOCS را از ۲۰ به ۳۰ گزارش نمود که نشان‌دهنده افزایش علایم وسوسی است. هم‌چنین در بررسی آینده‌نگر دوهان و همکاران (۲۰۰۲) که دو گروه بیمار تحت درمان با آنتی سایکوتیک‌های ریسپریدون و الانزاپین را با یکدیگر مقایسه کرده است، در آغاز درمان و هفته ششم با بیماران مقیاس YBOCS انجام شد. نتایج نشان دادند که هر دو دارو باعث افزایش علایم وسوسی شدند.

در مورد هدف دیگر پژوهش یعنی نقش سابقه خانوادگی وسوس از در ایجاد علایم وسوسی به دنبال مصرف آنتی سایکوتیک‌های تیپیک و آتیپیک، یافته‌های این پژوهش نشان داد که از بین ۱۶ مورد سابقه خانوادگی مثبت وسوس، نُه بیمار در گروه آتیپیک و هفت بیمار در گروه تیپیک جای داشتند. در گروه آتیپیک، یک بیمار افزایش علایم وسوسی و دو بیمار کاهش علایم وسوسی را در هفته سوم و ششم نشان دادند و در شش بیمار تغییری در علایم وسوسی دیده نشد. در گروه تیپیک نیز یک بیمار کاهش علایم را نشان داد و در شش بیمار باقیمانده تغییری در علایم وسوسی به دنبال مصرف دارو دیده نشد.

بحث

در یک بررسی انجام شده در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ (لیکوراس و همکاران، ۲۰۰۳)، از ۵۰ بیمار با تشخیص اسکیزوفرنیا، ۴۵ نفر (۹۵٪) به دنبال مصرف آنتی سایکوتیک‌های آتیپیک دچار علایم وسوسی شده بودند. هم‌چنین در پژوهشی که به منظور بررسی ایجاد علایم

یکی دیگر از هدف‌های این بررسی، ارزیابی سابقه خانوادگی وسوسات در بیماران بود. از آنجا که یکی از عوامل زمینه‌ساز ابتلاء احتلال‌های روانپزشکی از جمله وسوسات، سابقه خانوادگی می‌باشد، در این بررسی بیماران از نظر این عامل (به عنوان یک عامل خطر در ایجاد علایم وسوساتی به دنبال مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک) ارزیابی شدند.

در بسیاری از بررسی‌ها به وجود احتمالی یک عامل زمینه‌ساز در ایجاد علایم وسوساتی به دنبال مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک اشاره شده است ولی در هیچ یک از آنها عوامل مؤثر در این آسیب‌پذیری مورد بررسی قرار نگرفته‌اند؛ برای نمونه لیکوراس و همکاران (۲۰۰۳) در بازیبینی بررسی‌های انجام شده دریافتند که علایم وسوساتی به دنبال آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک می‌تواند یکی از عوارض مصرف این داروها دست کم در افراد مستعد باشد و یا به باور سارین و همکاران (۲۰۰۴) این احتمال وجود دارد که افراد سایکوتیکی که هنگام مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک دچار علایم وسوساتی می‌شوند یک استعداد زیست‌شنختی برای بروز علایم وسوساتی همراه با اسکیزوفرنیا داشته باشند (هوانگک^۱، مورگان^۲ و لوسکونزکی^۳، ۲۰۰۰). هم‌چنان که بیان شد، افزایش علایم وسوساتی در هر دو گروه مصرف کنندگان داروهای آنتی‌سایکوتیک تیپیک و آتیپیک با سابقه خانوادگی مثبت، بسیار کم است؛ که در تأیید فرض وجود رابطه بین این متغیرها نیست.

به طور کلی این بررسی نشان داد که آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک توانسته‌اند نمرات مقیاس YBOCS را افزایش دهند؛ هر چند این افزایش ناچیز و از نظر آماری معنی دار نبوده است. هم‌چنین این بررسی افزایش نمرات وسوسات را به دنبال مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک (چه در نوع تیپیک و چه آتیپیک) در ارتباط با سابقه خانوادگی مثبت علایم وسوساتی نشان نداد. از این رو پایش بیماران تحت درمان با آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک از نظر علایم وسوساتی- اجباری در بررسی‌های درازمدت تر و به کمک ابزارهای دقیق‌تر پیشنهاد می‌گردد.

این بررسی به صورت توصیفی و به کمک آزمون‌های در دسترس انجام شده و مداخله بر پایه شدت علایم روانپزشکی در نظر گرفته نشده است. هم‌چنین با توجه به این که نمرات مقیاس YBOCS تنها در پنج درصد از بیماران دریافت کننده

در این بررسی بیماران در آغاز، هفته سوم و هفته ششم پس از درمان از نظر شدت علایم وسوساتی بر پایه مقیاس YBOCS ارزیابی شدند. با توجه به یافته‌های به دست آمده در گروه دریافت کنندگان آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک، هیچ افزایشی در بروز علایم وسوساتی- اجباری دیده نشد. گفتنی است که تا کنون در کتب مرجع و بررسی‌های انجام شده به چنین عوارضی اشاره نشده است. اما در گروه دریافت کنندگان آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک، میانگین نمره مقیاس YBOCS در هفته سوم و ششم پس از آغاز درمان افزایشی هر چند اندک دیده شد.

تفاوت معنی‌دار بین میانگین‌های مقیاس YBOCS دو گروه در هفته‌های سوم و ششم درمان هر چند احتمال بروز یا افزایش علایم وسوساتی پس از مصرف آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک را بالا می‌برد، اما با توجه به نزدیک‌بودن به سطح معنی‌داری تفاوت میانگین‌های علایم وسوساتی دو گروه پیش از آغاز درمان، لازم است این یافته با احتیاط در نظر گرفته شود. هم‌چنین در بازیبینی بررسی‌های انجام شده در زمینه بروز علایم وسوساتی به دنبال مصرف آنتی‌سایکوتیک‌ها، به پژوهشی که هم‌زمان و بر پایه معیار کمی (مانند مقیاس YBOCS) به مقایسه آنتی‌سایکوتیک‌های سنتی و آتیپیک پرداخته باشد، برخورد نشد و بیشتر بررسی‌های انجام شده به تأثیر داروهای آتیپیک پرداخته‌اند (سارین و همکاران، ۲۰۰۴).

با توجه به این که تعریف علایم وسوساتی ناشی از مصرف آنتی‌سایکوتیک‌ها در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ممکن است دشوار و با علایم سایکوتیک هم‌پوشی داشته باشد، برای آن که نشان داده شود که علایم وسوساتی احتمالی ایجاد شده در نتیجه تغییرات ادراکی و قضاؤت بیمار به دنبال تجارب سایکوتیک نیستند و از علایم سایکوتیکی که از پیش وجود داشته‌اند جدا هستند، با بیماران آزمون BPRS اجرا شد. به این شکل اثربخشی داروهای سنتی و آتیپیک نیز ارزیابی شدند. با توجه به نمرات BPRS به دست آمده علایم روانپزشکی گروه تیپیک پیش از درمان و سه هفته پس از شروع آن به طور معنی‌داری کمتر از گروه آتیپیک است. این یافته شاید به این دلیل باشد که آنتی‌سایکوتیک‌های آتیپیک به سرعت آنتی‌سایکوتیک‌های سنتی برای بیماران پرخاشگر و سایکوتیک حاد کار نمی‌کنند.

- Gelder, M., Owen, P., & Mayou, R. (2001). *Shorter Oxford textbook of psychiatry* (4th. ed.). Philadelphia: Oxford University Press.
- Hwang, M. Y., Morgan, J. E., & Losconzcy, M. F. (2000). Clinical and neuropsychological profiles of obsessive-compulsive schizophrenia. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 12, 91-94.
- Koran, L. M. (1999). *Obsessive-compulsive and related disorders in adults*. London: Cambridge University Press.
- Khullar, A., Chue, P., & Tibbo, P. (2001). Quetiapine and obsessive-compulsive symptoms: Case report and review of atypical antipsychotic-induced OCS. *Journal of Psychiatry*, 26, 55-59.
- Lee, C., Wu, K. H., Habil, H., Dyachkova, Y., & Lee, P. (2006). Treatment with olanzepine, risperidone or typical antipsychotic drugs in Asian patients with schizophrenia. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 40, 437-445.
- Lykouras, L., Alevizos, B., Michalopoulou, P., & Rabavilas, A. (2003). Obsessive compulsive symptoms induced by atypical antipsychotics, a review of reported cases, *Progress in Neurology, Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 27, 333-346.
- Menzies, R. G., & De Silva, P. (2003). *Obsessive compulsive disorder, theory, research and treatment*. New York: John Wiley.
- Morrison, D., Clark, D., Goldfrm, C. E., & Mccoy, L. (1998). Worsening of obsessive-compulsive symptoms following treatment with olanzepine. *American Journal of Psychiatry*, 155, 855-856.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). *Synopsis of psychiatry* (9th. ed.), Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). *Synopsis of psychiatry* (10th. ed.). Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
- Sajatovic, M., & Ramirez, L. F. (2003). *Rating scales in mental health*. Hudson. Lexi-Comp Inc.
- Sareen, J., Kirshner, A., Lander, M., Kevin, D., Kjernisted, M. K., Eleff, P., & Jeffrey, P. (2004). Do anti psychotics ameliorate or exacerbate obsessive compulsive disorder symptoms? *Journal of Affective Disorders*, 82, 167-174.
- Stengler-Wenzke, K. (1999). Presentation of obsessive-compulsive symptoms in a patient with schizophrenia treated with clozapine. *Psychiatrische Praxis*, 26, 145-146.

آنٹی سایکوتیک‌های آتیپیک افزایش یافت، نتیجه گیری بر پایه رابطه میزان مصرف دارو و افزایش نمره شدنشی نبود. با حجم نمونه بزرگ‌تر می‌توان رابطه میزان مصرف دارو و شدت علایم وسوسی را بررسی نمود.

دربافت مقاله: ۱۳۸۶/۳/۲۱؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۶/۵/۱۷

پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۵/۳۰

منابع

- شریفی، ونداد؛ اسعدی، محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا؛ صدیق، ارشیا؛ جلالی روسری، محسن (۱۳۸۳). پایابی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*، سال ششم، شماره ۱ و ۲، ۴۷-۵۲. *SCID (DSM-IV)*.
- طاهر خانی، حمید؛ حسینی نائینی، فهیمه؛ مصطفوی، حمید؛ حسینی، سیدهاشم (۱۳۸۲). بررسی تأثیر یوگا در درمان بیماران وسوسی-اجباری تحت درمان با داروهای استاندارد. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال نهم، شماره ۱، ۱-۱۰. فرست، مایکل؛ اسپیترر، رایرت؛ گیبون، میریام؛ ویلیامز، جانت (۱۳۸۴). *مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال‌های محور ۱ در DSM IV*.
- ترجمه: ونداد شریفی، سید محمد اسعدی، محمدرضا محمدی، همایون امینی، حسین کاویانی، یوسف سمنانی و امیر شعبانی. تهران، انتشارات مهر کاویان.

- محمدی، محمدرضا؛ مؤمنی؛ فرزاد؛ ترکیبان، رضا؛ قائلی، پدیده (۱۳۸۱). تأثیر فلوکستین و کلومیبرامین بر قند، چربی و وزن بیماران ۷-۱۷ ساله ایرانی مبتلا به اختلال وسوسی. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال هشتم، شماره ۳، ۱۹-۴۰. میرسپاسی، غلامرضا؛ سالیانی، انوشه (۱۳۸۲). مقایسه کارایی فلوکستین-هالوپریدول با فلوکستین-دارونما در بیماران اختلال وسوسی-جبری. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال هشتم، شماره ۴، ۴۰-۴۱.

- Alevizos, B., Lykouras, L., Zervas, I. M., & Christodoulou, G. N. (2002). Risperidone-Induced obsessive-compulsive symptoms. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 22, 461-467.

- De Haan, L., Beuk, N., Hoogenboom, B., Dingemans, P., & Linszen, D. (2002). Obsessive compulsive symptoms during treatment with olanzepine and risperidone: A prospective study of 113 patients with recent-onset schizophrenia or related disorders. *Journal of Clinical Psychiatry*, 63, 104-107.

- Frommhold, K. (2006). Obsessive-compulsive disorder and schizophrenia: A critical review. *Fortschr, Neurologie Psychiatrie*, 7, 74-83.