

مقاله پژوهشی
اصل
Original
Article

تأثیر سلژیلین بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور

دکتر محمدرضا فیاضی بربار^{*}، دکتر ابراهیم عبداللهیان^{**}، دکتر کاووه حجت^{***}، علی اکبر ثمري^{****}

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی داروی سلژیلین که یک مهارکننده مونوآمین‌اکسیداز نوع B می‌باشد و خاصیت دوپامین‌ریزیک دارد، در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با علایم منفی بارز انجام شده است.

روش: در یک کارآزمایی بالینی ۱۰ بیمار بستری در بیمارستان حجازی مشهد که بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR تشخیص اسکیزوفرنیا داشته‌اند و علایم منفی آنها بارز بود [نموده بیشتر از ۱۵ در مقیاس علایم مثبت و منفی (PANSS)]، در پژوهش وارد شدند. بیماران به تصادف در سه گروه دریافت کننده پنج میلی‌گرم سلژیلین، ۱۰ میلی‌گرم سلژیلین و یا دارونما همراه با داروی آنتی‌سایکوتیک جای داده شدند. سپس بیماران به مدت شش هفته به کمک PANSS و آزمون عوارض دارویی پی‌گیری شاند. داده‌ها به کمک آزمون‌های آماری تحلیل واریانس و آتحلیل شدند.

یافته‌ها: هشت بیمار به دلیل تشدید علایم پسیکوز و چهار بیمار به دلیل عوارض دارویی از بررسی کنار گذاشته شدند. میانگین سنی بیماران مورد بررسی ۴۷/۶ سال و میانگین مدت بستری در بیمارستان ۸/۹ سال بود. گرچه علایم منفی در هر دو گروه دریافت کننده سلژیلین پس از شش هفته بهبود نشان داد، تفاوت معنی داری میان دو گروه پنج میلی‌گرم و ۱۰ میلی‌گرم سلژیلین و دارونما دیده نشد.

نتیجه‌گیری: در بیماران بستری در بیمارستان، سلژیلین در بهبود علایم منفی اسکیزوفرنیا بر دارونما برتری ندارد.

کلیدواژه: سلژیلین، علایم منفی، اسکیزوفرنیا

مقدمه
از همه گروه‌های اجتماعی به آن مبتلا هستند، معمولاً پیش از ۲۵ سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر پایدار باقی می‌ماند اسکیزوفرنیا که نزدیک به یک درصد جمعیت عمومی و

* روانپژشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خیابان حرآملی، بیمارستان ابن سینا، گروه روانپژشکی، کد پستی: ۹۱۹۵۹
دورنگار: ۰۵۱-۷۱۱۲۷۲۳ (نویسنده مسئول).

** روانپژشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

*** روانپژشک، شبکه بهداشت و درمان بجنورد.
**** کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد کاشمر.

آنٹیپسیکوتیک نسل اول ممکن است باعث تشدید عالیم منفی در بیماران شود، این فرضیه را پیشنهاد نمودند که تأثیرات داروهای آتیپیک بر روی عالیم منفی ممکن است بهدلیل اثر بر سامانه سروتونین پدید آمده باشد. با همین فرض، با تقویت سامانه سروتونین به کمک داروهای مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین^{۱۶} (SSRI)، به درمان عالیم منفی پرداختند.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون در بررسی‌های چندی، داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین در درمان عالیم منفی به کار برده شده و یافته‌های متفاوتی گزارش شده است. برای نمونه سیلور^{۱۷} (۲۰۰۴) اثر مثبت فلوکستین و فلوروکسامین را گزارش نمود و در بررسی دیگری پاروکستین در بهبود عالیم منفی مؤثر گزارش شد (ژوکرز-شروب^{۱۸} و همکاران، ۲۰۰۵).

از جمله فرضیه‌های دیگری که در زمینه سبب‌شناختی عالیم منفی مطرح شده، اختلال در سامانه گلوتامین‌ژیک مغز می‌باشد. از این رو برخی پژوهشگران داروهای بلوک‌کننده گیرنده NMDA^{۱۹} را در درمان عالیم منفی آزمایش کردند. برای نمونه در یک بررسی مقدار بالای گلیسین برای درمان این گروه عالیم به کار برده شد و نتایج مشبی گزارش گردید (هرسکولوی^{۲۰} و همکاران، ۱۹۹۹).

دهیدروپاپی‌آندرسترون^{۲۱} (DHEA) داروی دیگری است که در درمان عالیم منفی ارزیابی شده و یافته‌های مشبی از آن گزارش شده است (استروس^{۲۲} و همکاران، ۲۰۰۳). این دارو یک نورواستروئید در مغز است که اثرات تنظیم‌کننده بر روی توانمندی‌های تحریک‌پذیری یافته‌های عصبی دارد.

بررسی‌های انجام شده در زمینه الکتروفیزیولوژی بر روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، نشان داده‌اند که کاهش موج آلفا در EEG این بیماران با عالیم منفی در ارتباط بوده است. با استناد به این فرضیه، در یک بررسی به کمک تحریک مغز با TMS^{۲۳} برای درمان این گروه از عالیم، نشان داده شد که با

(садوک^۱ و سادوک، ۲۰۰۳). این بیماری دارای دو دسته عالیم می‌باشد: عالیم مثبت و عالیم منفی. عالیم مثبت در برگیرنده توهمندانه و هذیانها و عالیم منفی در برگیرنده فقر کلامی، بی‌انگیزگی و سطحی شدن حالت‌های عاطفی بیماران هستند (کیرکاتریک^۲ و سنک^۳، ۲۰۰۵). یکی از نظریه‌هایی که در زمینه سبب‌شناختی عالیم منفی در اسکیزوفرنیا مطرح شده است، مدل استرس-کم بنیگی^۴ می‌باشد. بر پایه این فرضیه ترکیبی از عوامل مادرزادی همراه با عالیم محیطی در بروز اسکیزوفرنیا نقش دارند (زوبین^۵ و اسپرینگ^۶، ۱۹۹۷) و در مقایسه با عالیم مثبت، در ایجاد عالیم منفی عوامل ژنتیکی نقش قوی‌تری دارند (دورکین^۷ و لزنونگر^۸، ۱۹۸۴)، دورکین و لزنونگر و مولدین^۹، ۱۹۸۷). بررسی‌ها نشان داده‌اند که عوارض هنگام زایمان ارتباط قوی‌تری با ایجاد عالیم منفی دارند (کانون^{۱۰}، مدنیک^{۱۱} و پارناس^{۱۲}، ۱۹۹۰). هم‌چنین بزرگی بطن‌های مغز در این بیماران ارتباط مستقیمی با شدت عالیم منفی دارد. بزرگی بطن‌ها ثانویه به کاهش حجم ساختمان‌های قشر مغز هستند و کاهش حجم قشر مغز پیامد اختلال در مهاجرت نورون‌ها و کوتاهشدن بیش از اندازه دندربیت‌ها می‌باشد. این اختلال‌ها در ساختمان‌های قشر مغز، اختلال در ارتباط‌های میان مناطق مختلف مغز را در پی داشته، عملکردهای اجرایی و شناختی فرد را محدود می‌سازند (کیرکاتریک و سنک، ۲۰۰۵) و زمینه‌ساز بروز عالیم منفی در فرد می‌شوند. بررسی‌های انجام شده بر روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با عالیم منفی، نشان می‌دهند که این بیماران در چندین زمینه، از جمله اختلال در درک^{۱۳}، توجه و تمرکز، توانایی‌های دیداری-فضایی^{۱۴}، حافظه و هماهنگی در عملکردهای اجرایی دچار نارسایی هستند (بوسی^{۱۵}، ۱۹۸۷؛ دورکین، لزنونگر، ۱۹۸۴).

در دو دهه گذشته، بررسی‌های بسیاری در زمینه درمان عالیم منفی انجام شده، ولی هنوز روش درمانی کامل و مؤثری در این زمینه ارایه نگردیده است. هر چند با ظهور داروهای آنٹیپسیکوتیک نسل دوم بهبود اندکی در عالیم منفی بدست آمده، ولی این میزان تغییر، رضایت‌بخش نبوده است. از این رو پژوهشگران در سراسر دنیا بر آن شدند تا درمان‌های مؤثرتری را در این زمینه جستجو نمایند.

در آغاز، پژوهشگران توجه خود را بر داروهای آنٹیپسیکوتیک مت مرکز نمودند و بر پایه تفاوت‌های داروهای نسل اول و دوم و نشان‌دادن این موضوع که داروهای

- | | |
|---|---------------------|
| 1- Sadock | 2- Kirkpatrick |
| 3- Cenk | 4- stress-diathesis |
| 5- Zubin | 6- Spring |
| 7- Dworkin | 8- Lenzenwenger |
| 9- Moldin | 10- Canon |
| 11- Mednick | 12- Parnas |
| 13- perception | 14- visuospatial |
| 15- Bucci | |
| 16- Serotonine Specific Reuptake Inhibitors | |
| 17- Silver | 18- Jokers-scherubl |
| 19- N-methyl D-aspartate | 20- Heresco-levy |
| 21- dehydroepiandrosterone | 22- Strous |
| 23- Transcranial Magnetic Stimulation | |

معیارهای ورود به بررسی انتخاب و در برنامه درمانی جای داده می‌شند.

معیارهای ورود به پژوهش: ۱- تشخیص اسکیزوفرنیا بر پایه معیارهای DSM-IV-TR^{۱۰} که توسط دو روانپژوهشک تأیید شد، ۲- داشتن سن بالای ۱۰ سال و زیر ۸۰ سال، ۳- داشتن علایم منفی بارز [نمره PANSS^{۱۱} (بلاکر^{۱۲}، ۲۰۰۵) بالاتر از ۱۵]، ۴- نداشتن بیماری پزشکی مزمن (مانند بالابدن قندخون، پرفشاری خون، صرع)، ۵- سابقه دست کم یک ماه بستری پیوسته، پیش از آغاز بررسی (برای رد تأثیر مصرف مواد در بیرون از بیمارستان)، ۶- مصرف نکردن پیوسته داروهای غیر روانپژوهشکی و ۷- مصرف داروی ریسپریدون یا کلوzapین به عنوان داروی آنتیپسیکوتیک اصلی.

بیمارانی که معیارهای ورود به بررسی را داشتند، وارد طرح پژوهش شدند و مراحل زیر به ترتیب انجام شد: مرحله یک: داروهای غیر روانپژوهشکی از جمله مسکن‌ها یا آرامبخش‌ها به آهستگی کاهش داده شد و طی یک‌ماه قطع شد و بیماران تحت درمان با یک آنتیپسیکوتیک اصلی، ریسپریدون یا کلوzapین قرار گرفتند.

برای پیش‌گیری از عوارض احتمالی در گروه ریسپریدون، قرص بسی‌بریدن و لورازپام در صورت لزوم تجویز شد.

مرحله دو: روانپژوهشک، بیماران هر دو گروه را به مدت هشت هفته به صورت هفتگی ویزیت و دوز داروهای آنها را تنظیم نمود. میزان داروی ریسپریدون ۲-۸ میلی‌گرم در روز و میزان مصرف داروی کلوzapین ۵۰-۶۰۰ میلی‌گرم در روز بود و بیمارانی که نیازمند داروهای اضافی برای کنترل علایم بودند، از پژوهش کنار گذاشته شدند.

مرحله سه: پس از گذشت هشت هفته و تثبیت علایم، بیماران، PANSS را به صورت کامل پاسخ دادند و آزمون عوارض دارویی برای همه بیماران تکمیل شد و پس از ارزیابی دوباره نمرات زیرگروه علایم منفی و داشتن معیارهای

افزایش میزان موج آلفا در ناحیه پیشانی، علایم منفی به صورت معنی‌داری بهبود یافته است (جین^۱ و همکاران، ۲۰۰۶). در بررسی یادشده تأیید اثرات مثبت این روش درمانی نیازمند بررسی‌های گسترش‌تر دانسته شده است.

آمیسولپراید و کوتیپاپین، دو داروی آنتیپسیکوتیک جدید هستند که اثرات مثبت آنها در درمان علایم منفی بررسی شده است (دانیون^{۱۳}، رین^{۱۴} و فلورت^{۱۵}، ۱۹۹۹). هم‌چنین زوتیپین^{۱۶}، یک داروی آنتیپسیکوتیک جدید است که اثر آنتاگونیستی بر روی گیرنده‌های دوپامینی نوع ۲ و سروتونینی نوع ۲A دارد و اثرات مثبت آن بر روی علایم منفی در یک بررسی گزارش شده است (مولر^{۱۷} و همکاران، ۲۰۰۴).

نظريه دیگری که در زمینه ایجاد علایم منفی مطرح شده، کاهش دوپامین در نواحی ویژه‌ای از مغز، به ویژه در قشر مخ پیش‌پیشانی است. پیشتر فرض بر آن بود که در اسکیزوفرنیا، سامانه دوپامینرژیک مغز دچار افزایش فعالیت شده است؛ ولی نظریه‌های نوین بر این باورند که سامانه دوپامینرژیک در مناطقی از مغز دچار افزایش فعالیت و در مناطقی دچار کاهش فعالیت می‌شود (کاپور^{۱۸} و رمینگتون^{۱۹}، ۱۹۹۶). بر پایه این فرضیه، پژوهشگران داروهای دوپامینرژیک را در درمان علایم منفی آزمایش کرده‌اند تا نشان دهنند که آیا بالابردن دوپامین همراه با داروهای بلوک‌کننده دوپامین می‌تواند باعث بهبود علایم منفی بیماران دچار اسکیزوفرنیا شود یا خیر. با این رویکرد، اثربخشی سلژیلین که یک داروی مهارکننده مونوآمین‌اکسیداز نوع B می‌باشد و در مغز تأثیر دوپامینرژیک دارد در درمان علایم منفی اسکیزوفرنیا آزموده شد.

روش

این بررسی از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور^{۱۰} کنترل شده با دارونما می‌باشد که بر روی ۹۰ بیمار دچار اسکیزوفرنیا و دارای علایم منفی بارز انجام شده است. این بررسی در بیمارستان‌های این‌سینا و دکتر حجازی شهر مشهد در سال ۱۳۸۴ انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. برای انتخاب آزمودنی‌ها، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که در این دو بیمارستان بستری بودند و علایم منفی آنها چهره غالب بیماری بود، توسط روانپژوهشک معالج آنها برای ارزیابی اولیه معرفی می‌شدند و سپس بیماران دارای

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1- Jin | 2- Danion |
| 3- Rein | 4- Fleurot |
| 5- zotepine | 6- Moller |
| 7- Kapur | 8- Remington |
| 9- double-blind | |

- | |
|--|
| 10- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fourth edition-Text Revision |
| 11- Positive and Negative Symptoms Scale |
| 12- Blacker |

ورود (نمره PANSS عالیم منفی بالاتر از ۱۵) بیماران وارد مرحله بعد می شدند.

مرحله چهار: بیماران به تصادف در سه گروه ۱۵ نفری جای داده شدند. در گروه اول پنج میلی گرم سلژیلین در صبح، در گروه دوم پنج میلی گرم سلژیلین در صبح و پنج میلی گرم در ظهر و در گروه سوم قرص دارونما (هم شکل و هم اندازه با قرص سلژیلین) با نام ساختگی cefloxy^{5ny} و هم تجویز شد. قرص های دارونما توسط دانشکده داروسازی مشهد ساخته شده بود. برای یکسان بودن سه گروه از نظر میزان مصرف دارو در روز در گروه اول افرون بر قرص سلژیلین در صبح، دارونما در ظهر نیز داده شد.

مرحله پنج: آزمون PANSS برای بیماران در هر دو گروه هر دو هفته یکبار به مدت شش هفته (در هفته های صفر، دو، چهار و شش) توسط یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی تکمیل می شد و یک دستیار روانپزشکی غیر وابسته به طرح پژوهشی هر دو هفته یکبار آزمون عوارض دارویی را تکمیل می نمود. داده ها با مشاهده رفخار بیماران و مصاحبه با خود فرد و گرفتن شرح حال از کارکنان بیمارستان گردآوری گردید. روانشناس انجام دهنده آزمون PANSS و پزشک تکمیل کننده آزمون عوارض دارویی از نوع درمان انجام شده برای بیماران آگاهی نداشتند.

مرحله شش: در بررسی تنایع آزمون های PANSS و عوارض دارویی، بیمارانی که معیارهای خروج از بررسی را به دست می آوردند از پژوهش کنار گذاشته می شدند.

معیارهای خروج از پژوهش: ۱- افزایش به میزان ۳۰٪ در نمرات آزمون PANSS مثبت (P)، ۲- بروز عوارض دارویی شدید مانند افزایش فشار خون بارز، تشنج، بی قراری شدید، سرگیجه شدید یا حساسیت های دارویی، ۳- بروز مشکلات پزشکی که نیازمند درمان دارویی باشد مانند اسهال شدید، عفونت های ادراری، اختلالات قلبی، عروقی، و یا ضربه، ۴- ترخیص موقعت یا دائم از بیمارستان در طول مدت بررسی و ۵- بروز عالیم روانپزشکی جدید مانند حملات مانیا/هیپomania و حملات پانیک.

مرحله هفت: پس از پایان شش هفته، داروی سلژیلین به تدریج قطع شد.

ابزار پژوهش عبارت بود از:
مقیاس عالیم مثبت و منفی (PANSS): این آزمون برای ارزیابی ابعادی و تیپ شناسی پدیده اسکیزوفرنیا ساخته شده و دارای ۳۰ پرسش است که به ارزیابی عالیم مثبت و منفی بیمار بر پایه مصاحبه بالینی نیمه ساختاری می پردازد. هم چنین سه پرسش برای ارزیابی احتمال پرخاشگری در آن گنجانده شده است. هر پرسش در یک مقیاس هفت گزینه ای به روش لیکرت از نبود علامت تا بیش از حد بودن شدت آن پاسخ داده می شود (بالا، ۲۰۰۵). پایایی و روایی این آزمون بر DSM-IV-TR تشخیص اسکیزوفرنیا داده شده بودند ارزیابی شد. ضرایب الگا نشان دهنده پایایی بالا و همانندی در بین پرسش ها با ضریب رتبه بندی ۷۳ تا ۸۳ درصد برای هر کدام از میزان ها بود. شاخص های پایایی باز آزمایی برای زیر گروه های بیماران در یک پی گیری سه تا شش ماهه، ۸۹٪، ۸۲٪ و ۷۷٪ برای عالیم مثبت، منفی، ترکیبی و میزان های آسیب شناسی روانی عمومی به دست آمد (کای^۱، اوپلر^۲ و لیندن مایر^۳، ۱۹۸۹).

۹۰ بیمار در این بررسی شرکت نمودند، ده بیمار به علت نیاز به داروهای اضافی از بررسی کنار گذاشته شدند. ۱۲ بیمار نیز به علت تشدید عالیم مثبت و یا عوارض دارویی (در گروه پنج میلی گرم سلژیلین، یک نفر به دلیل ایجاد تهوع و استفراغ، یک نفر به دلیل تشنجه و چهار نفر به دلیل افزایش عالیم پسیکوتیک و در گروه ۱۰ میلی گرم سلژیلین، یک نفر به دلیل فشار خون بالا، یک نفر به دلیل عالیم مانیا و چهار نفر به دلیل افزایش عالیم پسیکوتیک) پژوهش را ترک نمودند. در نهایت ۶۸ نفر تا پایان طرح باقی ماندند.
تحلیل داده های گردآوری شده به کمک آزمون های آماری t و تحلیل واریانس انجام شد.

یافته ها

میانگین سنی بیماران مورد بررسی (۶۸ نفر) ۴۷/۶۲ سال (انحراف معیار ۱۰/۷۵) بود. میانگین سنی گروه پنج میلی گرم سلژیلین ۱۰، ۴۹/۱۰، ۴۹/۱۰ میلی گرم سلژیلین و گروه دارونما

پنج میلی گرم سلژیلین (۱۹ نفر)، ۱۰ میلی گرم سلژیلین (۱۹ نفر) و دارونما (۳۰ نفر) جای داده شدند. توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب محل سکونت و میزان تحصیلات در سه گروه یادشده در **جدول ۱** ارایه شده است.

مقایسه میزان داروی آنتی‌پسیکوتیک مصرفی تفاوت معنی داری از نظر میزان مصرف ریسپریدون و کلوزاپین در سه گروه نشان نداد (در گروه پنج میلی گرم سلژیلین به ترتیب ۵/۵۰ و ۱۷۸/۵۷، در گروه ۱۰ میلی گرم سلژیلین ۶۰/۰۰ و ۲۱۶/۶۶ و در گروه دارونما ۵/۸۶ و ۲۲۲/۳۳).

مقایسه میزان بهبود عالیم مثبت PANSS در هر سه گروه بیماران، نشان دهنده عدم تغییر معنی دار سطح نمره‌ها پس از شش هفته است (**جدول ۲**). مقایسه نمره PANSS گویای بهبود معنی دار عالیم در دو گروه دریافت کننده پنج و ۱۰ میلی گرم سلژیلین و عدم بهبود عالیم منفی در گروه دریافت کننده دارونما است (**جدول ۲**). مقایسه نمره عالیم منفی PANSS در سه گروه مورد بررسی به کمک آزمون تحلیل واریانس، نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار میزان بهبود می‌باشد. مقایسه نمره عالیم مثبت PANSS در سه گروه نیز نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار در میان سه گروه بود.

جدول ۱- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب محل سکونت و میزان تحصیلات در سه گروه مورد بررسی

محل سکونت	گروه سلژیلین			
	کل	گروه بیماران	پنج دارونما (درصد)	میلی گرم
روستا	۵۲/۹	۱۴	۱۱	۱۰
شهرستان	۲۲/۱	۹	۰	۶
شهر بزرگ	۲۵/۰۰	۷	۸	۳

میزان تحصیلات	بی‌سواد	ابتدایی	راهنما	متوسطه و بالاتر
بی‌سواد	۵۵/۹	۱۶	۱۱	۱۰
ابتدایی	۳۰/۹۰	۱۲	۶	۴
راهنما	۱۱/۸	۲	۲	۴
متوسطه و بالاتر	۱/۵	۰	۰	۱

۴۵/۴۰ بود. میانگین مدت بستری بیماران در بیمارستان ۸/۹۴ سال و دامنه ۲-۳۵ سال بود. میانگین مدت بستری در گروه پنج میلی گرم سلژیلین ۷/۶۲، ۱۰ میلی گرم سلژیلین ۱۱/۳۶ و گروه دارونما ۸/۰۵ سال بود. بیماران در سه گروه گیرنده

جدول ۲- میزان تغییرات نمره‌های مقیاس عالیم مثبت و منفی (PANSS) در هفته‌های صفر و شش در زیر گروه‌های مورد بررسی، نمره ۶۰ و سطح معنی داری

گروه‌های مورد مطالعه	نمرات PANSS	هر هفته صفر	هر هفته شش	t	سطح معنی داری
گروه سلژیلین (پنج میلی گرم)	عالیم منفی	۲۶/۶۸	۲۴/۳۱	۲/۱۸	۰/۰۴
عالیم مثبت	عالیم مثبت	۱۴/۲۱	۱۳/۳۲	۱/۲۳	N.S.
گروه سلژیلین (۱۰ میلی گرم)	عالیم منفی	۲۸/۹۰	۲۴/۸۱	۳/۹۰	۰/۰۰۱
عالیم مثبت	عالیم مثبت	۱۴/۲۱	۱۳/۳۱	۱/۱۳	N.S.
گروه دارونما	عالیم منفی	۲۵/۵۷	۲۳/۶۱	۱/۲۸	N.S.
عالیم مثبت	عالیم مثبت	۱۵/۳۵	۱۴/۲۵	۱/۱۴	N.S.

بحث

(۱۹۹۶) در یک بررسی همراه با یک گروه گواه و بهره‌گیری از دارونما بر روی ۲۱ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا یا اختلال اسکیزوافکتیو، یک بهبود ۳۴/۷٪ در علایم منفی به دنبال شش هفتۀ درمان با دوز ۱۰ میلی گرم سلژیلین را گزارش نمود. گفتنی است که بر خلاف بررسی حاضر، در پژوهش یادشده بیماران تحت درمان با داروهای تثیت‌کننده خلق، مانند لیتیم و والپرات سدیم از بررسی کثار گذاشته نشده بودند. این موضوع یکی از محدودیت‌های مهم پژوهش بودکین (۱۹۹۶) بود. هم‌چنین هفت بیمار از ۲۱ بیمار مورد بررسی آنان، تشخیص اختلال اسکیزوافکتیو و نمرات بالای در آزمون هامیلتون پیش از آغاز درمان داشتند و با درمان سلژیلین در نمرات هامیلتون نیز بهبود نشان دادند. از این رو بهبود در علایم منفی بیماران ممکن است به دلیل بهبود در علایم افسردگی این بیماران باشد، نه علایم منفی آنها و این موضوع در بررسی حاضر نیز ممکن است صادق باشد.

ژونگرمن^{۲۲}، راینوویتز^{۲۳} و کلین^{۲۴} (۱۹۹۹)، یک بررسی کنترل شده با دارونما و دوسوکور را بر روی ۱۶ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا با علایم منفی بارز انجام دادند و در آن سلژیلین به میزان ۱۵ میلی گرم در روز یا دارونما به مدت هشت هفته به رژیم آنتی‌پسیکوتیک بیماران افروختند. در بررسی یادشده، بیماران به جز داروهای آنتی‌پسیکوتیک، داروی دیگری دریافت نمی‌کردند، ولی رژیم آنتی‌پسیکوتیک آنها با یکدیگر تفاوت بود. هم‌چنین این بررسی بر روی بیماران غیربستری انجام شده بود. یافته‌های این بررسی، بهبود معنی‌دار در هر دو گروه گیرنده سلژیلین و دارونما را نشان داد. میزان کاهش در نمرات علایم منفی PANSS در گروه دریافت‌کننده سلژیلین ۴±۳/۵ و در گروه گیرنده دارونما ۴±۵/۵ بود، ولی دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. این یافته با یافته بررسی حاضر تا اندازه‌ای هم‌خوانی دارد. گفتنی است که یکی نبودن رژیم آنتی‌پسیکوتیک

کاربرد داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز در روانپزشکی از سال ۱۹۵۰ آغاز شد (سیریس^۱؛ ۱۹۹۵؛ بربنر^۲ و شاپسین^۳، ۱۹۸۰). در آن هنگام پژوهشگران دریافتند که داروی اپرونیازید (نخستین داروی این گروه) که به عنوان آنتی‌بیوتیک در سل کاربرد داشت، میزان افسردگی و رنجوری بیماران مبتلا به سل را کاهش می‌داد (کول^۴، جونز^۵ و کلرمن^۶، ۱۹۶۱). از این رو پژوهشگران بر آن شدند تا این دارو را در روانپزشکی به کار بزنند. نخستین گروه از بیماران روانپزشکی که مورد بررسی قرار گرفتند، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن بودند و داروی اپرونیازید در درمان این بیماران مؤثر گزارش گردید (کامان^۷، فریمن^۸ و لوسرو^۹، ۱۹۵۳).

از آن پس بررسی‌های چندی در این زمینه انجام شد و در شماری از آنها، اثرات مثبت داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز بر روی بی‌احساسی^{۱۰} و انزوای اجتماعی بیماران گزارش شد (بوسی^{۱۱}، ۱۹۸۷). اما در برخی پژوهش‌ها نیز بیش برانگیختنگی^{۱۲} علایم پسیکوتیک گزارش گردید (کول و همکاران، ۱۹۶۱).

نخستین بررسی کنترل شده در این زمینه را بوسی (۱۹۸۷) انجام داد. وی ۳۰ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و غیربستری را که دارای علایم منفی بارز بودند، با درمان ترکیبی با کلرپرومazine و ترانایل‌سیپرومین و یا دارونما تحت درمان قرار داد و یک بهبود معنی‌دار در علایم منفی بیماران، در گروه گیرنده ترانایل‌سیپرومین نشان داد. نامبرده نشانه‌ای از تشدید پسیکوز در هیچ‌کدام از بیماران گزارش نکرد.

سلژیلین که یک مهارکننده مونوآمین اکسیداز نوع B بود، از سال ۱۹۸۹ در آمریکا عرضه شد و به دلیل اثرات دوپامین‌رژیک آن در بیماران پارکینسون به کار برد شد (لیز^{۱۳}، ۱۹۹۱). این دارو، در دوزهای غیرانتخابی نیز دارای اثرات ضد افسردگی است (مان^{۱۴} و همکاران، ۱۹۸۹؛ مک‌گراس^{۱۵}، ۱۹۸۹؛ استوارت^{۱۶} و هاریسون^{۱۷}، ۱۹۸۹؛ کوئیتکین^{۱۸} و همکاران، ۱۹۸۴؛ ساندرلند^{۱۹} و همکاران، ۱۹۹۴).

با توجه به اثرات مثبت این دارو در بالابردن خلق و بهبود کندکاری ذهنی^{۲۰} در بیماران پارکینسون و شbahت این علایم با علایم منفی اسکیزوفرنیا، پژوهشگران از این دارو در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بهره گرفتند.

پس از گزارش چند پژوهش موردي، در زمینه اثرات مثبت سلژیلین بر روی علایم منفی، بودکین^{۲۱} و همکاران

1- Siris	2- Brenner
3- Shopsin	4- Cole
5- Jones	6- Klerman
7- Kamman	8- Freeman
9- Lucero	10- apathy
11- Bucci	12- overstimulation
13- Lees	14- Mann
15- McGrath	16- Stewart
17- Harrison	18- Quitkin
19- Sunderland	20- bradyphrenia
21- Bodkin	22- Jungerman
23- Rabinowitz	24- Klein

گفتن آن خودداری کرده و در مصاحبه‌های دوم و سوم آنها را بازگو کرده‌اند. به بیان دیگر ممکن است، کاهش در برخی ماده‌های علایم منفی مانند ارتباط ضعیف، باعث افزایش کاذب علایم مثبت بیماران شده باشد، نه افزایش علایم در اثر سلژیلین. هم‌چنین تشدید علایم، ممکن است به دلیل کاهش افسردگی ثانویه به بیماری زمینه‌ای باشد. اظهارنظر در این زمینه، نیازمند بررسی‌های بیشتر با حجم نمونه بزرگتر است.

ژونگرمن و همکاران (۱۹۹۹) افزودن سلژیلین را در درمان علایم منفی بیماران، دارای برتری نسبت به دارونما گزارش نکردند. در بررسی آنان میانگین کاهش علایم منفی در گروه گیرنده سلژیلین $4 \pm 3/5$ و در گروه دارونما $4 \pm 5/5$ بود و در بررسی حاضر، میزان کاهش علایم منفی در گروه گیرنده پنج میلی گرم سلژیلین $2/37$ ، در گروه گیرنده 10 میلی گرم سلژیلین $4/95$ و در گروه دارونما $1/57$ بود. تأثیر دارونما که در بررسی ژونگرمن و همکاران (۱۹۹۹) و در بررسی حاضر دیده شده است را پژوهشگران در مطالعات گوناگون بر روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی گزارش نموده‌اند (تیامین^۱ و همکاران، ۱۹۹۶).

از آن جا که در بسیاری از بررسی‌های یادشده کاستی‌هایی دیده می‌شود، در این بررسی کوشش گردید این کاستی‌ها از میان برداشته شوند. در بررسی حاضر همه بیماران دارای مکان زندگی، رژیم غذایی و ارتباطات اجتماعی یکسان بوده‌اند و عوامل مخدوش‌کننده مانند داروهای تشییت کننده خلقی یا داروهای آنتی‌پسیکوتیک گوناگون و مصرف نکردن دارو توسط بیماران حذف شده است.

هم‌چنین اثرات فشارهای روانی خانوادگی و اجتماعی که ممکن است سبب تشدید علایم پسیکوتیک بیماران و یا ایجاد افسردگی در بیماران شود، برای همه بیماران یکسان بوده و بیماران در طول مدت بررسی از بیمارستان ترجیح نشده بودند.

تفاوت آشکار این مطالعه با بررسی‌های یادشده در بالا، آن بود که در آن بررسی‌ها، بیماران شرکت کننده، همگی سرپایی و غیربستره بوده‌اند و در بررسی حاضر همه آزمودنی‌ها بیماران بستری بودند. این تفاوت بسیار با اهمیت است، زیرا تغییرنیافن آشکار در علایم منفی، ممکن است به دلیل عدم وجود شرایط محیطی و اجتماعی مناسب برای تغییر باشد.

بیماران و کمبودن حجم نمونه بیماران از محدودیت‌های بررسی یادشده بوده است.

بودکین و همکاران (۲۰۰۵) در یک بررسی به کمک گروه گواه و دارونما و به صورت دوسوکور، در سه مرکز دانشگاهی به صورت همزمان ۶۷ بیمار مبتلا به اسکیزوفرینی و دارای علایم منفی بارز را، با 10 میلی گرم سلژیلین در روز یا دارونما تحت درمان قرار دادند. همه بیماران شرکت کننده در بررسی، سرپایی بودند؛ غیر از داروهای آنتی‌پسیکوتیک، داروی دیگری دریافت نمی‌کردند و به اختلال خلقی و یا اختلال اضطرابی به صورت همزمان مبتلا نبودند. نتایج، بهبود معنی دار در علایم منفی را در گروه گیرنده سلژیلین نسبت به دارونما نشان داد، اما تغییری در علایم مثبت دیده نشد. محدودیت مهم بررسی یادشده یکسان‌بودن رژیم آنتی‌پسیکوتیک در این بیماران و یکسان‌بودن مکان انجام پژوهش گزارش گردید. هر چند میانگین میزان مصرف آنتی‌پسیکوتیک در دو گروه (بر پایه محاسبه دوز معادل کلرپرومازین) با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت، ولی بررسی‌های گذشته نشان داده‌اند که داروهای آنتی‌پسیکوتیک گوناگون، اثرات متفاوتی بر علایم منفی دارند که می‌تواند بر یافته‌های این بررسی تأثیرگذار باشد. در بررسی حاضر همه بیماران تنها یکی از دو نوع آنتی‌پسیکوتیک ریسپریدون و یا کلوzapین را دریافت می‌کردند که میانگین دوز دریافتی نیز در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.

علایم مثبت بیماران نیز در این بررسی ارزیابی شد و همان گونه که بیان شد، هشت بیمار (۷/۲٪)، به دلیل افزایش بیشتر از 30% در علایم مثبت، از بررسی کنار گذاشته شدند. گفتنی است که در برخی بررسی‌ها نیز به اثرات تشدید کننده سلژیلین بر پسیکوز اشاره شده است (کامان و همکاران، ۱۹۵۳) و در چند بررسی هم افزایشی در علایم مثبت گزارش نشده است (گوف^۲ و همکاران، ۱۹۹۳؛ بودکین، ۲۰۰۵).

در بررسی حاضر هر هشت بیمار در گروه‌های گیرنده سلژیلین بودند (چهار بیمار در گروه پنج میلی گرم سلژیلین و چهار بیمار در گروه 10 میلی گرم سلژیلین) که به دلیل شمار کم این بیماران امکان ارزیابی آماری وجود نداشت.

با توجه به عدم تغییر معنی دار میزان علایم مثبت بیماران (۶۸ بیمار)، افزایش علایم پسیکوز در این هشت بیمار ممکن است به دلیل افزایش تماس پزشک-بیمار و اعتماد بیماران به مصاحبه‌گر و بیان علایمی باشد که در مصاحبه‌های پیشین از

- symptom schizophrenia in a high-risk population. *Archives of General Psychiatry*, 47, 622-632.
- Cole, J. O., Jones, R. T., & Klerman, G. L. (1961). Drug therapy: *Progress in Neurology and Psychiatry*, 16, 539-574.
- Danion, J. M., Rein, W., & Fleurot, O. (1999). Improvement of schizophrenic patients with primary negative symptoms treated with amisulpride. *American Journal of Psychiatry*, 156, 610-616.
- Dworkin, R. H., & Lenzenwenger, M. F. (1984). Symptoms and the genetics of schizophrenia: Implacations for diagnosis. *American Journal of Psychiatry*, 141, 1541-1546.
- Dworkin, R. H., Lenzenwenger, M. F., & Moldin, S. O. (1987). Genetics and the phenomenology of schizophrenia. In P. D. Harvey, E. F. Walker (Eds.) *Positive and negative symptoms of psychosis*. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
- Goff, D. C., Renshaw, P. F., Sarid-segal, O., Dreyfus, D., Amico, E. T., & Ciraulo, D. A. (1993). A placebo-controlled trial of selegiline in the treatment of tardive dyskinesia. *Biological Psychiatry*, 33, 700-706.
- Heresco-levy, U., Javitt, D. C., Ermilov, M., Mordel, C., Silipo, G., & Lichtenstein, M . (1999). Efficacy of high-dose glycine in the treatment of enduring negative symptoms of Schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 56, 29-36.
- Jin, Y., Potkin, S. G., Kemp, A. S., Huerta, S. T., Alva, G., Thai, T. M., Carreon, D., & Bunney, W. E. (2006). Therapeutic effects of individualized alpha frequency transcranial magnetic stimulation (α TMS) on the negative symptoms of schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 32, 556-561.
- Jokers-scherbl, M. C., Bauer, A., Godemann, F., Reischies, F. M., Selig, F., & Schlattmann, P. (2005). Negative symptoms of schizophrenia are improved by the addition of paroxetine to neuroleptics: A double-blind placebo-controlled study. *International Clinical Psychopharmacology*, 20, 27-31.
- Jungerman, T., Rabinowitz, D., & Klein, E. (1999). Deprenyl augmentation for treating negative symptoms of schizophrenia: A double-blind, controlled study. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 19, 522-525.

گذشته از چند گزارش موردنی در زمینه بهبود عالیم منفی بر اثر سلژیلین، و چند کارآزمایی بالینی که سلژیلین را دارای تأثیر مثبت و در برخی از آنها دارای تفاوت با دارونما گزارش نکرده‌اند، اظهارنظر قطعی نیازمند انجام بررسی‌های گستردۀ تر است که در آن بیماران بستری و غیربستری نیز مورد مقایسه قرار گیرند.

سپاسگزاری

این بررسی با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

دربافت مقاله: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۶/۱۱/۲

پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۱۱/۸

منابع

- Blacker, D. (2005). Psychiatric Rating Scale. In B. J. Sadock, V. A. Sadock (Eds.), *Comprehensive textbook of Psychiatry* (8th ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Bodkin, J. A., Cohen, B. M., Salomon, M. S., Cannon, S. E., Zornberg, G. L., & Cole, J. O. (1996). Treatment of negative symptoms in schizophrenia and schizoaffective disorder by selegiline augmentation of antipsychotic medication: A pilot study examining the role of dopamine. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 184, 295-301.
- Bodkin, J. A., Siris, S. G., Bermanzohn, P. C., Hennen, J., & Cole, J. O. (2005). Double-blind, placebo-controlled, multicenter trial of selegiline augmentation of antipsychotic medication to treat negative symptoms in outpatients with schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 162, 388-390.
- Brenner, R., & Shopsin, B. (1980). The use of monoamin oxidase inhibitors in schizophrenia. *Biological Psychiatry*, 15, 633-647.
- Bucci, L. (1987). The negative symptoms of schizophrenia and the monoamine oxidase inhibitors. *Psychopharmacology*, 91, 104-108.
- Canon, T. D., Mednick, S. A., & Parnas, J. (1990). Antecedents of predominantly negative and predominantly positive

- Kamman, G. R., Freeman, J. G., & Lucero, R. (1953). The effect of Iproniazid on the behavior of long-term mental patients. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 118, 391-407.
- Kapur, S., & Remington, G. (1996). Serotonin-dopamine interaction and its relevance to schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 153, 466-476.
- Kay, S. R., Opler, L. A., & Lindenmayer, J. P. (1989). Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS): Rationale and standardization. *British Journal of Psychiatry*, 155, 59-67.
- Kirkpatrick, B., & Cenk T. (2005). Schizophrenia: Clinical features and psychopathology concepts. In B. J. Sadock, V. A. Sadock (Eds.). *Comprehensive textbook of psychiatry* (8th. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Lees, A. (1991). Selegiline hydrochloride and cognition. *Acta Neurologica Scandinavica, Supplementum*, 136, 91-94.
- Mann, J., Aarons, S., Wilner, P., Keilp, J., Sweeney, J., Pearlstein, T., Francis, A., Kocsis, J., & Brown, R. A. (1989). Controlled study of the antidepressant efficacy and side effects of L-deprenyl: A selective monoamine oxidase inhibitor. *Archives of General Psychiatry*, 46, 45-50.
- McGrath, P., Stewart, J., & Harrison, W. A. (1989). Placebo-controlled trial of l-deprenyl in atypical depression. *Psychopharmacology Bulletin*, 25, 63-67.
- Moller, H. J., Riedel, M., Muller, N., Fisher, W., & Kohnen, R. (2004). Zotepine versus placebo in the treatment of schizophrenic patients with stable primary negative symptoms: A randomized double-blind multicenter trial. *Pharmacopsychiatry*, 37, 270-278.
- Quitkin, F. M., Liebowitz, M. R., Stewart, J. G., McGrath, P. J., Harrison, W., Rabkin, J. G., Markowitz, J., & Davies, S. O. (1984). L-deprenyl in atypical depressives. *Archives of General Psychiatry*, 41, 777-781.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). *Synopsis of psychiatry* (8th. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Silver, H. (2004). Selective serotonin re-uptake inhibitor augmentation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 5, 2053-2058.
- Siris, S. (1995). Depression and schizophrenia. In S. Hirsch, D. Weinberg (Eds.), *Schizophrenia*. London: Blackwell Publications.
- Strous, R. D., Maayan, R., Lapidus, R., Stryjer, R., Lustig, M., Kotler, M., & Weizman, A. (2003). Dehydroepiandrosterone augmentation in the management of negative, depressive, and anxiety symptoms in schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 60, 133-141.
- Sunderland, T., Cohen, R., Molchan, S., Lawlor, P., Mellow, A., Newhouse, P., Tariot, P., Mueller, E., & Murphy, D. (1994). High dose selegiline in treatment resistant older depressive patients. *Archives of General Psychiatry*, 51, 607-615.
- Tiaminen, T., Syvalahti, E., Saarjiarvi, S., Lehto, H., Ahola, V., & Salokangas, R. K. (1996). Prediction of positive placebo response among chronic schizophrenic outpatients. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 184, 109-113.
- Zubin, J., & Spring, B. (1997). Vulnerability: A new view of schizophrenia. *Journal of Abnormal Psychology*, 86, 103-126.

Original Article

Effects of Selegiline on Negative Symptoms in Schizophrenia: A Double-Blind Clinical Trial

Fayazi Bordbar, M. R., Abdollahian, E., Hojjat, K., & Samari, A. A. (2008). Effects of selegiline on negative symptoms in schizophrenia: A double-blind clinical trial. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology*, 14, 131-139.

Abstract

Objectives: This research was carried out with the aim of examining the effects of selegiline, a monoamine oxidase-B inhibitor with dopaminergic features, on the treatment of patients with schizophrenia with prominent negative symptoms.

Method: In a clinical trial, 80 inpatients at the Hejazi Hospital in Meshed, who were diagnosed with schizophrenia based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fourth edition-Text Revision (DSM-IV-TR) criteria, and had prominent negative symptoms (a score of over 15 in Positive and Negative Symptom Scale [PANSS]) entered the study. The patients were randomly divided into three groups: Patients receiving 5mg selegiline, patients receiving 10mg selegiline, and those receiving placebo along with an antipsychotic drug. The patients were then followed-up for six weeks using PANSS and Drug Side Effects Test. Data were analyzed using analysis of variance and t-test.

Results: Eight patients were excluded from the study due to an increase in psychotic symptoms and four were excluded because of drug side effects. Mean age of patients was 47.6 and the mean duration of hospitalization was 8.9 years. Even though there was an improvement in negative symptoms in both groups receiving selegiline, the difference between the groups receiving selegiline and the group receiving placebo was not significant.

Conclusion: Selegiline is not superior to placebo in reducing negative symptoms in hospitalized patients.

Key words: selegiline, negative symptoms, schizophrenia

Mohammad Reza Fayazi Bordbar ^{*},
Ebrahim Abdollahian^a, Kaveh Hojjat^b,
Ali Akbar Samari^c

* Corresponding author: Psychiatrist, Assistant Prof. of Meshed University of Medical Sciences. Ebnesina Hospital, Horr-r-Ameli, St., Meshed, Iran, IR.
Fax: +98511-7112723
E-mail: fayyazimr@mums.ac.ir

^a Psychiatrist, Associate Prof. of Meshed University of Medical Sciences; ^b Psychiatrist, Bojnord Health District; ^c MA. in Psychology, Kashmar Azad University.

۲۳۲
232