

دشواری‌های تشخیص اختلال دوقطبی در کودکان: از چارچوب تشخیصی رسمی تا معیارهای تشخیصی آشتفتگی شدید در تنظیم خلق

دکتر الهام شیرازی^۱، دکتر زهرا شهریار^۲

Diagnostic Debates of Childhood Bipolar Disorder: From the Formal Diagnostic Criteria to the Severe Mood Dysregulation

Elham Shirazi*, Zahra Shahrivar^a

Abstract

Objectives: Defining bipolar disorder in children is a topic of multiple debates. DSM-IV criteria can not cover all clinical phenotypes. This paper represents a literature review on this topic. **Method:** In a review study, data were collected through searching in relevant databases and assessing available texts. **Results:** Developmental processes may change clinical presentation of bipolar disorder in children. Comorbidity with other disorders and normal childhood phenomena adds to the diagnostic debates. Atypical presentation appears to be the common clinical picture of bipolar disorder in childhood. Its premorbid symptoms, longitudinal course and continuity to adulthood are still not completely understood. Some investigators have proposed three clinical phenotypes for childhood bipolar disorder. Wide researches are trying to evaluate the validity of broad phenotype bipolar disorder or "severe mood dysregulation". **Conclusion:** Defining clinical phenotypes is important in planning the treatment and anticipating the course and prognosis of the illness. The diagnostic subtyping will have higher validity if based on data from multiple sources namely phenomenology, course of illness, biological markers, familial clustering, and treatment response.

Key words: bipolar disorder; children; mood; dysregulation

[Received: 25 December 2008; Accepted: 7 April 2009]

چکیده

هدف: شناسایی اختلال دوقطبی در کودکان دشواری‌های گوناگونی **DSM-IV** توانایی ارزیابی همه نمونه‌های بالینی را ندارد. در این نوشتار برآیند یافته‌های کنونی را پیش رو گذاشته‌ایم. **روش:** در یک بررسی مراجعه، با جستجو در پایگاه‌های آگاهی‌رسانی و بررسی نوشتۀ‌های در دسترس، داده‌ها گردآوری شدند. **یافته‌ها:** فرآیندهای رشدی می‌توانند نمای بالینی اختلال دوقطبی کودکان را دگرگون کنند. هم‌بوشی با اختلال‌های دیگر و پدیده‌های طبیعی دوران کودکی به دشواری‌های تشخیصی می‌افزاید. گمان می‌رود نمود بالینی اختلال دوقطبی در کودکان بیشتر غیرتیپیک باشد. درباره نشانه‌های پیش‌درآمدی، روند طولی و پیوستگی آن به بزرگسالی هنوز ناشناخته‌های زیادی وجود دارد. برخی پژوهشگران سه نمای بالینی را برای اختلال دوقطبی کودکان پیشنهاد کرده‌اند. بررسی روایی نمای بالینی گسترده‌ای «آشتفتگی شدید در تنظیم خلق» با پژوهش‌های گسترده‌ای پی‌گیری می‌شود. **نتیجه گیری:** شناخت نمایهای بالینی برای برنامه‌ریزی درمان و پیش‌بینی روند بیماری ارزشمند است. اگر گروه‌بندی‌های تشخیصی بر پایه گردآوری یافته‌ها از زمینه‌های گوناگون نشانه‌شناسی، روند بیماری، نشانه‌های زیست‌شناختی، انباستگی خانوادگی و پاسخ درمانی باشد، روایی پیشتر در پی خواهد داشت.

کلیدواژه: اختلال دوقطبی؛ کودکان؛ نمای بالینی؛ آشتفتگی شدید در تنظیم خلق

[دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۰/۵؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۱/۱۸]

^۱ روانپژشک، فوق تحصص روانپژشکی کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات بیانش روان، گروه پژوهشی اختلالات دوقطبی. تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، استیتو روپژشکی تهران. دورنگار: ۰۲۱-۶۶۵۰۶۸۵۳. (نویسنده مسئول). E-mail: shirazi_elham@yahoo.com.

^۲ روانپژشک، فوق تحصص روانپژشکی کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران.

* Corresponding author: Child and Adolescent Psychiatrist, Assistant Prof. of Iran University of Medical Sciences. Mental Health Research Centre, Bipolar Disorder Research Group, Tehran Psychiatric Institute, Niayesh St., Sattarkhan Ave., Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-66506862. E-mail: Shirazi_elham@yahoo.com; ^a Child and Adolescent Psychiatrist, Assistant Prof. of Tehran University of Medical Sciences.

مقدمه

۱۴- آیا BD کودکان با BD بزرگسالان پیوستگی تشخیصی دارد؟؛ ۱۵- آیا نمای غیرتیپیک مانیا در کودکی و نمای کلاسیک^{۳۶} مانیا در بزرگسالی هر دو نمایانگر یک بیماری است؟ (کیم^{۳۷} و میکلوویتز^{۳۸}؛ ۲۰۰۲؛ کنت^{۳۹} و کرادوک^{۴۰}؛ ۲۰۰۳؛ لیبن لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ مک کله لان^{۴۱}؛ ۲۰۰۵).)

این پرسش‌ها و بسیاری پرسش‌های گوناگون دیگر از چالش‌های کنونی در رویارویی با اختلال دوقطبی کودکان است که پاسخ بسیاری از آنها هنوز روش نیست. این نوشتار می‌کوشد یافته‌های کنونی را در این زمینه بررسی نماید.

روش

داده‌ها با جستجو در پایگاه‌های آگاهی‌رسانی رایانه‌ای در برگیرنده Medline^۵ و PsycINFO برای منابع انگلیسی و SID^۶ برای منابع فارسی فراهم شد. در فرآیند جستجوی رایانه‌ای از کلیدواژه‌های juveniles bipolar disorder (مقاله)، early onset bipolar disorder (مقاله)، prepubertal bipolar disorder (مقاله)، childhood bipolar disorder (مقاله)، disorder early adolescence (مقاله)، pediatric bipolar disorder (مقاله)، broad phenotype bipolar (مقاله)، bipolar disorder (مقاله) و bipolar disorder (مقاله) استفاده شد.

1- bipolar disorder	2- Leibenluft
3- Charney	4- Towbin
5- Bhagoo	6- Pine
7- Brotman	8- Ghaemi
9- Geller	10- Tillman
11- hallmark symptoms of mania	
12- reliability	13- validity
14- Biederman	15- discrete episodes
16- elevated mood	17- Wozniak
18- unstable or labile mood or mood swings	
19- emotional dysregulation	
20- rages or erratic explosive outbursts or anger episode	
21- severe mood dysregulation	
22- chronic irritability	
23- overactivity	24- abnormal mood
25- sadness	26- anger
27- mixed type mania	28- rapid cycling
29- Feldman-Naim	30- Turner
31- Freeman	32- McElroy
33- Cassidy	34- Carroll
35- atypic	36- criteria
37- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed.)	38- etiology
39- course	40- prognosis
41- comorbidity	42- psycho-neuro-physiologic
43- familial aggregation or familial clustering	
44- Carlson	45- Kelly
46- classic	47- Kim
48- Miklowitz	49- Kent
50- Craddock	51- McClellan
52- National Library of Medicine	
53- Scientific Information Database	

درباره تشخیص گذاری اختلال دوقطبی^۱ (BD) در کودکان دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد (لین لوفت^۲، چارنی^۳، توین^۴، بهانگو^۵ و پینه^۶؛ ۲۰۰۳؛ بروتن^۷ و همکاران، ۲۰۰۷؛ قائمی^۸؛ ۲۰۰۷). از میان دشواری‌های فراوانی که در این باره دیده می‌شود، می‌توان از نمونه‌های زیر سخن گفت:

۱- آیا اساساً BD در کودکان تشخیص دادنی است؟ (قائمی، ۲۰۰۷)؛ ۲- آیا نشانه‌های بالینی اختلال دوقطبی در کودکان همانند بزرگسالان است؟ (لین لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ گلر^۹ و تیل من^{۱۰}؛ ۲۰۰۵)؛ ۳- آیا تشخیص مانیا در کودکان نیاز به داشتن نشانه‌های ویژه مانیا^{۱۱} دارد؟ (لین لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ گلر و تیل من، ۲۰۰۵)؛ ۴- آیا تشخیص مانیا در کودکان از پایایی^{۱۲} و روایی^{۱۳} مناسبی برخوردار است؟ (بیدرمن^{۱۴}؛ ۱۹۹۸؛ گلر و همکاران، ۲۰۰۱)؛ ۵- آیا برای تشخیص مانیا در کودکان به دوره‌ای بودن نشانه‌ها و داشتن دوره‌های شناخته‌شدنی^{۱۵} نیاز است؟ (چارنی، توین، بهانگو و پینه، ۲۰۰۳؛ ریچ و همکاران، ۲۰۰۷)؛ ۶- اگر دوره‌ای بودن نیاز است، بلندی هر دوره دست کم باید چقدر باشد؟ (بیدرمن، ۱۹۹۸؛ بهانگو و همکاران، ۲۰۰۳)؛ ۷- آیا در BD کودکان، خلق بالا^{۱۶} فراوان است؟؛ ۸- آیا می‌توان در کودکان تحریک‌پذیری را یکی از نشانه‌های مانیا به شمار آورد؟ (وزنیاک^{۱۷} و همکاران، ۲۰۰۵؛ ریچ و همکاران، ۲۰۰۷)؛ ۹- آیا می‌توان در کودکان ناپایداری خلق^{۱۸}، آشفتگی در ساماندهی به هیجان‌ها^{۱۹} و جوشش‌های خشم^{۲۰} را برابر مانیا دانست؟؛ ۱۰- آیا «آشفتگی شدید در تنظیم خلق»^{۲۱} (SMD) گونه‌ای از اختلال دوقطبی کودکان است؟؛ ۱۱- بهترین تشخیص برای کودکانی که تحریک‌پذیری پایدار^{۲۲}، پرفعالیتی^{۲۳} و خلق غیرطبیعی^{۲۴} (غمگینی^{۲۵} و / یا عصبانیت^{۲۶}) دارند، چیست؟ (لین لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ بروتن و همکاران، ۲۰۰۷)؛ ۱۲- آیا مانیای نوع درهم^{۲۷} یا اختلال دوقطبی تند چرخش^{۲۸}، تشخیص درخوری برای این گونه کودکان (شماره ۱۱) است؟ (گلر و همکاران، ۱۹۹۵؛ فلدمن- نایم^{۲۹}، تورنر^{۳۰} و لین لوفت، ۱۹۹۷؛ بیدرمن، ۱۹۹۸؛ فری من^{۳۱} و مکالروی^{۳۲}، ۱۹۹۹؛ کاسیدی^{۳۳} و کارول، ۱۹۹۱؛ ۱۳- آیا کودکانی که نمای غیرتیپیک^{۳۵} مانیا را نشان می‌دهند با آنها که معیارهای^{۳۶} DSM-IV^{۳۷} را پر می‌کنند در سبب‌شناسی^{۳۸}، روند^{۳۹}، پیش‌آگهی^{۴۰}، بیماری‌های همراه^{۴۱}، ویژگی‌های سایکونوروپیزیولوژیک^{۴۲}، انباشتگی خانوادگی^{۴۳} و پاسخ درمانی یکسان هستند؟ (کارلسون^{۴۴} و کلی^{۴۵}؛ ۱۹۹۸)؛

آنها ناهمگون با بزرگسالان نماید (لین لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ چانگ، ۲۰۰۷).

هم اکنون کودکانی که به گونه‌ای همیشگی دچار ناپایداری خلق، جوشش هیجان‌ها^۴، سرکشی‌های ناگهانی و پیش‌بینی شده^۵، تحریک پذیری، بیش‌برانگیختگی^۶، رفاه‌های بی‌پروا^۷، پرخاشگری^۸ و پرفعالیتی هستند، تشخیص BD می‌گیرند (وزنیاک و همکاران، ۱۹۹۵، بیدرمن، ۱۹۹۸). بنابراین چهره تبییک اختلال دوقطبی در کودکان به گونه آشفتگی، بادا، در، سامانده^۹ به خلله، هسحان و، فتا، است.

در اختلال دوقطبی کودکان، دگرگونی‌های همیشگی، ناپایدار و نامنظم خلق، انرژی، هیجان و رفتار و همچنین تحریک پذیری و سیزه‌جویی پایدار^{۱۰} و مانیا نوی درهم فراوان تر از خلق بالاست. نشانه‌های اختلال دوقطبی کودکان بیشتر به گونه‌ای پایدار، همیشگی و غیردوره‌ای است. این کودکان در پاسخ به محرك‌های هیجانی منفی (مانند فشارهای روانی و کشمکش‌های بین‌فردي) چهار جوشش‌های چنددقیقه‌ای تا چند ساعتی خشم می‌گردند (وزنیاک و همکاران، ۱۹۹۵؛ گلر، تیلمن، کرنی^{۱۱} و بولهوفن^{۱۲}). این دوره‌های خشم در برابر گیرنده بالاترین اندازه تحریک‌پذیری است که بیشتر می‌تواند در مانيا دیده شود و شدت و مدت آن با پیش‌درآمد^{۱۳} خود هماهنگ ندارد (واشبوش^{۱۴} و همکاران، ۲۰۰۲). کودک در فاصله این دوره‌های جوشان خشم، دارای خلق غیرطبیعی (غمگینی یا عصباتی) است (لیبن‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳). در بیشتر نمونه‌های BD کودکان، همبودی با اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه^{۱۵} (ADHD) و اختلال رفتار ایدزایی^{۱۶} (DBD) دیده می‌شود.

بنابراین نمای BD در کودکان بیشتر غیرتیپیک است و نشانه‌های آن با BD کلاسیک بزرگسالان که با دوره‌های شناخته شده ماتیا-افسردگی نمایان می‌شود، یکسان نیست (بوروینگ^۷ و کواکس^۸، ۱۹۹۲). هم‌زمان بررسی‌هایی وجود

narrow phenotype bipolar disorder (٣٩ مقاله)، disorder bipolar (٤ مقاله)، severe mood dysregulation (١٣ مقاله)، اختلال دوقطبی spectrum disorder (١٦ مقاله) بهره گرفته شد. افزون بر آن، کلیدواژه‌های دیگر مانند phenomenology (٤٤ مقاله)، clinical phenotype (٢٨ مقاله)، boundaries (٥ مقاله)، clinical characteristics (١٣ مقاله)، diagnosis (١٧ مقاله) و clinical course (١٠٢ مقاله)، outcome (١٧ مقاله) نیز به کار گرفته شد. برای آغاز جستجو هیچ گونه مرزبندی زمانی گذاشته نشد و روند به روز شدن آن تا آذر ۲۰۰۸ (دسامبر ۲۰۰۸) به، گیری شد.

چند صد چکیده به دست آمده همگی بررسی شدند و مقاله‌های نزدیک به زمینه این نوشتار جدا شدند. در همه پژوهش‌ها تلاش شد به خود مقاله دسترسی پیدا شود و در بررسی‌هایی که امکان پذیر نشد، از چکیده بهره گرفته شد. در گزینش مقاله‌ها، مقاله‌های مروری ارزشمند، مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های بر جسته و دیدگاه‌ها و یافته‌های پژوهشی کارشناسان شناخته شده در تحلیل وارد شدند و مقاله‌هایی که از دیدگاه روش، شمار نمونه‌ها و محدودیت‌های پژوهشی کاستی‌های آشکار داشتند کار گذاشته شدند. افزون بر آن، از بررسی منابعی که مقاله‌های یاد شده به آنها برگشت داده بودند، منابع پیشنهادی همکاران کارآزموده و جستجوی دستی در منابع در دسترس نیز بهره گیری شد.

ما فته ها

آیا نمای بالینی^۱ اختلال دوقطبی در کودکی همان است که در بزرگسالی دیده می شود؟

در دهه‌های کنونی تعریف BD در کودکان دچار یک دگرگونی بنیادین شده است، به گونه‌ای که الگوی تعریف این بیماری و نشانه‌هایی که در کودکان توصیف می‌شود، با توصیف کلاسیک بیماری در بزرگسالان یکسان نیست (کارلسون، ۱۹۸۴). کودکان از دیدگاه روانی، اجتماعی و رشد عصب‌شناختی، چگونگی زندگی و برنامه‌های روزمره با بزرگسالان یکسان نیستند و باور بر این است که چهره دگرگون شده BD در کودکان برآیند اثر دوره‌های زندگی و فرآیندهای گوناگون تکاملی بر نمود نشانه‌های بیماری است. دگرگونی‌های عصب-زیست‌شناختی^۲، روانی و اجتماعی وابسته به سن می‌تواند بر نمای بالینی هر اختلال روانی که در کودکان رخ می‌دهد اثر داشته باشد و نشانه‌های بیماری را در

بسیاری از رفتارهایی که به نام خلق بالا شناخته می‌شوند، مانند خنده‌های بلند، رفتارهای سبک‌سرانه^۵، کارهای نسنجیده^۶، خودستایی و لاف‌زدن^۷ (مانند کودکی که در ورزش ناتوان است ولی فکر می‌کند می‌تواند ورزشکار نام‌آوری شود یا دزدی کرده ولی پس از لورفتن نیز نمی‌پذیرد که کار نادرستی انجام داده است)، در کودکان مبتلا به DBD نیز عادی و فراوان است. چگونه می‌توان این نشانه‌ها را از مانیا جدا کرد؟ هم‌چنین چگونه می‌توان تحریک‌پذیری مانیا را از تحریک‌پذیری، خشم و پرخاشگری که از علایم عادی و فراوان DBD است، جدا کرد؟ (لین‌لوft، چارنی و پینه، ۲۰۰۳).

از این رو برخی پژوهشگران داشتن نشانه‌های یکسان میان دو اختلال (مانند تحریک‌پذیری، پرفعالیتی، حواس‌پرتی، پرگویی) را به تنها بی شایسته تشخیص گذاری نمی‌دانند و در کنار آنها داشتن خلق بالا و بزرگ‌منشی را که ویژه اختلال دوقطبی است، برای تشخیص اختلال دوقطبی ضروری می‌دانند و آن را جایگزین بند «الف» در DSM-IV کرده‌اند (کرانی و گلر، ۲۰۰۳؛ گلر و همکاران، ۲۰۰۴). آنها بر این باورند که کم و بیش همه گونه‌های اختلال دوقطبی کودکان را می‌توان به این روش شناسایی نمود (استاتون،^۸ ولنس^۹ و بیتی^{۱۰}، ۲۰۰۸) و روایی این چارچوب تشخیصی را بر پایه معیارهای رایبیتر^{۱۱} و گوزه^{۱۲} (۱۹۷۰) نیز نشان داده‌اند (گلر و تیل من، ۲۰۰۵). از سوی دیگر برخی پژوهشگران نشانه‌های DSM-IV را، بدون هیچ گونه دگرگونی، برای شناسایی BD کودکان به کار برده‌اند و نشانه‌های یکسان با دیگر اختلال‌ها را کنار نگذاشتند. آنها بر این باورند که چون در بند «الف» داشتن خلق بالا، واگیردار^{۱۳} یا تحریک‌پذیر هر کدام به تنها بی

دارد که نشان می‌دهد خلق بالا در مانیای کودکان فراوان است و مانیای کودکان و بزرگ‌سالان می‌تواند نمای بالینی یکسانی داشته باشد (گودوین^۱ و جامیسون^۲؛ ۱۹۹۰؛ گلر، کرانی و همکاران، ۲۰۰۲؛ کواتچ^۳، یانگ‌استروم^۴، دانیالیان^۵ و فیندلینگ^۶؛ ۲۰۰۵؛ اکسل‌سون^۷ و همکاران، ۲۰۰۸). پرسشن پایه‌ای و برجسته‌ای که در اینجا با آن روبرو می‌شویم این است که: در کودکان چه اندازه ناهمگونی نشانه‌ها با بزرگ‌سالان پذیرفتنی است تا بتوان هم‌چنان BD را در آنها تشخیص گذاری نمود؟ (چانگ، ۲۰۰۷).

تنگناهای تشخیصی در اختلال دوقطبی کودکان

اختلال دوقطبی می‌تواند در کودکی و حتی در خردسالی رخ دهد (لوینسون^۸، کلاین^۹ و سیلی^{۱۰}؛ هیرش‌فلد^{۱۱}، لویس^{۱۲} و ورنیک^{۱۳}؛ دانیالیان، پاتاک^{۱۴}، کواتچ، آرسزنمن^{۱۵} و جونز^{۱۶}، ۲۰۰۷)، ولی بیشتر آنها شناسایی نمی‌شوند یا تشخیص نادرست می‌گیرند. این می‌تواند برآمده از کاربرد چارچوب‌های تشخیصی بزرگ‌سالان برای تشخیص گذاری در کودکان و همبودی زیاد دیگر اختلال‌های روانپزشکی با BD کودکان باشد (ولر^{۱۷}، ولر و دانیالیان، ۲۰۰۳).

جداکردن نشانه‌های اختلال دوقطبی کودکی از پدیده‌های طبیعی یا از دیگر اختلال‌های فراوان‌تر این دوران سنتی از دشواری‌های بزرگ و چالش‌برانگیزی است که در تشخیص BD کودکان با آن روبرو هستیم. برای نمونه بزرگ‌منشی^{۱۸} و آشفتگی روانی-حرکتی^{۱۹} و رفتارهای بی‌پروا از نشانه‌های ویژه مانیا است. با در نظر گرفتن همبودی زیادی که BD کودکان با ADHD و DBD دارد، تشابهی که کم و بیش میان نشانه‌های این اختلالات وجود دارد و فراوانی بالاتر ADHD در میان بیماران، نشانه‌های ADHD می‌تواند به نادرست از نشانه‌های BD به شمار آید. اگر ADHD ساده باشد می‌توان آن را از مانیا بازشناسی نمود (کلاین، پینه و کلاین، ۱۹۹۸؛ گلر و همکاران، ۱۹۹۸)؛ ولی در همراهی ADHD با اختلال نافرمانی ستیزه‌جویانه^{۲۰} (ODD)، مهارگسیختگی^{۲۱} ADHD و تحریک‌پذیری ODD، بازشناسی آنها را از مانیا سخت می‌کند (کارلسون، ۲۰۰۷). هم‌چنین چگونه می‌توان این نشانه‌ها را از اختلال‌های فراوان‌تر دوران کودکی مانند تحریک‌پذیری، پرتحرکی، بازی‌های خط‌نماک و بازی‌های ناپسند جنسی جدا کرد (کارلسون، لانی^{۲۲}، سالیس‌بوری^{۲۳} و ولپه^{۲۴}، ۱۹۹۸؛ کارلسون، کلاین، پینه و کلاین، ۱۹۹۸؛ کارلسون، ۲۰۰۷).

1- Goodwin	2- Jamison
3- Kowatch	4- Youngstrom
5- Danielyan	6- Findling
7- Axelson	8- Lewinsohn
9- Klein	10- Seeley
11- Hirschfeld	12- Lewis
13- Vornik	14- Pathak
15- Arszman	16- Johns
17- Weller	18- grandiosity
19- psychomotor dysregulation	
20- oppositional defiant disorder	
21- disinhibition	22- Loney
23- Salisbury	24- Volpe
25- silly behavior- giggling	26- youthful indiscretions
27- boasting	28- Staton
29- Volness	30- Beatty
31- Robins	32- Guze
33- expansive	

کودکی نیز دیده شوند. از این رو باید همواره از روند بالینی و تاریخچه خانوادگی نیز برای تشخیص گذاری بهره گیریم (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵؛ دافی، ۲۰۰۷).

آیا اختلال دوقطبی در کودکان دارای نماهای بالینی^۰ چندگانه است؟

هر چند در سال‌های کنونی شمار کودکانی که تشخیص BD گرفته‌اند به گونه‌ای چشم گیر افزایش یافته است (بالدسسارینی، ۲۰۰۰؛ جود، آکیسکال، ۲۰۰۳؛ بلادر و کارلسون، ۲۰۰۷)، ولی این کودکان از گروه‌های گوناگونی هستند. یکی از دشواری‌های پایه‌ای که در بررسی نوشته‌های پژوهشی کنونی با آن روبرو هستیم این است که پژوهشگران گوناگون، چارچوب‌های گوناگونی را برای تعریف BD به کار برده‌اند، از این رو آزمودنی‌های این پژوهش‌ها گروه‌های ناهمانندی^۹ را درست کرده‌اند. اگر بتوان در پژوهش‌ها به جای گروه‌های ناهمگون از زیرگروه‌های بالینی‌ای که کم و بیش همگونی^{۱۰} درونی داشته باشند، بهره بگیریم، دستاوردهایمان می‌تواند مایه پیشرفت‌های بیشتری در زمینه‌های گوناگون آسیب‌شناسی، ژنتیک، عصب-زیست‌شناسی و درمان اختلال دوقطبی گردد (لین‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳). داشتن سامانه‌های فوتیپیک^{۱۱} ریزبین، شناخت درست این نماهای بالینی و بهره گیری همه گیر از آنها در پژوهش‌ها به پژوهشکان کمک می‌کند که بتوانند روند، پیش‌آگهی و درمان شایسته را برای هر نمای بالینی پیش‌بینی نمایند (انستیتو ملی بهداشت روان، ۲۰۰۱). این کار بیماران و خانواده‌ها را نیز از سردرگمی بیرون می‌آورد (قائمی، ۲۰۰۷).

در همین راستا، لین‌لوفت، چارنی، توین و همکاران (۲۰۰۳) با بازبینی دقیق نوشته‌هایی که BD در کودکان را توصیف کرده بودند و گردآوری دیدگاه‌های کارشناسان زبردست، مانیای کودکان را بر پایه داشتن نشانه‌های ویژه، داشتن دوره‌های شناخته‌شده و بلندی دوره‌ها، به سه نمای بالینی زیر دسته‌بندی کردند:

- 1- Fristad
- 3- Richards
- 5- phenotype
- 7- Judd
- 9- heterogeneous
- 11- phenotypic
- 12- National Institute of Mental Health

- 2- Isaac
- 4- Duffy
- 6- Baldessarini
- 8- Akiskal
- 10- homogeneity

می‌تواند نشانه‌ای از مانیا به‌شمار آید و برای پرکردن بند «ب» تنها شمار نشانه‌ها (نه نوع آنها) اهمیت دارد، پس کنار گذاشتن برخی نشانه‌ها یا برتردانستن برخی دیگر، دورشدن از DSM-IV و پیروی نکردن از آن است. از دیدگاه آنها این کار می‌تواند مایه کنار گذاشتن نادرست برخی نماهای بالینی اختلال دوقطبی گردد (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵).

آشکار است که این ناهمانگی در چارچوب‌های تشخیصی، می‌تواند مایه ناهمگونی‌های زیاد در یافته‌های پژوهشی گردد. برخی پژوهشگران بر این باورند که اگر به یاری شیوه‌های آماری، اثر ناهمگونی در روش‌های پژوهشی کنار گذاشته شود، خواهیم دید که BD کودکان از نمای بالینی کم و بیش یکسانی برخوردار است (کواتچ، فریستاد و همکاران، ۲۰۰۵)، به گونه‌ای که بیش از ۸۰٪ آنها تحریک‌پذیری و بزرگ‌منشی (ایزاک، ۱۹۹۵؛ وزنیاک و همکاران، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، کرانی و گلر، ۲۰۰۳) و بیش از ۷۰٪ آنها خلق بالا دارند (ایزاک، ۱۹۹۵؛ وزنیاک و همکاران، ۱۹۹۵). البته خلق بالا در بیش از ۸۰٪ نمونه‌ها با تحریک‌پذیری همراه است و به تنها یکی بسیار کم دیده می‌شود (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). آنها بر این باورند که اگر نشانه‌های DSM-IV (جدا از معیارهای زمان و دوره‌ای بودن) به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند در شناسایی BD کودکان، توانند باشند (همان‌جا). آشکار است که این یافته‌ها با دیدگاه‌هایی که داشتن خلق بالا و بزرگ‌منشی را جایگزین بند «الف» کرده‌اند و این دو نشانه را برای شناسایی BD کودکان ضروری دانسته‌اند، سازگاری ندارد (وزنیاک و همکاران، ۱۹۹۵؛ وزنیاک، بیدرمن و ریچارد، ۲۰۰۱؛ وزنیاک، ۲۰۰۳؛ وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). می‌توان گفت برای شناسایی BD کودکان، خلق بالا از حساسیت پایین و ویژگی بالا؛ و تحریک‌پذیری از حساسیت بالا و ویژگی پایین برخوردار است (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵).

در حقیقت هیچ نشانه‌ای را نمی‌توان به تنها یکی برای شناسایی BD کودکان به کار برد، بلکه همیشه یک نمای بالینی که در برگیرنده گروهی از نشانه‌ها و یافته‌ها باشد، می‌تواند مایه تشخیص گذاری درست گردد (کواتچ، یانگ‌استروم و همکاران، ۲۰۰۵). در آغاز بیماری، نشانه‌ها می‌توانند ویژگی بالا نداشته باشند و در گستره‌ای از اختلال‌های دیگر دوران

جدول ۱- معیارهای تشخیصی برای اختلال خلقی دوقطبی با نمای بالینی مرزدار (NP-BD)

دگرگونی در معیار DSM-IV برای دوره مانیا

کودک باید بزرگمنشی یا خلق بالا/واگیردار^۱ نشان دهد و همان‌گاه معیارهای دیگر DSM-IV را نیز پر کند.

راهنمای به کاربردن معیار DSM-IV

دوره‌ها باید تمام معیار زمانی را پر کند (که هفت روز برای مانیا و چهار روز برای هیپومانیا) و با دگرگونی از حالت‌های دیگر خلقی

(افسردگی، حالت درهم، یوتایمی^۲) مرزبندی شود.

دوره‌ها با دگرگونی حالت پایه‌ای^۳ خلق بیمار (معیار الف (DSM-IV)، و همزمان، با بودن نشانه‌های وابسته (معیار ب (DSM-IV) مشخص

می‌شود. برای نمونه، در یک کودک دارای ADHD تنها، اگر حواس‌پرتی او آن‌گاه که دچار خلق بالا است بدتر می‌شود، به سود تشخیص (هیپو) مانیا به شمار می‌آید.

کاهش نیاز به خواب باید از بی‌خوابی^۴ (یعنی دشواری غیراختصاصی در خوابیدن که با خستگی همراه است) جدا شود.

قضاؤت بد^۵ به خودی خود معیاری برای (هیپو) مانیا نیست، قضاؤت بد باید در زمینه «افزایش کارهای هدفمند» یا «درگیری بیش از اندازه در کارهای لذت‌بخش که یارایی بالایی برای پیامدهای پردردرس دارد» رخ دهد.

(لین‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳)

1- expansive; 2- euthymia; 3- baseline; 4- insomnia; 5- poor judgment

«آشتگی شدید در تنظیم خلق» (SMD) نیز شناخته می‌شود. SMD در چارچوب کلاسیک DSM-IV نمی‌گنجد و خودش دارای یک چارچوب تشخیصی ریزین و جداگانه است (لین‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳) (جدول ۲).

در این میان برخی اندیشمندان، BD کودکان را مانند بزرگسالان دارای سرشت دوره‌ای می‌دانند و بر این باورند که برای شناسایی BD باید جدا از سن و تنها بر پایه چارچوب‌های DSM جلو رفت. آنها SMD را زیرگروهی از BD نمی‌دانند و از پذیرش BP-BD سریاز می‌زنند. آنان بر این باورند که پیروی از معیارهای گستردۀ، مایه افزایش انگکزدن به کودکان و روبرو کردن آنها با عوارض جانبی درمان‌های دارویی می‌شود که به آن نیازی نبوده است (بالدسارینی، توندو^۶ و هنن^۷، ۲۰۰۳). آنها معیارهای گستردۀ را خالی از روایی کافی و ویژگی در خور تشخیصی می‌دانند (قائمی، ۲۰۰۷).

- 1- Narrow Phenotype Bipolar Disorder
2- Intermediate Phenotype Bipolar Disorder
3- Not Otherwise Specified
4- Broad Phenotype Bipolar Disorder
5- Tondo
6- Hennen

۱- «اختلال دوقطبی با نمای بالینی مرزدار^۸ (NP-BD) که به اختلال دوقطبی کلاسیک که در DSM-IV تعریف شده است بسیار نزدیک است. در این نمای بالینی، مانیا با دوره‌هایی از نشانه‌های ویژه خلق بالا یا بزرگمنشی، که بلندی آن دست کم چهار روز باشد، شناسایی می‌شود (کارلسون، ۱۹۹۸؛ گلر و همکاران، ۱۹۹۸؛ گلر، کرنی و همکاران، ۲۰۰۲) (جدول ۱).

۲- «اختلال دوقطبی با نمای بالینی میانه^۹ (IP-BD) که دربرگیرنده دو دسته است:

الف: داشتن دوره‌های شناخته شده مانیا با نشانه‌های ویژه خلق بالا یا بزرگمنشی که بلندی آن تنها ۱-۳ روز باشد (مانند گونه‌ای از اختلال دوقطبی NOS^{۱۰})

ب: داشتن دوره‌های شناخته شده مانیا با نشانه‌های تحریک‌پذیری (خلق بالا ندارد) که بلندی آن دست کم چهار روز باشد.

۳- «اختلال دوقطبی با نمای بالینی گستردۀ^{۱۱} (BP-BD) که نمونه‌هایی را دربرمی‌گیرد که بیماری با نمای تحریک‌پذیری و بیش‌برانگیختگی که همیشگی است و دوره‌ای نیست، آشکار می‌شود. این نمای بالینی به نام

جدول ۲- معیارهای پژوهشی برای تشخیص اختلال دوقطبی با نمای بالینی گستردگی (BP-BD) یا آشنازگی شدید در تنظیم خلق (SMD)**معیارهای ورود**

- سن ۷-۱۷ سال و آغاز نشانه‌ها پیش از ۱۲ سالگی باشد.
- داشتن خلقت غیرطبیعی (بهویژه غمگینی یا عصبانیت) که دست کم نیمی از روز به درازا بکشد، در بیشتر روزها دیده شود و شدت آن به اندازه‌ای باشد که از دید اطرافیان کودک (مانند والدین، آموزگاران، همسالان) به چشم بیاید.
- داشتن بیشبرانگیختگی که دست کم با سه تا از نشانه‌های زیر شناسایی می‌شود:
 - بی خوابی
 - آریته‌بودن^۱
 - حواس‌پرتی^۲
 - افکار سبقت‌گیرنده^۳ یا پرش افکار^۴
 - فشار گفتار^۵
 - مزاحم دیگران شدن^۶
- در مقایسه با همسالان، واکنش‌های گفتاری و رفتاری کودک به محرك‌های هیجانی منفی، افزایش چشم‌گیر داشته باشد. برای نمونه کودک در برابر ناکامی، با قشرق^۷ (که با سن و / یا پیش درآمد آن هماهنگی ندارد)، خشم‌های گفتاری و / یا پرخاشگری به افراد یا آسیب‌زدن به دارایی‌ها، پاسخ می‌دهد. در میانگین، این پدیده دست کم سه بار در هفته رخ دهد و برای چهار هفته پا بر جا باشد.
- نشانه‌هایی را که در بندهای ۲، ۳ و ۴ گفته شد، هم‌اکنون و دست کم در ۱۲ ماه گذشته نیز داشته باشد و فرد هیچ‌گاه بیش از دو ماه بدون نشانه نبوده باشد.
- نشانه‌ها دست کم در یک جایگاه، شدید باشد (مانند جوشش خشم^۸ و کتک کاری^۹ در خانه، مدرسه یا با همسالان). هم‌چنین در یک جایگاه دیگر نیز دست کم نشانه‌های ملایم (حسوس‌پرتی، مزاحمت) را داشته باشد.

۱۳۴

134

معیارهای خروج

- فرد یکی از نشانه‌های پایه‌ای دوقطبی زیر را نشان دهد:
 - خلق بالا یا واگیردار
 - بزرگ‌منشی یا خودباوری بیش از اندازه^{۱۰}
 - کاهش دوره‌ای نیاز به خواب
- نشانه‌ها در دوره‌های شناخته شده‌ای که بلندی آن بیش از چهار روز است، رخ می‌دهد.
- فرد معیارهای اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال نافذ رشد، یا اختلال استرس پس از سانحه^{۱۱} (PTSD) را پر کند.
- فرد در سه ماه گذشته معیارهای سوء‌صرف مواد را داشته باشد.
- ضریب هوش > ۷۰
- نشانه‌ها برآمده از اثر مستقیم فزیولوژیک سوء‌صرف مواد یا یک وضعیت عمومی پزشکی یا عصبی باشد.

(لین‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳)

از سوی دیگر در DSM-IV، نشانه‌های ADHD با نشانه‌های بند «ب» از معیارهای مانیا همپوشی دارد (کارلسون، ۱۹۹۸). همین نشانه‌ها برای شناسایی بیش‌برانگیختگی در معیارهای تشخیصی SMD نیز به کار رفته است. هر چند معیارهای SMD برای تشخیص تحریک‌پذیری، ریزبینانه و کاربردی شده است (لین لوفت، چارنی، تویین و همکاران، ۲۰۰۳)، ولی هم‌چنان با این سردرگمی‌های فراوان تشخیصی روبرو هستیم (ریچ و همکاران، ۲۰۰۷).

هر چند تحریک‌پذیری نشانه‌ای بسیار حساس برای شناسایی مانیای کودکان است، ولی ویژگی آن پایین است (گلر و همکاران، ۲۰۰۴) و ممکن است تنها بخشی از کودکان دارای تحریک‌پذیری، BD داشته باشد (کرانی و گلر، ۲۰۰۳). برخی پژوهشگران بر این باورند که اگر تحریک‌پذیری بخواهد یکی از نشانه‌های مانیا به شمار رود، باید شدت بالایی داشته باشد. آنها پرسش‌نامه‌های ساختاریافته تشخیصی را یکی از گواههای دیدگاه خود می‌دانند، زیرا در این پرسش‌نامه‌ها نیز آستانه شناسایی تحریک‌پذیری در اختلال‌های گوناگون، یکسان نیست و بالاترین آستانه تحریک‌پذیری، از آن BD است که باید بیشتر با پرخاشگری، تهاجم، تهدید و جوشش‌های درازمدت خشم که با پیش‌درآمد خود ناهمانه‌گ است، نمایان شود (میک، اسپنسر^۷، وزنیاک و بیدرمن، ۲۰۰۵؛ وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). اگر این دیدگاه پذیرفتی باشد، شاید پیروی از آن بتواند به گشايش برخی گره‌های تشخیصی کمک نماید.

آیا اختلال دوقطبی کودکان با اختلال دوقطبی بزرگسالان پیوستگی تشخیصی دارد؟

یافته‌های پژوهش‌های طولی آینده‌نگر نشان داده است که اگر BD کودکان بر پایه چارچوب‌های DSM-IV شناسایی شده باشد، با BD دوران نوجوانی و بزرگسالی پیوستگی تشخیصی دارد (گلر و همکاران، ۲۰۰۴؛ بروتمن و همکاران، ۲۰۰۶) و آنها از دیدگاه چارچوب‌های رایینز و گوزه (مانند همانندی نشانه‌ها، روند طولی و بازده تشخیصی، یافته‌های

از سوی دیگر، گروهی پیروی از BP-BD را بسیار بهتر می‌دانند. آنها بر این باورند که نمای بالینی اختلال‌های روانپزشکی می‌تواند پیرو سن و فرآیند تکاملی فرد باشد و این پدیده در DSM-IV به درستی دیده نشده است (اکیسکال و همکاران، ۲۰۰۰؛ اکیسکال، ۲۰۰۳). آنها می‌گویند داشتن هر آسیب‌شناسی روانی می‌تواند روند تکاملی فرد را به دشواری بیندازد (گلر و همکاران، ۲۰۰۰؛ کارلسون، برومیت^۸، دری زنس^۹، مجتبایی و شوارتز^{۱۰}، ۲۰۰۲؛ بیدرمن و همکاران، ۲۰۰۴؛ پاولوری^{۱۱}، بیرماهر و نایلور^{۱۲}، ۲۰۰۵؛ کواتچ، فریستاد و همکاران، ۲۰۰۵) و پیروی کورکورانه از DSM مایه شناسایی دیررس و دیرکرد در آغاز درمان‌های مناسب می‌گردد (قائمه، لنوكس^{۱۳} و بالدسارینی، ۲۰۰۱؛ پست^{۱۴} و همکاران، ۲۰۰۳؛ فایدا^{۱۵}، بالدسارینی، گلوبینسکی^{۱۶} و آستین^{۱۷}، ۲۰۰۴؛ دانیالیان و همکاران، ۲۰۰۷). این گروه آغاز درمان را سودمند و در رده نخست و خرده‌بینی در نام‌گذاری‌های تشخیصی را در رده‌های زیرین می‌گذارند (قائمه، ۲۰۰۷).

یافته‌ها نشان می‌دهند که BD در کودکان می‌تواند دارای زیرگروه‌های چندگانه باشد (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). این زیرگروه‌ها که می‌توانند تا اندازه‌ای روی هم افتاده باشند (آلدا^{۱۸}، مک‌کوین^{۱۹}، هاجک^{۲۰} و آلدا، ۲۰۰۵) هنوز به درستی شناخته شده نیستند (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). گمان می‌رود ناشناخته بودن این زیرگروه‌ها و به شمار نیاوردن آنها در پژوهش‌ها، مایه ناهمگونی در یافته‌های پژوهشی و به دنبال آن ناهمگونی در دیدگاه‌های پژوهشگران شده باشد (دافی، ۲۰۰۷).

آیا می‌توان در کودکان، تحریک‌پذیری پایدار را از نشانه‌های مانیا شمرد؟

از پدیده‌های برجسته و چالش‌برانگیز، جایگاه و ارزش تحریک‌پذیری در تشخیص BD کودکان است (لین لوفت، بلیر^{۲۱}، چارنی و پینه، ۲۰۰۳). این که تحریک‌پذیری همیشگی بتواند برای تشخیص BD کافی باشد به آسانی پذیرفتی نیست. هر چند تحریک‌پذیری در چارچوب تشخیصی مانیا، یک نشانه برجسته به شمار می‌آید ولی می‌تواند در دیگر اختلال‌های دوران کودکی مانند ADHD، ODD، اختلال‌های اضطرابی، اختلال‌های افسردگی و اختلال نافذ رشد^{۲۲} (PDD) نیز دیده شود (گلر و کوک^{۲۳}، ۲۰۰۰؛ گلر و همکاران، ۲۰۰۲؛ کارلسون، ۲۰۰۷).

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1- Bromet | 2- Driessens |
| 3- Schwartz | 4- Pavuluri |
| 5- Naylor | 6- Lenox |
| 7- Post | 8- Faedda |
| 9- Glovinsky | 10- Austin |
| 11- Alda | 12- MacQueen |
| 13- Hajek | 14- Blair |
| 15- pervasive developmental disorder | 17- Spencer |
| 16- Cook | |

DSM-IV از BD می‌کند نزدیک است. هنگامی که امیل کرپلین^{۱۹} مفهوم بیماری مانیک-دپرسیو^{۲۰} را پیشنهاد نمود، تعریفی نزدیک به تعریف BP-BD ارایه کرد (کرپلین^{۲۱}، ۱۹۲۱؛ انگست و مارنووس^{۲۲}، ۲۰۰۱؛ قائمی، ۲۰۰۷). بررسی نوشه‌هایی که درباره BD بزرگسالان است نشان می‌دهد که نمای بالینی تحریک‌پذیر و مانیای نوع درهم در بزرگسالان نیز فراوان است، تا جایی که در برخی نمونه‌ها فراوان‌تر از مانیای خالص یا افسردگی خالص بوده است (کوکوپولوس^{۲۳}، آلبرت^{۲۴}، سانی^{۲۵}، کوکوپولوس و گیراردی^{۲۶}؛ ۲۰۰۵؛ بناتزی، ۲۰۰۶). بیشتر کودکان یا بزرگسالانی که دوره‌های غیراختصاصی از خلق بالا، واگیردار، یا تحریک‌پذیر داشته‌اند، هرچند معیارهای DSM-IV را پر نکرده باشند، ولی به نام نمونه‌های زیرآستانه‌ای غیرتیپیک BD شناخته شده‌اند.

بنابراین پرسش پایه‌ای پژوهشی، از این که نمای بالینی اختلال دوقطبی در دوره‌های گوناگون تکاملی چگونه است فراتر رفته و به پرسش‌های بزرگ‌تری می‌رسد: مرزهای معتبر برای BD را باید در کجا نهاد؟ و آیا BP-BD از دیدگاه بیماری‌شناسی روایی دارد؟ (کافمن^{۲۷} و همکاران، ۱۹۹۷؛ فادا و همکاران، ۲۰۰۴).

آیا «اختلال دوقطبی با نمای بالینی گسترده» از دیدگاه بیماری‌شناسی از روایی بروخوردار است و «آشتبگی شدید در تنظیم خلق» زیرگروهی از اختلال دوقطبی کودکان است؟ به باور راینز و گوزه (۱۹۷۰)، برای اعتباریابی هر تشخیص روانپژوهی، باید زمینه‌های زیر را درباره آن بررسی نمود:

- ۱- ارزیابی با چارچوب‌های پایدار و شناخته شده، برای تشخیص گذاری دقیق؛ ۲- پیگیری روند طولی نشانه‌ها و بازده تشخیص؛ ۳- بررسی ابانتگی خانوادگی در بستگان

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1- Goldstein | 2- Nuechterlein |
| 3- Synder | 4- Mintz |
| 5- Lish | 6- Dime-Meenan |
| 7- Whybrow | 8- Price |
| 9- Davenport | 10- Loranger |
| 11- Levine | 12- Joyce |
| 13- Perugi | 14- Toni |
| 15- Travierso | 16- Benazzi |
| 17- premorbid or harbinger | 18- subthreshold |
| 19- Emil Kraepelin | 20- manic-depressive |
| 21- Kraepelin | 22- Marneros |
| 23- Koukopoulos | 24- Albert |
| 25- Sani | 26- Girardi |
| 27- Kaufman | |

سایکونوروفیزیولوژیک، ابانتگی خانوادگی و پاسخ درمانی) ویژگی‌های یکسان نشان می‌دهند (میکلوویتز، گلدشتاین^۱، نویشترا لاین^۲، سیندر^۳ و میتر^۴؛ ۱۹۸۸؛ گلر و همکاران، ۲۰۰۲؛ جود و همکاران، ۲۰۰۲؛ گلر و همکاران، ۲۰۰۴).

در پژوهش‌های گذشته‌نگر، بسیاری از بزرگسالان مبتلا به BD می‌گویند که نشانه‌های خلقی آنها از کودکی آغاز شده و بیشتر با نمای افسردگی، تحریک‌پذیری، پرخاشگری و پرتحرکی بوده (بروتمن و همکاران، ۲۰۰۶؛ شیرازی، زارعی و شهریور، ۲۰۰۸) و دوره‌های شناخته شده مانیا در سن‌های بالاتر نمایان شده است. گروهی از کودکانی که BP-BD دارند نیز با افزایش سن به IP-BD NP-BD یا IP نزدیک می‌شوند (لیش^۵، دیمه‌مینان^۶، واپرو^۷، پرایس^۸ و هیرش‌فلد، ۱۹۹۴؛ پرلیس و همکاران، ۲۰۰۷؛ دافی، ۲۰۰۷؛ شیرازی و همکاران، ۲۰۰۸). نزدیک به ۲۰٪ بزرگسالان دارای BD، در نگاه گذشته‌نگر شواهدی را از آغاز نشانه‌ها پیش از ۱۹ سالگی گزارش می‌کنند (کارلسون، داون‌پورت^۹ و جامیسون، ۱۹۷۷؛ لورانگر^{۱۰} و لوین^{۱۱}؛ ۱۹۷۸؛ جویس^{۱۲}، ۱۹۸۴). برخی یافته‌ها نشان می‌دهند هنگامی که BD کودکان نمای بالینی کلاسیک نداشته باشد، در بزرگسالی نیز نمای کلاسیک ندارد و بیشتر با نمای پایداری از افسردگی‌های واکنشی و دگرگون شونده و بدون دوره‌های آشکار، نمایان می‌شود (پروگی^{۱۳}، تونی^{۱۴}، تراویرسو^{۱۵} و اکیسکال، ۲۰۰۳؛ بناتزی^{۱۶} و اکیسکال، ۲۰۰۵؛ استاتون و همکاران، ۲۰۰۸).

آیا می‌توان برخی نمونه‌های ADHD یا DBD یا همراهی آن دو را پیش‌درآمد^{۱۷} کودکانه همان چیزی دانست که در بزرگسالی به نام BD شناخته می‌شود (شهریور، علاقبندراد و شیرازی، ۱۳۸۵؛ قائمی، ۲۰۰۷) و یا می‌توان گفت برخی نمونه‌های BD در کودکان، در بزرگسالی بانمای زیرآستانه‌ای^{۱۸} یا غیرتیپیک آشکار می‌شود (جود و اکیسکال، ۲۰۰۳)؟ پاسخ این پرسش‌ها به پژوهش‌های گسترده‌تری نیاز دارد.

آیا همین تنگنها برای شناسایی اختلال دوقطبی در بزرگسالان نیز دیده می‌شود؟

این که داشتن نشانه‌های اختلال دوقطبی برای شناسایی اختلال دوقطبی کافی است، پرسشی نیست که ویژه BD در کودکان باشد و این تنگنای تشخیصی در بزرگسالان نیز دیده می‌شود (قائمی، ۲۰۰۷). تعریف NP-BD به تعریفی که

دارای BD باشد (شولزه^۳، هدکر^۴، زندی^۵، ریتچل^۶ و مکماهون، ۲۰۰۶).

از جایگاه‌های گنج کننده و چالش برانگیز این است که بیشتر کودکانی که در چارچوب SMD می‌گنجند، چارچوب‌های DSM-IV ODD، ADHD و CD اختلال افسردگی اساسی^۷ (MDD) را نیز پر می‌کنند (لیبن‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ ریچ و همکاران، ۲۰۰۷). در واقع همبودی ODD و ADHD نشانه‌هایی را نزدیک به SMD درست می‌کند (بروتمن و همکاران، ۲۰۰۷). هم‌چنین پرخاشگری‌های شدید واکنشی و تکانشی و آشتگی‌های شدید و همیشگی خلق و هیجان، هم در SMD و هم در همراهی ADHD با ODD دیده می‌شود (ناجین^۸ و ترمبلای^۹، ۲۰۰۱). این پدیده‌ها شناسایی این بیماری‌ها را از هم دشوار می‌نماید و این پرسشنخستین را که آیا SMD یک اختلال جداگانه است، هم‌چنان پیش‌رو می‌گذارد.

بررسی روند بیماری و پیش‌آگهی از دیگر زمینه‌هایی است که برای همسنجی SMD و NP-BD به کار رفته است. پژوهش‌ها نشان داده است که همراهی با ADHD یا ODD پیش‌آگهی BD را با هر نمای بالینی بدتر می‌نماید (شهریور و همکاران، ۱۳۸۵؛ کارلسون، ۲۰۰۷). پی‌گیری کودکانی که ADHD همراه با ODD داشتند، در سال‌های بعد فراوانی بالاتری از CD، رفتارهای ضداجتماعی و سوءصرف مواد را نشان داده (نیوکورن^{۱۰}، هالپرین^{۱۱} و میلر^{۱۲}، ۲۰۰۰)، ولی فراوانی بالاتری از NP-BD مشاهده نشده است (کارلسون، ۲۰۰۷).

کودکان دارای SMD در بزرگسالی، بیشتر از کودکانی که این اختلال را نداشتند، دچار افسردگی شده بودند (بروتمن و همکاران، ۲۰۰۶). این که چه درصدی از این کودکان، در بزرگسالی دچار اختلال دوقطبی گونه I یا II می‌شوند هنوز آشکار نیست (چانگ، ۲۰۰۷).

شماری از پژوهش‌ها برای بررسی همبستگی SMD و NP-BD، فراوانی اختلال‌های همراه را در خانواده آنها با هم سنجیده‌اند. در بیشتر نمونه‌ها هنگامی که BD در کودکی آغاز

درجه یک و بررسی‌های ژنتیک^{۱۳}، ۴- بررسی‌های آزمایشگاهی روی ساختار مغزی و کارکردهای نوروفیزیولوژیک^{۱۴}؛ ۵- بررسی پاسخ درمانی.

اگر یافته‌های زمینه‌های یادشده درباره یک تشخیص، پایدار و ویژه آن باشد و بتواند آن را از دیگر تشخیص‌ها جدا سازد، می‌توان آن تشخیص را معترض شناخت. هنگامی که دو یا چند تشخیص در زمینه‌های یادشده همانند باشند، در واقع یک تشخیص هستند که نام‌های گوناگون گرفته‌اند.

از این رو به دنبال دسته‌بندی سه گانه BD در کودکان، اعتباریابی SMD و مقایسه آن با NP-BD یکی از زمینه‌های بر جسته پژوهشی در گستره BD کودکان شده است. هر چند SMD به نام BP-BD-شناخته می‌شود، ولی پیوستگی بیماری‌شناسی آن با BD پرسشی است که هنوز پاسخی بر پایه پژوهش به آن داده نشده است (بروتمن و همکاران، ۲۰۰۷).

باشد یادآوری کرد که همسان‌سازی آزمودنی‌ها در گروه‌های پژوهشی نیاز به چارچوب‌های روش و آشکار دارد و هم‌آکنون SMD و NP-BD هر دو دارای چارچوب‌های ریزبینانه تشخیصی هستند تا بتوان آنها را در راستاهای گوناگون مقایسه کرد (لیبن‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ کرانی و گلر، ۲۰۰۳).

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در کودکان دارای SMD سن آغاز بیماری، شمار بستری‌های روانپردازی و اقدام به خودکشی، از NP-BD پایین‌تر بوده است (دیکاشتاین^{۱۵} و همکاران، ۲۰۰۵).

برخی پژوهشگران برای بررسی نزدیک بودن SMD و NP-BD، فراوانی اختلال‌های همراه را در آنها با هم سنجیده‌اند: بروتمن و همکاران (۲۰۰۶) فراوانی اختلال‌های همراه در محور I و روند طولی SMD را در کودکان بررسی کردند. یافته‌های آنان فراوانی SMD در زندگی کودکان ۹-۱۹ ساله را ۳/۳٪ نشان داد. بیشتر این کودکان (۷/۶٪) دست کم یک بیماری دیگر در محور I داشتند که فراوان‌ترین آنها ADHD، اختلال سلوک^{۱۶} (CD) و ODD بود. در SMD، فراوانی ADHD ۷/۸۶٪ و ۳/۸۳٪ ODD در ODD (۶/۶٪) و ADHD (۴/۳٪) است که بالاتر از فراوانی ADHD با ADHDD می‌باشد (همان‌جا). فراوانی همراهی ADHD با ODD در ۸/۸٪ و بالاتر از فراوانی همراهی این دو در ۸/۲۶٪ NP-BD است (کارلسون، ۲۰۰۷).

شاید چگونگی همبودی BD با دیگر بیماری‌ها بتواند نشانه‌ای از بودن زیرگروه‌های ژنتیک در خانواده کودکان

1- Dickstein
3- Schulze
5- Zandi
7- major depressive disorder
9- Tremblay
11- Halperin

2- conduct disorder
4- Hedeker
6- Rietschel
8- Nagin
10- Newcorn
12- Miller

دیکاشتاین و همکاران (۲۰۰۷) توانایی نرم‌پذیری‌شناختی^{۱۶} و هماهنگی با هم‌رویدادهای دگرگون‌شونده^{۱۷} (مانند جلوگیری از واکنش پیشین و جایگزینی واکتش تازه) را در NP-BD و SMD با هم مقایسه کردند. در این پژوهش کودکان دارای NP-BD در وارونه‌سازی ساده و درهم^{۱۸}، و کودکان دارای SMD تنها در وارونه‌سازی درهم ناتوانی داشتند. هماهنگ شدن با هم‌رویدادهای دگرگون‌شونده در NP-BD کندر از SMD بود. آنها دریافتند که این یافته می‌تواند نشانه‌ای از یکسان‌بودن سازوکارهای مغزی و رفتاری در این دو گروه باشد.

ریچ و همکاران (۲۰۰۷) نخستین گروهی بودند که با اندازه‌گیری کارکردهای مغزی، سایکوفیزیولوژی^{۱۹} تحрیک‌پذیری و تاب‌آوری در برابر ناکامی^{۲۰} را در کودکان دارای NP-BD و SMD با هم مقایسه کردند. یافته‌ها نشان دادند که کودکان دارای SMD چه با ناکامی روبرو باشند یا نباشند، در آغاز پردازش داده‌ها نارسایی‌هایی دارند. در آنها دامنه موج N₁ در هر زمینه، با یا بدون هیجان، پایین‌تر از کودکان دارای NP-BD بود. این یافته نشانه نارسایی آغاز توجه و پایین‌بودن درستی توجه در آنها دانسته شد و در کودکان دارای ADHD نیز دیده شد. در کودکان دارای SMD، دامنه موج P₃ در هر زمینه هیجانی طبیعی بود که نشان می‌دهد آنها هر چند در آغاز و درستی توجه نارسایی‌هایی دارند، ولی در ساماندهی پس از آن توانا هستند.

در کودکان دارای NP-BD، در رویارویی با ناکامی، دامنه موج N₁ طبیعی و دامنه موج P₃ پایین‌تر از کودکان دارای SMD بود که نشانه اختلال در توجه کارکرده آنها در هنگام ناکامی است. کودکان دارای NP-BD در هنگام ناکامی، در آغاز و درستی توجه کاستی نداشتند، ولی در ساماندهی پس از آن ناتوان بودند. بنابراین هر چند تحریک‌پذیری یک نمای بالینی بر جسته از SMD و NP-BD است، ولی پاتوفیزیولوژی آن می‌تواند در این دو بیماری یکسان نباشد.

می‌شود، با پیشینه نیرومند خانوادگی همراه است (پاولز^۱، مورتون^۲ و اگه‌لند^۳؛ ۱۹۹۲؛ لیبن‌لوفت، چارنی، توین و همکاران، ۲۰۰۳؛ گلان^۴، بیردن^۵، نیندام^۶ و اسکامیلا^۷، ۲۰۰۴). فراوانی داشتن BD در بستگان افراد دارای BD بالاتر است (اشتروبر و همکاران، ۱۹۸۸؛ فاراون، بیدرمن، منین، وزنیاک و اسپنسر، ۱۹۹۷؛ وزنیاک، بیدرمن، مونوئوشوس^۸، ریچاردز^۹ و فاراون، ۲۰۰۲؛ بیرماهر و همکاران، ۲۰۰۶). هرچند پیشینه خانوادگی با داشتن بیماری‌های همراه چارچیدگی می‌شود، ولی می‌تواند کم و بیش کمک‌کننده باشد (قائمه، ۲۰۰۷).

اگر SMD یک نمای بالینی از BD باشد، گمان می‌رود فراوانی اختلال دوقطبی در والدین کودکان دارای SMD و NP-BD برابر باشد. در پژوهش‌های اشتروبر و همکاران (۱۹۸۸) و بیرماهر و همکاران (۲۰۰۶)، فراوانی BD در والدین کودکانی که در چارچوب DSM دارای BD بودند، ۲۹/۵٪ گزارش شد. بروتمن و همکاران (۲۰۰۷) تشخیص‌های محور I در والدین کودکان دارای SMD و NP-BD با هم سنجیدند. یافته‌ها فراوانی BD را در والدین کودکان دارای NP-BD ۳۳/۳٪ و در والدین کودکان دارای SMD ۲/۷٪ نشان داد. فراوانی تشخیص‌های دیگر محور I میان دو گروه یکسان بود. به گمان آنها NP-BD در انباستگی خانوادگی با SMD یکسان نبود. این پژوهش ژنتیکی نشان داد که هر چند فراوانی اختلال دوقطبی در والدین کودکان دارای NP-BD به گونه‌ای چشم‌گیر بالا است، ولی در SMD خطر ژنتیک بالایی برای BD نداریم (کسلر^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۵؛ بروتمن و همکاران، ۲۰۰۶؛ کارلسون، ۲۰۰۷).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که فراوانی اختلال‌های روانی در خانواده کودکان دارای ADHD و ODD بالا است (بیدرمن، فاراون، کینان^{۱۱}، کنی^{۱۲} و تسوانگ^{۱۳}، ۱۹۹۰). بنابراین اگر کودکانی که تشخیص SMD گرفته‌اند به درستی همان کودکانی باشند که همبودی ADHD و ODD دارند، پیش‌بینی می‌شود ADHD، ODD و CD رفتارهای ضداجتماعی در خانواده آنها بیشتر باشد. در این باره هنوز گزارشی دیده نشده است (کارلسون، ۲۰۰۷).

سنجهش سازوکارهای^{۱۴} مغزی از دیگر زمینه‌های بر جسته‌ای است که پژوهشگران برای بررسی هم‌گروه بودن SMD و NP-BD از آن بهره گرفته‌اند:

ریچ و همکاران (۲۰۰۵) واکنش به محرك‌های هیجانی (مانند پاداش و تاوان^{۱۵}) را در کودکان دارای NP-BD و SMD با هم مقایسه کردند و ناهمگونی میان دو گروه ندیدند.

- 1- Pauls
- 3- Egeland
- 5- Bearden
- 7- Escamilla
- 9- Richards
- 11- Keenan
- 13- Tsuang
- 15- reward and punishment
- 17- changing contingencies
- 19- psychophysiology

- 2- Morton
- 4- Glahn
- 6- Niendam
- 8- Monuteaux
- 10- Kessler
- 12- Knee
- 14- mechanisms
- 16- cognitive flexibility
- 18- simple and complex reversal
- 20- frustration tolerance

بحث

دیدگاه‌های ناسازگار و گوناگونی، تشخیص اختلال دوقطبی را در کودکان فراگرفته است (بروتنم و همکاران، ۲۰۰۷). پژوهش‌های کنونی هنوز توانسته‌اند به پرسش‌های بی‌شمار پیش‌رو درباره فراوانی، چارچوب تشخیصی و پاتوفیزیولوژی BD در کودکان، پاسخ دهنده (ریچ و همکاران، ۲۰۰۷) برخی در پذیرش این که کودکانی که دچار BD شناخته شده هستند، به درستی دارای BD باشند، هنوز با دودلی رویه‌رو هستند (کارلسون، ۲۰۰۵). نزدیک بودن نشانه‌های BD با برخی اختلال‌های دیگر که در دوران کودکی فراوان است و همبودی این اختلال‌ها، دامنه دشواری‌های تشخیصی را فراتر برده است (کارلسون و همکاران، ۱۹۹۸؛ کارلسون، ۱۹۹۸؛ ۲۰۰۷؛ کلاین و همکاران، ۱۹۹۸؛ گلر و همکاران، ۱۹۹۸؛ لین‌لوفت، چارنی، توبین و همکاران، ۲۰۰۳). چهره آشکار و پنهان نشانه‌های BD در کودکی و روند دگرگونی این نشانه‌ها تا بزرگسالی هنوز به خوبی شناخته شده نیست (لین‌لوفت، چارنی، توبین و همکاران، ۲۰۰۳؛ جود و اکیسکال، ۲۰۰۳؛ پرلیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ بروتنم و همکاران، ۲۰۰۶؛ قائمی، ۲۰۰۷؛ شیرازی و همکاران، ۲۰۰۸).

دانش ما درباره چگونگی مربزندی BD، نه تنها در کودکان بلکه در بزرگسالان نیز هم چنان اندک است (کافمن و همکاران، ۱۹۹۷؛ فادا و همکاران، ۲۰۰۴). یافته‌های کنونی توانسته است پژوهشگران را در راستای از میان برداشتن این تنگناها، به سازمان‌بندی BD کودکان به نیازهای بالینی چندگانه رهنمون کند (لین‌لوفت، چارنی، توبین و همکاران، ۲۰۰۳) ولی از آنجا که این نیازهای بالینی نیاز به اعتباریابی گسترده‌تری دارند، هنوز به گونه فراگیر از سوی همه کارشناسان پذیرفته نشده‌اند (قائمی، ۲۰۰۷). این چندگانگی دیدگاه‌ها برای پذیرش BP-BD یا همان SMD، چشم‌گیرتر از دیگر نیازهای بالینی است (بروتنم و همکاران، ۲۰۰۷) و در برونداد پژوهش‌هایی که تا کنون داشته‌ایم می‌توان یافته‌هایی هم‌سو با هر کدام از این دیدگاه‌ها یافت.

ناهماهنگی در یافته‌های پژوهشی برآمده از چیست؟

ناهمگون بودن روش‌های پژوهشی می‌تواند ناهماهنگی در یافته‌ها را در پی داشته باشد. از این میان می‌توان از

رائو^۱ و همکاران (۲۰۰۸) توانایی تصمیم‌گیری و پردازش پاداش و توان را در کودکان دارای NP-BD و SMD با هم مقایسه کردند و ناهمگونی بین دو گروه ندیدند. گویر^۲ و همکاران (۲۰۰۷)، ناتوانی در شناسایی هیجان‌های چهره^۳ را در چند گونه از اختلال‌های روانی کودکان بررسی کردند و نشان دادند که کودکان دارای NP-BD و کودکان دارای SMD در این زمینه همسان هستند، ولی ناتوانی آنها از کودکان دارای اختلال‌های اضطرابی، MDD، ADHD و CD بیشتر است. ریچ و همکاران (۲۰۰۸) نیز توانایی شناسایی هیجان‌های چهره را در کودکان دارای NP-BD و SMD با هم مقایسه کردند. یافته‌های آنان نشان داد که ناتوانی در شناسایی هیجان‌های چهره در NP-BD با کاستی در مهارت‌های اجتماعی^۴، و در SMD با درهم‌ریختگی روابط خانوادگی همبستگی دارد. این یافته ممکن است نشانه‌ای از یکسان‌بودن پاتوفیزیولوژی این دو اختلال باشد.

از دیگر زمینه‌هایی که برای شناسایی و بررسی هم‌گروهی NP-BD و SMD به کار رفته است، بررسی پاسخ درمانی در آنها است. یافته‌های نخستین نشان می‌دهند که کودکان دارای NP-BD به داروهای پایدارکننده خلق^۵ پاسخ می‌دهند (ور^۶ و گودوین، ۱۹۸۷؛ دلبلو^۷ و همکاران، ۲۰۰۱). یافته‌هایی هر چند خام نشان داده‌اند که کودکان دارای SMD، به داروهای محرك پاسخ می‌دهند (نیوکورن، ۲۰۰۱؛ بلادر^۸، ۲۰۰۶). در کودکان NP-BD می‌تواند مانند BD کلاسیک بزرگسالان با محرك‌ها یا داروهای ضدافسردگی بدتر شود (ور و گودوین، ۱۹۸۷؛ دلبلو و همکاران، ۲۰۰۱). به هر رو، گمان می‌رود شیوه درمانی برای این دو نمای بالینی یکسان نباشد (لین‌لوفت، چارنی، توبین و همکاران، ۲۰۰۳).

گاهی می‌توان پاسخ درمانی را برای پذیرش یا کنارگذاشتن یک تشخیص به کار گرفت. بی‌گمان این روش غیراختصاصی ترین روش برای رواسازی یک تشخیص است (قائمی، ۲۰۰۷)، زیرا بیشتر داروها در جایگاه‌های گوناگونی سودمند هستند (مانند ضدافسردگی‌ها) و هم‌چنین می‌توانند وضعیت روانی طبیعی را بهتر نمایند (مانند محرك‌ها). هرچند کم‌بودن پاسخ درمانی یا دیدن واکنش‌های ناخواسته، می‌تواند برای تشخیص گذاری کمک‌کننده باشد (مانند نیازی برآمده از داروهای ضدافسردگی)، ولی در بیشتر نمونه‌ها تعیین کننده نیست (مارتین^۹ و همکاران، ۲۰۰۴). از این رو به کارگیری پاسخ درمانی برای تشخیص گذاری گذشته‌نگر، اگر نادرست نباشد، بی‌گمان کافی هم نیست (قائمی، ۲۰۰۷).

- | | |
|---|---------------------|
| 1- Rau | 2- Guyer |
| 3- facial emotional expression labeling | |
| 4- social skills | 5- mood stabilizers |
| 6- Wehr | 7- Delbello |
| 8- Blader | 9- Martin |

نشان‌دادن پایایی یافته‌ها نیازمند بررسی‌های چندباره است (دانیالیان و همکاران، ۲۰۰۷). بررسی روایی و پایایی نماهای بالینی یادشده، هم‌چنان نیاز به پژوهش‌های گسترد و درازمدت دارد. این پژوهش‌ها باید با چارچوب‌های تشخیصی یکسان، روی جمعیت عمومی و با حجم نمونه کافی انجام شوند. اباستنگی خانوادگی، روند طولی، پاسخ درمانی و نشانگرهای زیست‌شناختی از زمینه‌های برجسته‌ای است که باید این پژوهش‌ها به آن پردازند (کوتسمن^۵ و گلد^۶؛ ۲۰۰۳؛ کواتچ و همکاران، ۲۰۰۵؛ دانیالیان و همکاران، ۲۰۰۷).

سخن پایایی

به طور کلی دسته‌بندی این اختلال‌ها باید بتواند ما را برای شناخت سبب‌شناسی، روند، پیش‌آگهی، سایکونوروفیزیولوژی، ویژگی‌های ژنتیک، انتقال خانوادگی و روش درمانی راهنمایی کند (قائمی، ۲۰۰۷). برداشت پایایی و برجسته‌ای که می‌توان از برآیند یافته‌های کنونی داشت این است که برای تشخیص و مرزبندی معتبر هر اختلال روانپزشکی، از جمله اختلال دوقطبی کودکان، باید داده‌ها را از چند دیدگاه جداگانه که در برگیرنده نشانه‌شناسی، روند بیماری، اباستنگی خانوادگی، نشانگرهای زیست‌شناختی و پاسخ درمانی باشد فراهم آوریم (رایتر و گوزه، ۱۹۷۰). نیاز به گردآوری یافته‌ها از چند گستره یادشده برگرفته از این نگرش است که هیچ نشانه‌ای به تنهایی ویژگی سرشنی یک اختلال روانپزشکی نیست و همیشه منظمه‌ای از یافته‌ها است که می‌تواند مایه تشخیص گذاری درست برای یک وضعیت روانی گردد. تنها راه از میان برداشتن دشواری‌های تشخیصی یادشده این است که افرون بر چارچوب‌های DSM، یافته‌های برآمده از دیگر زمینه‌های یادشده را نیز به کار بندیم (قائمی، ۲۰۰۳). شاید اگر این نکته همواره و به درستی به کار گرفته شود، بسیاری از چالش‌های بی‌بهره کنونی رخ ندهد.

منابع

شهریور، زهراء؛ علاقه‌نرادر، جواد؛ شیرازی، الهام (۱۳۸۵). آیا اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه در ویژگی‌های بالینی مانیای کودکان و نوجوانان مؤثر است؟ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال دوازدهم، شماره ۳، ۱۹۷-۲۰۳.

1- Rubinow
3- Abelson
5- Gottesman

2- Holmes
4- Zhao
6- Gould

یکسان‌بودن چارچوب‌های ورود و خروج آزمودنی‌ها، گذشته‌نگر یا آینده‌نگری‌بودن پژوهش، یکسان‌بودن میانگین سنی آزمودنی‌ها، تشخیص گذاری بر پایه نشانه‌های کنونی یا نشانه‌های طول زندگی، گزینش آزمودنی‌ها از جمعیت عمومی یا بالینی، به شمار آوردن یا نیاوردن اختلال‌های همراه و زیر درمان‌بودن یا نبودن آزمودنی‌ها نام برد. نمونه‌های زیر نیز می‌توانند یکسان‌بودن یافته‌های پژوهشی را به دنبال داشته باشند:

۱- ابزار شناسایی اختلال: پژوهش‌های انجام‌شده، ابزارهای یکسانی برای شناسایی BD به کار نبرده‌اند. در برخی از آنها پرسش‌نامه‌های ساختاری‌افته با روایی و پایایی شناخته‌شده به کار نرفته و تعریف نشانه‌ها و آستانه شدت و مدت آنها یکسان نبوده است. برخی پرسش‌نامه‌ها بر پایه زیرگروه‌های سنی چندگانه دوران کودکی ساماندهی نشده‌اند، حال آن که هر نشانه در هر زیرگروه سنی نموده‌ای ویژه آن سن را دارد و کودکان هر چه کوچک‌تر باشند کمتر می‌توانند از هیجان‌های خود سردرآورند و درباره آن گفتگو کنند (کواتچ و همکاران، ۲۰۰۵؛ دافی، ۲۰۰۷؛ استاتون و همکاران، ۲۰۰۸).

۲- چگونگی پرسشگرها: بررسی‌ها نشان داده‌اند که هنگامی که پرسشگرها پژوهش، از افراد عادی آموخته‌دیده باشند، نمونه‌های پایدار و شدید مانیا را آسان شناسایی می‌کنند، ولی در شناسایی نمونه‌های با شدت کمتر، ناتوان هستند و اگر پرسشگرها از کارکنان بهداشتی درمانی، به ویژه کارکنان مراکز روانپزشکی که دارای کارکشتنگی‌های بالینی هستند برگزیده شوند، شناسایی نشانه‌های مانیا بهتر رخ می‌دهد (کسلر، روینو، هولمز^۱، آبلسون^۲ و زائو^۳، ۱۹۹۷).

۳- چگونگی پاسخ‌دهندگان: این که داده‌ها از چه کسانی گردآوری شده و این که آیا تنها از یک پاسخگو مانند کودک، پدر یا مادرش پرسش شده یا پاسخ‌های همه آنها ارزیابی گردیده است، می‌تواند برآورد پژوهش‌ها را دگرگون نماید (تیلمن و همکاران، ۲۰۰۴).

برای پژوهش‌های آینده چه پیشنهادهایی پیش رو است؟

در بیشتر پژوهش‌ها تنها حساسیت نشانه‌های BD سنجیده شده است. سنجش ویژگی این نشانه‌ها، نیاز به گنجانیدن گروه بزرگی از افراد غیرمتلاعه به BD در بررسی آزمودنی‌های پژوهش، دارد (وزنیاک و همکاران، ۲۰۰۵). هم‌چنین

- Akiskal, H. S. (2003). Validating "hard" and "soft" phenotypes within the bipolar spectrum: Continuity or discontinuity? *Journal of Affective Disorders*, 73, 1-5.
- Akiskal, H. S., Bourgeois, M. L., Angst, J., Post, R., Moller, H., & Hirschfeld, R. (2000). Re-evaluating the prevalence of, and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. *Journal of Affective Disorders*, 59 (suppl. 1), S5-S30.
- Alda, M. (2004). The phenotypic spectra of bipolar disorder. *European Neuropsychopharmacology*, 14 (suppl. 2), 94-99.
- Angst, J., & Marneros, A. (2001). Bipolarity from ancient to modern times: Conception, birth and rebirth. *Journal of Affective Disorders*, 67, 3-19.
- Axelson, D., Birmahar, B., Strober, M., Gill, M. K., Valeri, S., Chiappetta, L., Ryan, N., Leonard, H., Hunt, J., Lyengar, S., Bridge, J., & Keller, M. (2008). Phenomenology of children and adolescents with bipolar spectrum disorders. *Archives of General Psychiatry*, 63, 1139-1148.
- Baldessarini, R. J. (2000). A plea for integrity of the bipolar disorder concept. *Bipolar Disorders*, 2, 3-7.
- Baldessarini, R. J., Tondo, L., & Hennen, J. (2003). Treatment-latency and previous episodes: Relationships to pretreatment morbidity and response to maintenance treatment in bipolar I and II disorders. *Bipolar Disorders*, 5, 169-179.
- Benazzi, F. (2006). Challenging the unipolar-bipolar division: Does mixed depression bridge the gap? *Prognosis in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry*, 31, 97-103.
- Benazzi, F., & Akiskal, H. S. (2005). A downscaled practical measure of mood lability as a screening tool for bipolar II. *Journal of Affective Disorders*, 84, 225-232.
- Bhangoo, R. K., Dell, M. L., Towbin, K., Meyers, F. S., Lowe, C. H., Pine, D. S., & Leibenluft, E. (2003). Clinical correlates of episodicity in juvenile mania. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 13, 507-514.
- Biederman, J. (1998). Resolved: Mania is mistaken for ADHD in prepubertal children (affirmative). *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 37, 1091-1093.
- Biederman, J., Faraone, S. V., Keenan, K., Knee, D., & Tsuang, M. T. (1990). Family-genetic and psychosocial risk factors in DSM-III attention deficit disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 29, 526-533.
- Biederman, J., Faraone, S. V., Wozniak, J., Mick, E., Kwon, A., & Aleardi, M. (2004). Further evidence of unique development phenotypic correlates of pediatric bipolar disorder: Findings from a large sample of clinically referred preadolescent children assessed over the 7 years. *Journal of Affective Disorders*, 82 (suppl. 1), S45-S58.
- Birmaher, B., Axelson, D., Strober, M., Gill, M. K., Valeri, S., Chiappetta, L., Ryan, N., Leonard, H., Hunt, J., Lyengar, S., & Keller, M. (2006). Clinical course of children and adolescents with bipolar spectrum disorders. *Archives of General Psychiatry*, 63, 175-183.
- Blader, J. C. (2006). Pharmacotherapy and postdischarge outcomes of child inpatients admitted for aggressive behavior. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 26, 419-425.
- Blader, J. C., & Carlson, G. A. (2007). Increased rates of bipolar disorder diagnosis among US child, adolescent, and adult inpatients, 1996-2004. *Biological Psychiatry*, 62, 107-114.
- Bowring, M. A., & Kovacs, M. (1992). Difficulties in diagnosing manic disorders among children and adolescents. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 31, 611-614.
- Brotman, M. A., Kassem, L., Reising, M. M., Guyer, A. E., Dickstein, D. P., Rich, B. A., Towbin, K. E., Pine, D. S., McMahon, F. J., & Leibenluft, E. (2007). Parental diagnoses in youth with narrow phenotype bipolar disorder or severe mood dysregulation. *American Journal of Psychiatry*, 164, 1238-1241.
- Brotman, M. A., Schmajuk, M., Rich, B. A., Dickstein, D. P., Guyer, A. E., Costello, E. J., Egger, H. L., Angold, A., Pine, D. S., & Leibenluft, E. (2006). Prevalence, clinical correlates, and longitudinal course of severe mood dysregulation in children. *Biological Psychiatry*, 60, 991-997.
- Carlson, G. A. (1984). Classification issues of bipolar disorders in childhood. *Psychiatric Development*, 4, 273-285.
- Carlson, G. A. (1998). Mania and ADHD: Comorbidity or confusion. *Journal of Affective Disorders*, 51, 177-187.

- Carlson, G. A. (2005). Early onset bipolar disorder: Clinical and research considerations. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 34, 333-343.
- Carlson, G. A. (2007). Who are the children with severe mood dysregulation? *American Journal of Psychiatry*, 164, 1140-1142.
- Carlson, G. A., & Kelly, K. L. (1998). Manic symptoms in psychiatrically hospitalized children: What do they mean? *Journal of Affective Disorders*, 51, 123-135.
- Carlson, G. A., Bromet, E. J., Driessens, C., Mojtabai, R., & Schwartz, J. E. (2002). Age at onset, childhood psychopathology, and 2-year outcome in psychotic bipolar disorder. *American Journal of Psychiatry*, 159, 307-309.
- Carlson, G. A., Davenport, Y. B., & Jamison, K. (1977). A comparison of outcome in adolescent and late-onset bipolar manic-depressive illness. *American Journal of Psychiatry*, 134, 919-922.
- Carlson, G. A., Loney, J., Salisbury, H., & Volpe, R. J. (1998). Young referred boys with DICA-P manic symptoms vs two comparison groups. *Journal of Affective Disorders*, 51, 113-121.
- Cassidy, F., & Carroll, B. J. (2001). Frequencies of signs and symptoms in mixed and pure episodes of mania: Implications for the study of manic episode. *Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry*, 25, 659-669.
- Chang, K. (2007). Adult bipolar disorder is continuous with pediatric bipolar disorder. *Canadian Journal of Psychiatry*, 52, 418-424.
- Craney, J. L., & Geller, B. (2003). A prepubertal and early adolescent bipolar disorder-I phenotype: Review of phenomenology and longitudinal course. *Bipolar Disorders*, 5, 243-256.
- Danielyan, A., Pathak, S., Kowatch, R. A., Arszman, S. P., & Johns, E. S. (2007). Clinical characteristics of bipolar disorder in very young children. *Journal of Affective Disorders*, 97, 51-59.
- DelBello, M. P., Soutullo, C. A., Hendricks, W., Niemeier, R. T., McElroy, S. L., & Strakowski, S. M. (2001). Prior stimulant treatment in adolescents with bipolar disorder: Association with age at onset. *Bipolar Disorders*, 3, 53-57.
- Dickstein, D. P., Nelson, E. E., McClure, E. B., Grimley, M. E., Knopf, L., Brotman, M. A., Rich, B. A., Pine, D. S., & Leibenluft, E. (2007). Cognitive flexibility in phenotypes of pediatric bipolar disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 46, 341-355.
- Dickstein, D. P., Rich, B. A., Binstock, A. B., Pradella, A. G., Towbin, K. E., Pine, D. S., & Leibenluft, E. (2005). Comorbid anxiety in phenotypes of pediatric bipolar disorder. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 15, 534-548.
- Duffy, A. (2007). Does bipolar disorder exist in children? A selected review. *Canadian Journal of Psychiatry*, 52, 409-417.
- Faraone, S. V., Biederman, J., Mennin, D., Wozniak, J., & Spencer, T. (1997). Attention-deficit hyperactivity disorder with bipolar disorder: A familial subtype? *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 36, 1378-1387.
- Feadda, G. L., Baldessarini, R. J., Glovinsky, I. P., & Austin, N. B. (2004). Pediatric bipolar disorder: Phenomenology and course of illness. *Bipolar Disorders*, 6, 305-313.
- Feldman-Naim, S., Turner, E. H., & Leibenluft, E. (1997). Diurnal variation in the direction of mood switches in patients with rapid-cycling bipolar disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 58, 79-84.
- Freeman, M. P., & McElroy, S. L. (1999). Clinical picture and etiologic models of mixed states. *Psychiatric Clinic of North America*, 22, 535-546.
- Geller, B. (2002). *Longitudinal and family study validators of a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype*. Proceedings of 41st Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacology, December 9, 2002, San Juan, Puerto Rico.
- Geller, B., & Cook, E. H. J. (2000). Ultradian rapid cycling in prepubertal and early adolescent bipolarity is not in transmission disequilibrium with val/met COMT alleles. *Biological Psychiatry*, 47, 605-609.
- Geller, B., & Tillman, R. (2005). Prepubertal and early adolescent bipolar I disorder: Review of diagnostic validation by Robins and Guze criteria. *Journal of Clinical Psychiatry*, 66 (Suppl. 7), 21-28.

- Geller, B., Bolhofner, K., Craney, J., Williams, M., DelBello, M., & Gunderson, K. (2000). Psychosocial functioning in a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39, 1543-1548.
- Geller, B., Craney, J. L., Bolhofner, K., Nickelsburg, M. J., Williams, M., & Zimerman, B. (2002). Two-year prospective follow-up of children with a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. *American Journal of Psychiatry*, 159, 927-933.
- Geller, B., Sun, K., Zimerman, B., Luby, J., Frazier, J., & Williams, M. (1995). Complex and rapid-cycling in bipolar children and adolescents: A preliminary study. *Journal of Affective Disorders*, 34, 259-268.
- Geller, B., Tillman, R., Craney, J. L., & Bolhofner, K. (2004). Four-year prospective outcome and natural history of mania in children with a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. *Archives of General Psychiatry*, 61, 459-467.
- Geller, B., Williams, M., Zimerman, B., Frazier, J., Beringer, L., & Warner, K. L. (1998). Prepubertal and early adolescent bipolarity differentiate from ADHD by manic symptoms, grandiose delusions, ultrarapid or ultradian cycling. *Journal of Affective Disorders*, 51, 81-91.
- Geller, B., Zimerman, B., Wiliams, M., Bolhofner, K., Craney, J. L., DelBello, M. P., & Soutullo, C. (2001). Reliability of the Washington University in St. Louis Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (WASH-U-KSADS). *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40, 450-455.
- Ghaemi, S. N. (2003). *The concepts of psychiatry: A pluralistic approach to the mind and mental illness*. Johns Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Ghaemi, S. N. (2007). Defining the boundaries of childhood bipolar disorder. *American Journal of Psychiatry*, 164, 185-188.
- Ghaemi, S. N., Lenox, M. S., & Baldessarini, R. J. (2001). Effectiveness and safety of long-term antidepressant treatment in bipolar disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 62, 565-569.
- Glahn, D. C., Bearden, C. E., Niendam, T. A., & Escamilla, M. A. (2004). The feasibility of neuropsychological endophenotypes in the search for genes associated with bipolar affective disorder. *Bipolar Disorders*, 6, 171-182.
- Goodwin, F. K., & Jamison, K. R. (1990). *Manic-depressive illness*. Oxford: Oxford University Press.
- Gottesman, I. I., & Gould, T. D. (2003). The endophenotype concept in psychiatry: Etymology and strategic intentions. *American Journal of Psychiatry*, 160, 636-645.
- Guyer, A. E., McClure, E. B., Adler, A. D., Brotman, M. A., Rich, B. A., Kimes, A. S., Pine, D. S., Ernst, M., & Leibenluft, E. (2007). Specificity of facial expression labeling deficits in childhood psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48, 863-871.
- Hirschfeld, R. M., Lewis, L., & Vornik, L. A. (2003). Perceptions and impact of bipolar disorder: How far have we really come? Results of the national depressive and manic-depressive association 2000 survey of individuals with bipolar disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 64, 161-174.
- Isaac, G. (1995). Is bipolar disorder the most common diagnostic entity in hospitalized adolescents and children? *Adolescence*, 30, 273-276.
- Joyce, P. R. (1984). Age of onset in bipolar affective and misdiagnosis as schizophrenia. *Psychological Medicine*, 14, 145-149.
- Judd, L. L., & Akiskal, H. S. (2003). The prevalence and disability of bipolar spectrum disorders in the US population: Re-analysis of the ECA database taking into account sub-threshold cases. *Journal of Affective Disorders*, 73, 123-131.
- Judd, L. L., Akiskal, H. S., Schettler, P. J., Endicott, J., Maser, J., Solomon, D. A., Leon, A. C., Rice, J. A., & Keller, M. B. (2002). The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. *Archives of General Psychiatry*, 59, 530-537.
- Kaufman, J., Birmaher, B., Brent, D., Rao, U., Flynn, C., Moreci, P., Williamson, D., & Ryan, N. (1997). Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): Initial reliability and validity data. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 36, 980-988.

- Kent, L., & Craddock, N. (2003). Is there a relationship between attention deficit hyperactivity disorder and bipolar disorder? *Journal of Affective Disorders*, 73, 211-221.
- Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62, 593-602.
- Kessler, R. C., Rubinow, D. R., Holmes, C., Abelson, J. M., & Zhao, S. (1997). The epidemiology of DSM-III-R bipolar I disorder in a general population survey. *Psychological Medicine*, 27, 1079-1089.
- Kim, E. Y., & Miklowitz, D. J. (2002). Childhood mania, attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorders: A critical review of diagnostic dilemmas. *Bipolar Disorders*, 4, 215-225.
- Klein, R. G., Pine, D. S., & Klein, D. E. (1998). Mania is mistaken for ADHD in prepubertal children (negative). *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 37, 1093-1096.
- Koukopoulos, A., Albert, M. J., Sani, G., Koukopoulos, A. E., & Girardi, P. (2005). Mixed depressive states: Nosologic and therapeutic issues. *International Review Psychiatry*, 17, 21-37.
- Kowatch, R. A., Fristad, M. A., Birmaher, B., Wagner, K. D., Findling, R. L., & Hellander, M. (2005). Child psychiatric workgroup members. Treatment guidelines for children and adolescents with bipolar disorder: Child Psychiatric Workgroup on Bipolar Disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44, 213-235.
- Kowatch, R. A., Youngstrom, E. A., Danielyan, A., & Findling, R. L. (2005). Review and meta-analysis of the phenomenology and clinical characteristics of mania in children and adolescents. *Bipolar Disorders*, 7, 483-496.
- Kraepelin, E. (1921). *Manic-Depressive Insanity and Paranoia* (1st ed.). Chicago: Chicago Medical Book Company.
- Leibenluft, E., Blair, R. J., Charney, D. S., & Pine, D. S. (2003). Irritability in pediatric mania and other childhood psychopathology. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1008, 201-218.
- Leibenluft, E., Charney, D. S., & Pine, D. S. (2003). Researching the pathophysiology of pediatric bipolar disorder. *Biological Psychiatry*, 53, 1009-1020.
- Leibenluft, E., Charney, D. S., Towbin, K. E., Bhagoo, R. K., & Pine, D. S. (2003). Defining clinical phenotypes of juvenile mania. *American Journal of Psychiatry*, 160, 430-437.
- Lewinsohn, P. M., Klein, D. N., & Seeley, J. R. (1995). Bipolar disorders in a community sample of older adolescents: Prevalence, phenomenology, comorbidity and course. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34, 454-463.
- Lish, J. D., Dime-Meenan, S., Whybrow, P. C., Price, R. A., & Hirschfeld, R. M. (1994). The National Depressive and Manic-depressive Association (NMDA) survey of bipolar members. *Journal of Affective Disorders*, 31, 281-294.
- Loranger, A. W., & Levine, P. M. (1978). Age of onset in bipolar affective illness. *Archives of General Psychiatry*, 35, 1345-1348.
- MacQueen, G. M., Hajek, T., & Alda, M. (2005). The phenotypes of bipolar disorder: Relevance for genetic investigations. *Molecular Psychiatry*, 10, 811-826.
- Martin, A., Young, C., Leckman, J. F., Mukonoweshuro, C., Rosenheck, R., & Leslie, D. (2004). Age effects on antidepressant-induced manic conversion. *Archives of Pediatric and Adolescent Medicine*, 158, 773-780.
- McClellan, J. (2005). Commentary: Treatment guidelines for child and adolescent bipolar disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44, 236-239.
- Mick, E., Spencer, T., Wozniak, J., & Biederman, J. (2005). Heterogeneity of irritability in ADHD subjects with and without mood disorders. *Biological Psychiatry*, 58, 576-582.
- Miklowitz, D. J., Goldstein, M. J., Nuechterlein, K. H., Synder, K. S., & Mintz, J. (1988). Family factors and the course of bipolar affective disorder. *Archives of General Psychiatry*, 45, 225-231.
- Nagin, D. S., & Tremblay, R. E. (2001). Parental and early childhood predictors of persistent physical aggression in boys from kindergarten to high school. *Archives of General Psychiatry*, 58, 389-394.

- National Institute of Mental Health (2001). National Institute of Mental Health research roundtable on prepubertal bipolar disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40, 871-878.
- Newcorn, J. A. (2001). *Psychopharmacological approaches to comorbid ADHD: Annual Albert Einstein Medical Center Pediatric Psychopharmacology Course*. New York: New York Academy of Medicine.
- Newcorn, J. H., Halperin, J. M., & Miller, C. L. (2000). *Comorbidity of attention deficit disorders with oppositionality and aggression, in attention-deficit disorders and comorbidities in children, adolescents, and adults*. In T. E. Brown (Ed.). Washington: American Psychiatric Press.
- Pauls, D. L., Morton, L. A., & Egeland, J. A. (1992). Risk of affective illness among first-degree relatives of bipolar I old-order Amish probands. *Archives of General Psychiatry*, 49, 703-708.
- Pavuluri, M. N., Birmaher, B., & Naylor, M. W. (2005). Pediatric bipolar disorder: A review of the past 10 years. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44, 846-871.
- Perlis, R. H., Miyahara, S., Marangell, L. B., Wisniewski, S. R., Ostacher, M., DelBello, M. P., Bowden, C. L., Sachs, G. S., & Nierenberg, A. A. (2004). Long-term implications of early onset in bipolar disorder: Data from the first 1000 participants in the systematic treatment enhancement program for bipolar disorder (STEP-BD). *Biological Psychiatry*, 55, 875-881.
- Perugi, G., Toni, C., Travierso, M. C., & Akiskal, H. S. (2003). The role of cyclothymia in atypical depression: Toward a data-based reconceptualization of the borderline-bipolar II connection. *Journal of Affective Disorders*, 73, 87-98.
- Post, R. M., Denicoff, K. D., Leverich, G. S., Altshuler, L. L., Frye, M. A., Suppes, T. M., Rush, A. J., Keck, J. R., McElroy, S. L., Luckenbaugh, D. A., Pollio, C., Kupka, R. S., & Nolen, W. A. (2003). Morbidity in 258 bipolar outpatients followed for 1 year with daily prospective ratings on the NIMH life chart method. *Journal of Clinical Psychiatry*, 64, 680-690.
- Rau, G., Blair, K. S., Berghorst, L., Knopf, L., Skup, M., Luckenbaugh, D. A., Pine, D. S., Blair, R. J., & Leibenluft, E. (2008). Processing of differentially valued rewards and punishments in youths with bipolar disorder or severe mood dysregulation. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 18, 185-196.
- Rich, B. A., Bhangoo, R. K., Vinton, D. T., Berghorst, L. H., Dickstein, D. P., Grillon, C., Davidson, R. J., & Leibenluft, E. (2005). Using affect-modulated startle to study phenotypes of pediatric bipolar disorder. *Bipolar Disorders*, 7, 536-545.
- Rich, B. A., Grimley, M. E., Schmajuk, M., Blair, K. S., Blair, R. J., & Leibenluft, E. (2008). Face emotional labeling deficits in children with bipolar disorder and severe mood dysregulation. *Developmental Psychopathology*, 20, 529-546.
- Rich, B. A., Schmajuk, M., Perez-Edgar, K. E., Fox, N. A., Pine, D. S., & Leibenluft, E. (2007). Different psychophysiological and behavioral responses elicited by frustration in pediatric bipolar disorder and severe mood dysregulation. *American Journal of Psychiatry*, 164, 309-317.
- Robins, E., & Guze, S. B. (1970). Establishment of diagnostic validity in psychiatric illness: Its application to schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 126, 983-987.
- Schulze, T. G., Hedeker, D., Zandi, P., Rietschel, M., & McMahon, F. J. (2006). What is familial about familial bipolar disorder? *Archives of General Psychiatry*, 63, 1368-1376.
- Shirazi, E., Zarei, M., & Shahrivar, Z. (2008). Subthreshold signs and symptoms of mania in the premorbid phase of the first manic episode: A retrograde study. *Journal of Affective Disorders*, 107 (Suppl. 1), S 101.
- Staton, D., Volness, L. J., & Beatty, W. W. (2008). Diagnosis and classification of pediatric bipolar disorder. *Journal of Affective Disorders*, 105, 205-212.
- Strober, M., Morrell, W., Burroughs, J., Lampert, C., Danforth, H., & Freeman, R. (1988). A family study of bipolar I disorder in adolescence: Early onset of symptoms linked to increased familial loading and lithium resistance. *Journal of Affective Disorders*, 15, 255-268.
- Tillman, R., Geller, B., Craney, J. L., Bolhofner, K., Williams, M., & Zimmerman, B. (2004). Relationship of parent and child informants to prevalence of mania symptoms in children with a prepubertal and early adolescent bipolar

- disorder phenotype. *American Journal of Psychiatry*, 161, 1278-1284.
- Waschbusch, D. A., Pelham, W. E., Jennings, J. R., Greiner, A. R., Tarter, R. E., & Moss, H. B. (2002). Reactive aggression in boys with disruptive behavior disorders: Behavior, physiology, and affect. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 30, 641-656.
- Wehr, T. A., & Goodwin, F. K. (1987). Can antidepressants cause mania and worsen the course of affective illness? *American Journal of Psychiatry*, 144, 1403-1411.
- Weller, E. B., Weller, R. A., & Danielyan, A. K. (2003). Mood disorders in prepubertal children. In: J. Wiener, & M. Dulcan (Eds.), *The American psychiatric publishing textbook of child and adolescent psychiatry*. Washington, DC.: American Psychiatric Publishing.
- Wozniak, J. (2003). Pediatric bipolar disorder: The new perspective on severe mood dysfunction in children. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 13, 449-451.
- Wozniak, J., Biederman, J., & Richards, J. A. (2001). Diagnostic and therapeutic dilemmas in the management of pediatric-onset bipolar disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 62, 10-15.
- Wozniak, J., Biederman, J., Kiely, K., Ablon, J. S., Faraone, S. V., Mundy, E., & Mennin, D. (1995). Mania-like symptoms suggestive of childhood-onset bipolar disorder in clinically referred children. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34, 867-876.
- Wozniak, J., Biederman, J., Kwon, A., Mick, E., Faraone, S., Orlovsky, K., Schnare, L., Cargol, C., & Van Grondelle, A. (2005). How cardinal are cardinal symptoms in pediatric bipolar disorder? An examination of clinical correlates. *Biological Psychiatry*, 58, 583-588.
- Wozniak, J., Biederman, J., Monuteaux, M. C., Richards, J., & Faraone, S. V. (2002). Parsing the comorbidity between bipolar disorder and anxiety disorders: A familial risk analysis. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 12, 101-111.